

# **Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning kategori A**

## **Inventory, Control Document and User Instructions Category A**



# **Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning over lægemiddelstoffer og medicinsk udstyr kategori A**

Jf. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, Kapitel IX B

# **Inventory, Control Document, and User Instructions of Active Pharmaceutical Ingredients and Medical Equipment Category A**

Cf. Danish Maritime Authority Notice A, chapter IX B

July 2024

ISBN: 978-87-7454-210-0

## Identifikation af skib / Identification of ship

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Skibsnavn / <i>Ship Name:</i> |  |
|-------------------------------|--|

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Kaldesignal / <i>Call Signal:</i> |  |
|-----------------------------------|--|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| IMO nummer / <i>IMO number:</i> |  |
|---------------------------------|--|

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Hjemmehavn / <i>Port of Reg.:</i> |  |
|-----------------------------------|--|

## Medicin certifikat / *Medicine Certificate*

Dette dokument anses for at udgøre skibets medicin certifikat.

Det attesteres herved, at medicin og medicinsk udstyr er eftersat og fundet i overensstemmelse med Den Danske Søfartsstyrelses krav jf. Meddelelser A Kapitel IX B.

This document is considered to represent the ships certificate of medicine.

It certifies that medicine and medical equipment has been inspected and found in compliance with the Danish Maritime Authority's requirement cf. Notes A chapter IX B.

Skibsnavn / *Ship Name*:

Kaldesignal / *Call Signal*:

IMO nummer / *IMO Number*:

Hjemmehavn / *Port of Reg.*:

| Dato / <i>Date</i>                             | Rank / <i>Rank</i>         | Navn / <i>Name</i> | Underskrift / <i>Signature</i> |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------------------|
|  | Skibsfører / <i>Master</i> |                    |                                |
| <b>Næste eftersyn / <i>Next inspection</i></b> |                            |                    |                                |
| Dato / <i>Date</i>                             | Rank / <i>Rank</i>         | Navn / <i>Name</i> | Underskrift / <i>Signature</i> |
|  | Skibsfører / <i>Master</i> |                    |                                |

## Certifikat for genoplivningsudstyr (A.1)

### *Certificate resuscitation equipment (A.1)*

Det attesteres herved at det **mobile genoplivningsudstyr (A.1)** er efterset og fundet i overensstemmelse med Den Danske Søfartsstyrelses krav jf. Meddelelser A Kapitel IX B.

It certifies that the **mobile resuscitation equipment (A.1)** has been inspected and found in compliance with the Danish Maritime Authority's requirement cf. Notes A chapter IX B.

Skibsnavn / *Ship Name*:

Kaldesignal / *Call Signal*:

IMO nummer / *IMO Number*:

Hjemmehavn / *Port of Reg.*:

| Dato / <i>Date</i>                             | Rank / <i>Rank</i>         | Navn / <i>Name</i> | Underskrift / <i>Signature</i> |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------------------|
|  | Skibsfører / <i>Master</i> |                    |                                |
| <b>Næste eftersyn / <i>Next inspection</i></b> |                            |                    |                                |
| Dato / <i>Date</i>                             | Rank / <i>Rank</i>         | Navn / <i>Name</i> | Underskrift / <i>Signature</i> |
|  | Skibsfører / <i>Master</i> |                    |                                |

# Indhold / Contents

|  |            |
|--|------------|
| <b>Brugervejledning: .....</b>                                 | <b>5</b>   |
| <i>User Instruction: .....</i>                                 | <i>5</i>   |
| <b>Anvendte forkortelser.....</b>                              | <b>9</b>   |
| <i>Used abbreviations .....</i>                                | <i>9</i>   |
| <b>Brugervejledning Lægemiddelstoffer .....</b>                | <b>10</b>  |
| <i>User instruction Active Pharmaceutical .....</i>            | <i>10</i>  |
| <b>Fortegnelse og kontroldokument.....</b>                     | <b>62</b>  |
| <i>Inventory and Control Document .....</i>                    | <i>62</i>  |
| <b>Fortegnelse og Kontrolldokument .....</b>                   | <b>70</b>  |
| <i>Inventory and Control Document .....</i>                    | <i>70</i>  |
| <b>Labels.....</b>   | <b>79</b>  |
| <b>INDEX.....</b>  | <b>84</b>  |
| <b>Requisition lægemiddelstoffer og medicinsk udstyr .....</b> | <b>89</b>  |
| <i>Requisition Active Pharmaceutical .....</i>                 | <i>89</i>  |
| <b>Ændringer / Changes.....</b>                                | <b>101</b> |

## De Danske Medicinkister

Medicinkisten angiver medicin/medicinsk udstyr, som Radio Medical Danmark og Søfartsstyrelsen har foretrukket indenfor de rammer som EU-direktiv 92/29/EØF og den Danske lægemiddelstyrelse har givet.

### Guide til:

#### Brugervejledning:

**Første kolonne** beskriver de indikationer, lægemiddelstoffet er beregnet til. De samme indikationer kan slås op i indekset bagerst i hæftet. Første kolonne beskriver også om et lægemiddelstof skal anvendes sammen med andre lægemiddelstoffer. I sådanne tilfælde er der lavet henvisninger til de relevante lægemiddelstoffer.

**Anden kolonne** oplyser, lægemiddelstoffets hoved- og undergruppenummer.

**Tredje og fjerde kolonne** indeholder rækker med oplysninger om:

- **Lægemiddelstoffet:** Beskriver det aktive stof i lægemidlet. Som et eksempel kan nævnes 3.1 Paracetamol. Det forhandles over hele jorden under mange forskellige handelsnavne. Derfor kan man uanset forskellige handelsnavne, altid finde lægemidlet, hvis man kender lægemiddelstoffet.
- **Form:** Beskriver om lægemiddelstoffet skal findes som kapsel, tablet, suppositorier, injektionsvæske, infusionsvæske, creme, salve, afdelte pulver, mund spray, brusetablet, klymska, oral opløsning eller inhalation. Form beskriver også styrken af det enkelte lægemiddelstof pr ml eller per tablet.
- **Virkning** beskriver den forventende virkning af det enkelte lægemiddel.
- **Dosering** beskriver den anbefalede dosis ved de tilstande, der er beskrevet i kolonnen indikation. Her beskrives ligeledes lægemidlets form og administrationsmåde.  
*Bemærkning:* Radio Medical kan ordinere andre doser og administrations måder.
- **Bivirkninger** nævner de mest almindelige bivirkninger beskrevet i Dansk Lægemiddelinformation, [www.medicin.dk](http://www.medicin.dk)
- **Holdbarhed** beskriver holdbarhedstiden fra produktions datoen. Holdbarhedstiden beskrevet i denne fortegnelse er fremkommet ud fra det danske handelsnavn med længst holdbarhed.  
*Bemærkning:* Der tages forbehold for at holdbarhedstiden kan ændres.
- **Opbevaring** beskriver om der er særlige krav til opbevaring. Lægemidler skal generelt opbevares tørt og beskyttet mod lys. De fleste lægemidler tåler "almindelig temperatur" defineret som normal stuetemperatur op til 22-24° C.
- **Anmærkninger** beskriver, om der bør søges samråd med Radio Medical Danmark inden anvendelse af lægemiddelstoffet. Desuden beskrives, om der er specielle forholdsregler til det specifikke lægemiddelstof.

**Advarsel:** Lægemiddelstoffer, der har været opbevaret forkert, eller er blevet for gamle, kan være sundhedsskadelige

## The Danish Medicine Chest's

The medicine chest indicates the Active Pharmaceutical Ingredients / medical equipment that Radio Medical Denmark and Danish Maritime Authority have preferred within the framework of the EU Directive 92/29 / EEC and the Danish Medicines Agency.

### Guide to:

#### User Instruction:

**First column** describes the indication the Active Pharmaceutical Ingredients is intended for. The same indications can be looked up in the index at the back of the booklet. First column also describes whether an Active Pharmaceutical Ingredient should be used together with other Active Pharmaceutical Ingredients. In such cases, a reference is made to the relevant Active Pharmaceutical Ingredient.

**Second column** describes the Active Pharmaceutical Ingredient main and subgroup numbers.

**Third and fourth column** contains a number of information about:

- **The Active Pharmaceutical Ingredients:** describe the Active Pharmaceutical Ingredients in the medicine. An example is 3.1 Paracetamol, which is sold all over the world under many different trade names. Regardless of different trade names is it always possible to locate the medicine, if you know the Active Pharmaceutical Ingredients.
- **Form:** describes if the Active Pharmaceutical Ingredients is available as capsules, tablets, suppositories, injection liquid, infusion liquid, lotion, ointment, divisional powder, mouth spray, effervescent tablets, enema, oral solution or inhalation. Form also describes the strength of each Active Pharmaceutical Ingredients per ml or per tablet.
- **Effect** describes the expected effect of each Active Pharmaceutical Ingredients.
- **Dosage** describes the recommended dose for the condition described in the column indication. The form of the Active Pharmaceutical Ingredients as well as the usual administering is mentioned.  
*Note:* Radio Medical may prescribe different doses and ways of administering.
- **Side effects** describes the most common side effects mentioned in the Danish Drug Information, [www.medicin.dk](http://www.medicin.dk). There is currently no English version.
- **Durability** describes the time of durability from date of production. The durability mentioned in this record is derived from the Danish trade name with the longest durability.  
*Note:* Durability may be subject to change.
- **Storage** describes if special storage precautions are needed. The Active Pharmaceutical Ingredients should generally be kept dry and protected from light. Most medicaments tolerate "normal temperature" defined as normal room temperature up to 22-24° C.
- **Remarks** describe whether it is recommended to seek advice from Radio Medical Denmark before using the Active Pharmaceutical Ingredients. In addition, precautions needed for the specific Active Pharmaceutical Ingredients are described.

**Warning:** Active Pharmaceutical Ingredients which have been stored improperly or are too old can be harmful to health.

## Guide til:

### Fortegnelse og kontroldokument over lægemiddelstoffer

Publikationen indeholder en fortegnelse over de lægemiddelstoffer, der skal være ombord.

#### Rækkerne

Lægemiddelstofferne er organiseret i hovedgrupper efter deres hovedanvendelsesområde. Eksempelvis er alle smertestillende lægemiddelstoffer organiseret i gruppe 3.

#### Kolonnerne

**Første kolonne** beskriver hvert enkelt lægemiddelstoffs nummer. Eksempelvis har morfin nummeret 3.4, hvor tallet før punktum referer til hovedgruppen, og tallet efter referer til det specifikke lægemiddelstof. Lægemiddelstofferne i skibets hospital skal så vidt muligt organiseres efter dette nummersystem

**Anden kolonne** beskriver ATC koden, et klassifikations system for medicin. Se mere på [www.whocc.no](http://www.whocc.no)

**Tredje kolonne** beskriver lægemiddelstoffet.

**Bemærkning:** Efter lægemiddelstoffet kan være anført et "Δ", dersom produktet er sløvende, og et "K", dersom produktet skal opbevares i køleskab.

**Fjerde kolonne** beskriver under "Adm.form", om lægemiddelstoffet skal findes som kapsel, tablet, suppositorier, injektionsvæske, infusionsvæske, creme, salve, afdelte pulver, mund spray, brusetablet, klyasma, oral opløsning eller inhalation.

**Femte kolonne** beskriver styrken pr tablet eller pr. ml.

**Sjette kolonne** beskriver mindste mængde, skibet skal medbringe. Skibet må gerne medbringe større mængder end det beskrevne.

### Besætningens medbragte medicin

Besætningen har ret til at medbringe egen medicin under den forudsætning, at de til stadighed har en gyldig helbredsundersøgelse for søfarende og fiskere. Medbragte lægemidler skal oplyses til skibsføreren eller sygdomsbehandleren. Lægemidlet skal indskrives med følgende oplysninger:

- Lægemidlets navn
- Navn på besætningsmedlem
- Mængde og antal
- Daglig dosis
- Dato ind
- Eventuel kvittering for modtagelsen. (Kun hvis lægemidlet opbevares på sygelukafet)
- Dato ud
- Kvittering for modtagelsen (Kun hvis lægemidlet har været opbevaret på sygelukafet)

## Guide to:

### Inventory and Control Document of Active Pharmaceutical Ingredients.

The publication contains an inventory of mandatory Active Pharmaceutical Ingredients on board.

#### The rows

The Active Pharmaceutical Ingredients are organized into main groups according to field of application. As an example all analgesics are organized in group 3.

#### The columns

**First column** describes each individual Active Pharmaceutical Ingredient by number. For example, morphine number 3.4, where the number before the dot refers to the main group and the number after the dot refers to the specific active pharmaceutical ingredients. The Active Pharmaceutical Ingredients in the ship's hospital must as far as possible be organized after this numbering system.

**Second column** describe the ATC code, a classification system on medicine. See more on [www.whocc.no](http://www.whocc.no).

**Third column** describes the Active Pharmaceutical Ingredients.

**Note:** The Active Pharmaceutical Ingredients can be marked with a "Δ" if the product is sedative and a "R" if the product should be stored in a refrigerator.

**Fourth column** describes under "Adm.form" whether the Active Pharmaceutical Ingredients should be available as capsules, tablets, suppositories injection liquid, infusion liquid, lotion, ointment, divisional powder, mouth spray, effervescent tablets, enema, oral solution or inhalation.

**Fifth column** describes the strength per tablet or per ml.

**Sixth column** describes the minimum amount the vessel must carry. The vessel may carry greater amounts than described.

### Private medicine of crewmembers

The crew has a right to bring there own medicine, provided they possess a valid health certificate for seafarers and fishermen at all time. The master or the person in charge of medical care has to be informed about medicine brought along.

The medicine must be registreted with the following information:

- Name of the medicine
- Name of crewmember
- Amount
- Daily dosage
- Date in
- Possible receipt for recieved medicine.  
(Only if the medicine is stored at the sickbay)
- Date out
- Sign when medicine is returned  
(Only if the medicine has been stored in the sickbay)



## Guide til:

### Fortegnelse og kontroldokument over medicinsk udstyr.

Publikationen indeholder en fortegnelse over det medicinske udstyr, der skal være om bord.

#### Rækkerne

Det medicinske udstyr er organiseret i hovedgrupper efter deres hovedanvendelsesområde. Eksempelvis er alle forbindinger og plastre organiseret i gruppe B.

**Første kolonne** beskriver det enkelte medicinske udstyrs bogstav og nummer. Eksempelvis har "Elastisk gazebind, ca. 4 cm x 4 m", kombinationen nummeret B.9, hvor bogstavet før punktum referer til hovedgruppen, og tallet efter referer til det specifikke medicinske udstyr.

**Anden kolonne** beskriver det specifikke medicinske udstyr.

**Tredje kolonne** beskriver den mindste mængde, skibet skal medbringe. Skibet må gerne medbringe større mængder end det beskrevne.

### Det mobile genoplivningsudstyr A.1

Søfartsstyrelsen har fastsat regler om ilt og det mobile genoplivningsudstyr i gældende Meddelelser A kapitel IX B. Man kan derudover pakke førstehjælpsudstyr og lægemidler til førstehjælp sammen med det mobile genoplivningsudstyr. Der er udarbejdet forslag til pakning af et mobilt genoplivningsudstyr på [www.soefartsstyrelsen.dk](http://www.soefartsstyrelsen.dk).

### Etiketter

Publikationen indeholder en kopi af de etiketter, der skal være på lægemiddelstofferne ved leveringen. Kopien kan anvendes som kontrol af, at lægemidlet er korrekt og påført den korrekte etiket. Er det ikke tilfældet, bør skibsførerens rettede sin leverandør.

Ved køb af lægemiddelstoffer, kan en kopi af etiketterne afleveres ved leverandøren. Derefter skal leverandøren, før udlevering, påføre de korrekte etiketter,

### Indeks

Indekset henviser til lægemiddelstoffernes brugervejledning. I indekset kan du søge på visse sygdomme, symptomer og alle lægemiddelstoffer.

### Rekvision

I publikationen findes en bestillingsliste, hvor du blot udfylder de ønskede mængder af lægemiddelstof og medicinsk udstyr.

### Medicinkiste- / Mobilt genoplivningsudstyr certifikat.

Mindst en gang årligt skal skibets lægemiddelstoffer og medicinske udstyr gennemgås. Det mobile genoplivnings udstyr skal kontrolleres hver 3. måned.

Ved gennemgangen kontrolleres mængden, opbevaringsforhold, udløbsdato og etiketter. Nåle, kanyler og metalinstrumenter kontrolleres for rust. Kontroller, at emballagen er intakt. Vær opmærksom på, at lægemiddelstof og medicinsk udstyr skal opbevares tørt og mørkt, og ikke må opbevares i nærheden af klor.

### Dokumentation af 3 måneders og årlig inspektion.

På side 2 og 3 er Medicinkiste – og mobilt genoplivningsudstyrs certifikat, som også kan anvendes til dokumentation af inspektionerne. Siderne udskrives og underskrives af skibsføreren.

## Guide to:

### Inventory and Control Document Medical Equipment.

The publication contains an inventory of the mandatory medical equipment onboard

#### The rows

The medical equipment is organized into main groups according to their main field of application. For example all dressings and plasters are organized in group B.

**First column** describes each individual medical equipment by number. The "elastic gauze", approx. 4 cm x 4 m, carries the combination B.9. The letters before the dot refers to the main group, and the number after the dot refers to the specific medical equipment.

**Second column** describes the specific medical equipment.

**Third column** describes the minimum amount the vessel must carry. The vessel may carry larger quantities than described.

### The Mobile Resuscitation Equipment A.1

The Danish Maritime Authority has established rules for oxygen and the mobile resuscitation equipment in the current Notice A chapter IX B. In addition you may pack equipment and medicine suited for first aid with the resuscitation equipment. Suggestions for the list may be found on [www.dma.dk](http://www.dma.dk).

### Labels

The publication contains copies of the labels that must be on each Active Pharmaceutical Ingredient, at the time of delivery. The copy may be used as verification of proper product and label. If labelling is incorrect, the master should guide his supplier.

When purchasing Active Pharmaceutical Ingredients a copy of the label may be delivered to the supplier. Then the supplier applies the correct labels before delivery.

### Index

The index refers to the user instruction of active pharmaceutical ingredients. You can search for diseases, symptoms and Active Pharmaceutical Ingredients in the index.

### Requisition

In the publication is a requisition form available. You simply fill in the required quantities of the active pharmaceutical ingredients and medical equipment.

### Medicine chest- / Mobile resuscitation equipment certificate.

At least once a year the ship's Active Pharmaceutical Ingredients and medical equipment must be reviewed.

The mobile resuscitation equipment every 3 month.

When reviewing the quantities, storage conditions, expiry date and labels are controlled. Needles, cannulas and metal instruments are checked for rust. Check if the packaging is intact. Be aware that the Active Pharmaceutical Ingredients and equipment must be stored dry and dark, and not near chlorine.

### Documentation of 3 months and annual inspection.

On page 2 and 3 is Medicine chest- and mobile resuscitation equipment's certificate's. It can also be used to document the inspections. The page's has to be printed and the Master has to sign them.

### **Dispensation for andet lægemiddelstof**

Det er ikke til alle tider, og i alle lande muligt at indkøbe det foretrukne lægemiddelstof. Den danske Søfartsstyrelse og Radio Medical Danmark har derfor udarbejdet en liste med godkendte alternativer. Hvis det er muligt at indkøbe lægemiddelstoffer fra listen med godkendte alternativer med den korrekte koncentration, og indgiftsmåde, er det ikke nødvendigt at ansøge om dispensation.

Hvis apotek/forhandler tilbyder lægemiddelstof, som ikke findes på nogen liste, skal der søges om dispensation for anden medicin. Dette gøres på Søfartsstyrelsen hjemmeside, hvor der er en procedure for "Dispensation for anden medicin".

Listen over godkendte alternative, og dertil hørende labels og brugervejledninger kan downloades fra [www.soefartsstyrelsen.dk](http://www.soefartsstyrelsen.dk).

Listen med godkendte alternativer findes i Excel format.

### **Hjælp**

Er der noget du er i tvivl om, står Søfartsstyrelsens "Center for det Maritime Sundhedsvæsen" til din rådighed. Adressen er:

CMS, Vestervejen 1, 6720 Fanø  
Telefon: +45 7219 6004  
Email: [cms@dma.dk](mailto:cms@dma.dk)

### **Exemption for other active pharmaceutical ingredients**

It is not at all times and in all countries possible to purchase the preferred Active Pharmaceutical Ingredients. The Danish Maritime Authority and Radio Medical Denmark have therefore drawn up a list of approved alternatives. If it is possible to purchase Active Pharmaceutical Ingredients from the list of approved alternatives with the correct concentration and method of administration, it is not necessary to apply for exemption.

If the pharmacy/retailer offer Active Pharmaceutical Ingredients that is not on the inventory- or alternative list, you must apply for an exemption. This is done on the DMA website, where there is a procedure for "exemption of medicine".

The list of approved alternative, and associated labels and user instructions can be downloaded from [www.dma.dk](http://www.dma.dk).

The list of approved alternatives is available in Excel format.

### **Help**

If you have any questions, the Danish Maritime Authority's "Centre of Maritime Health Service" is at your disposal. The address is:

CMS, Vestervejen 1, 6720 Fanø  
Telephone: +45 7219 6004  
E-mail: [cms@dma.dk](mailto:cms@dma.dk)

## Anvendte forkortelser m.v. i Fortegnelse og Brugervejledning

|            |   |   |
|------------|---|---|
| afd. Pul.  | = | afdelte pulvere   |
| gel        | = | gel til påsmøring på hud  |
| htgl.      | = | hætteglas   |
| i.m.       | = | intramuskulært = i musklen  |
| inf. Væs.  | = | infusionsvæske (til intravenøs brug)                                    |
| inh. Pul.  | = | inhalationspulver   |
| inj. væske | = | injektionsvæske (til i.m. eller s.c.injektion)                          |
| i.v.       | = | intravenøst = i en vene   |
| "K"        | = | opbevares i køleskab  |
| klysma     | = | klysma til anvendelse i endetarmen                                      |
| linim.     | = | liniment  |
| gas        | = | luftformig gasart til medicinsk anvendelse                              |
| mixtur     | = | væske som drikkes   |
| næsedr.    | = | næsedråber  |
| opløsn.    | = | opløsning   |
| s.c.       | = | subcutant = under huden   |
| supp.      | = | suppositorier = stikpille til brug i endetarmen                         |
| Δ          | = | sløvende medicin, kan påvirke evnen til maskinbetjening og vagttjeneste |
| (π)        | = | Receptpligtig medicin   |

## Used abbreviations etc. In the Inventory and User instruction

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| d.p.        | = | divisional powder  |
| gel         | = | gel for application on the skin  |
| c.v         | = | cappedvials  |
| i.m.        | = | intramuscular = in the muscle  |
| inf. fl.    | = | infusion fluid (for intravenous use)   |
| inh. p.     | = | inhalation powder  |
| inj. subst. | = | injection substance (for reconstitution before use)                            |
| inj. liquid | = | injection fluid (for i.m. or s.c. injection)                                   |
| i.v.        | = | intravenous = in a vein  |
| "R"         | = | stored in refrigerator   |
| enema       | = | enema for use in the rectum  |
| linim.      | = | liniment   |
| gas.        | = | gas for medical use  |
| mixture     | = | drinkable liquid   |
| nose d.     | = | nose drops   |
| diss.       | = | dissolution  |
| s.c.        | = | subcutaneous = under the skin  |
| supp.       | = | suppositories = suppository for rectal use                                     |
| Δ           | = | sedative medicine, may affect the ability to operate machinery and bridge duty |
| (π)         | = | Prescription drugs   |

**Brugervejledning Lægemiddelstoffer**

**User instruction Active Pharmaceutical  
Ingredients**

**Grp. 1 Ilt / Oxygen**

|  |         |   |  |
|--|---------|---|--|
| Bevidstløs uden vejtrækning<br>Bevidstløs med vejtrækning<br>Medtaget almen tilstand<br>Slag mod kraniet Større kvæstelser<br>Vejtrækningsbesvær         | 1.1+1.3 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Medicinsk ilt  |
|  |         | <b>Form:</b>                              | Luft på trykflasker.   |
|  |         | <b>Virkning:</b>                          | Tilfører ilt til cellerne via de røde blodlegemer.   |
|  |         | <b>Dosering:</b>                          | Bevidstløse uden vejtrækning: Manuel ventilation med 15 liter per minut.<br>Bevidstløse med vejtrækning og øvrige tilstande: Maske med 9 liter/min.              |
|  |         | <b>Bivirkninger:</b>                      | Ilt er ufarligt til medicinsk brug.  |
|  |         | <b>Holdbarhed:</b>                        | Flaske: 3 år fra produktionsdato (Conoxia®, Linde Gas Therapeutics AGA).   |
|  |         | <b>Opbevaring</b>                         | Flasker holdes under 50°C.   |
|  |         | <i>Anmærkninger:</i>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .  |
| Unconscious without breathing<br>Unconscious with breathing<br>Weak general condition<br>Blows to the skull<br>Severe injuries<br>Breathing difficulties | 1.1+1.3 | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Medical oxygen   |
|  |         | <b>Form:</b>                              | Gas in pressurized bottles.  |
|  |         | <b>Effect:</b>                            | Induces oxygen to the cells via the red blood cells.   |
|  |         | <b>Dosage:</b>                            | Unconscious without breathing: Manual ventilation, 15 litres per minute. (A.1)<br>Unconscious with breathing and other states: Oxygen mask, 9 litres per minute. |
|  |         | <b>Side-effects:</b>                      | Oxygen is not dangerous when used for medicinal purposes.  |
|  |         | <b>Validity:</b>                          | Bottles 3 years from productions date (Conoxia®, Linde Gas Therapeutics AGA).  |
|  |         | <b>Storage:</b>                           | Keep away from flammable gases and substances.<br>Keep bottle under 50°C.  |
|  |         | <i>Remarks:</i>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .   |

**Grp. 2 Lokalbedøvelse / Local Anaesthetics**

|                                 |     |                        |  |
|---------------------------------|-----|------------------------|--|
| Lokalbedøvelse<br>Syning af sår | 2.1 | <b>Lægemiddelstof:</b> | Lidocain   |
|                                 |     | <b>Form:</b>           | Injektionsvæske 10 mg/ml til subcutan injektion.   |
|                                 |     | <b>Virkning:</b>       | Lokalbedøver på injektionsstedet. Virker efter 1 - 2 minutter.<br>Virker i 2 - 3 timer.  |
|                                 |     | <b>Dosering:</b>       | Mængden afhænger af sårets størrelse.<br>Normalt anvendes 20 - 50 mg.<br>Maksimaldosis er 20 ml svarende til 200 mg.<br>Se Søfartsstyrelsens Lægebog.  |
|                                 |     | <b>Bivirkninger:</b>   | Allergi er sjælden.<br>Ved utilsigtet injektion i blodbanen kan der opstå:<br>1. føleforstyrrelser, svimmelhed, uklarhed og øresusen.<br>2. synsforstyrrelser, muskelrysten og kramper.<br>3. blodtryksfald og langsom puls. |
|                                 |     | <b>Holdbarhed:</b>     | 3 år fra produktionsdato (Xylocain®, AstraZeneca).   |
|                                 |     | <b>Opbevaring:</b>     | Almindelig temperatur. Må ikke fryses.   |
|                                 |     | <i>Anmærkninger:</i>   | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .<br>Lokalbedøvelse skal ske i et rum med adgang til adrenalin (4.1) og genoplivningsudstyr (A.1).<br>Risiko for alvorlige bivirkninger, hvis lidocain injiceres i blodbanen.            |

|  |     |   |   |
|--|-----|---|---|
| Local anaesthetics<br>Suture of wounds | 2.1 | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Lidocaine   |
|  |     | <b>Form:</b>                              | Injection liquid, 10 mg/ml for subcutaneous injection.  |
|  |     | <b>Effect:</b>                            | Anaesthetises the place of injection. Takes effect after 1-2 minutes. Effective for 2-3 hours.  |
|  |     | <b>Dosage:</b>                            | The amount depends on the size of the wound.<br>Normally, 20-50 mg is used.<br>The maximum dose is 20 ml, equivalent to 200 mg.<br>See the Danish Maritime Authority's Medical Manual.  |
|  |     | <b>Side-effects:</b>                      | Allergy seldom occurs.<br>In case of an unintended injection into the bloodstream, the following side-effects may occur:<br>1. affective disturbances, dizziness, confusion, and buzzing in the ears.<br>2. visual disturbances, muscle contractions, and convulsions.<br>3. falling blood pressure and slow pulse. |
|  |     | <b>Validity:</b>                          | 3 years from the date of production (Xylocain®, AstraZeneca).   |
|  |     | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature. Not to be frozen.   |
| Lokalbedøvelse<br>Kløestillende        | 2.2 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Lidocain  |
|  |     | <b>Form:</b>                              | Gel, 20 mg/g (2%).  |
|  |     | <b>Virkning:</b>                          | Lokalbedøver hud og sårrande. Kløestillende.  |
|  |     | <b>Dosering:</b>                          | Anvendes som lokalbedøvelse ved smertende sår eller smertefulde procedurer, fx ved rengøring af brandsår eller større og forurenede sår.<br>Et tykt lag gel påsmøres huden, der herefter afdækkes lufttæt i ca. 15 minutter.<br>Virker efter ca. 15 minutter. Virker i ca. 30 minutter.                             |
|  |     | <b>Bivirkninger:</b>                      | Allergi er sjælden.   |
|  |     | <b>Holdbarhed:</b>                        | 2 år fra produktionsdato (Xylocain®, AstraZeneca).  |
|  |     | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.  |
|  |     | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .   |
| Local anaesthetics<br>Relieves itching | 2.2 | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Lidocaine   |
|  |     | <b>Form:</b>                              | Gel, 20 mg/g (2%).  |
|  |     | <b>Effect:</b>                            | Anaesthetises the skin and the edges of wounds.<br>Relieves itching.  |
|  |     | <b>Dosage:</b>                            | To be used as local anaesthetics in case of painful wounds or procedures, e.g. cleansing of burns or large, dirty wounds. A thick layer is applied to the skin, which is subsequently covered in an air-proof condition for about 15 minutes. Takes effect after about 15 minutes. Effective for about 30 minutes.  |
|  |     | <b>Side-effects:</b>                      | Allergy seldom occurs.  |
|  |     | <b>Validity:</b>                          | 2 years from the date of production (Xylocain®, AstraZeneca).   |
|  |     | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.   |
|  |     | <b>Remarks:</b>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .  |

### Grp. 3 Smertestillende midler / Analgetics

|  |     |   |  |
|--|-----|---|--|
| Feber<br>Svage smerter:<br>Hovedpine<br>Muskelsmerter<br>Ledsmarter<br>Rygsmerter<br><br>MFAG tabeller: 7, 8, 13 | 3.1 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Paracetamol  |
|  |     | <b>Form:</b>                              | Tabletter à 500 mg.  |
|  |     | <b>Virkning:</b>                          | Febernedsættende og smertestillende.   |
|  |     | <b>Dosering:</b>                          | Voksne: 1 g 3 - 4 gange dagligt.<br>Højest 4 g per døgn.   |
|  |     | <b>Bivirkninger:</b>                      | Doser over 15 - 20 g indebærer risiko for leverskade, leversvigt og død.   |
|  |     | <b>Holdbarhed:</b>                        | 5 år fra produktionsdato (Pamol Nycomed DK ApS).   |
|  |     | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.   |
|  |     | <i>Anmærkninger:</i>                      | Ingen.   |
| Fever<br>Weak pains:<br>Headache<br>Muscle pains<br>Pain in joints<br>Back pains<br><br>MFAG tables: 7, 8, 13    | 3.1 | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Paracetamol  |
|  |     | <b>Form:</b>                              | Tablets of 500 mg.   |
|  |     | <b>Effect:</b>                            | Pain relieving and reduces fever.  |
|  |     | <b>Dosage:</b>                            | Adults: 1 g three-four times daily.<br>Not more than 4 g daily.  |
|  |     | <b>Side-effects:</b>                      | Doses of more than 15-20 g involve liver damage, liver failure, and death.   |
|  |     | <b>Validity:</b>                          | 5 years from the date of production (Pamol Nycomed DK ApS).  |
|  |     | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.  |
|  |     | <i>Remarks:</i>                           | None.  |
| Moderate smerter:<br>Menstruationssmerter<br>Ledsmarter<br>Knoglesmerter<br>Knoglebrud<br>Muskelsmerter          | 3.2 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Ibuprofen  |
|  |     | <b>Form:</b>                              | Tabletter à 400 mg.  |
|  |     | <b>Virkning:</b>                          | Smertestillende og febernedsættende.   |
|  |     | <b>Dosering:</b>                          | Voksne: 400 mg 3 - 4 gange dagligt.<br>Højest 1800 mg per døgn.<br>Undtagelsesvist op til 2400 mg per døgn i kortere perioder (4 - 6 uger).  |
|  |     | <b>Bivirkninger:</b>                      | Ondt i maven.  |
|  |     | <b>Holdbarhed:</b>                        | 5 år fra produktionsdato (Ibuprofen®, Nycomed Danmark).  |
|  |     | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.   |
|  |     | <i>Anmærkninger:</i>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .<br>Bør ikke anvendes ved:<br>1. allergi for acetylsalicylsyre.<br>2. astmapatienter.<br>3. patienter i blodfortyndende behandling.<br>4. patienter med symptomer på mavesår. |

|   |     |   |   |
|---|-----|---|---|
| <p>Moderate pain:<br/>Period pain<br/>Pain in joints<br/>Bone-ache<br/>Fractures<br/>Muscle pain</p>  | 3.2 | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Ibuprofen   |
|   |     | <b>Form:</b>                              | Tablets of 400 mg.  |
|   |     | <b>Effect:</b>                            | Pain relieving and reduces fever.   |
|   |     | <b>Dosage:</b>                            | Adults: 400 mg three-four times daily. Not more than 1800 mg daily. Exceptionally, up to 2400 mg daily for shorter periods of time (4-6 weeks).   |
|   |     | <b>Side-effects:</b>                      | Stomach ache.   |
|   |     | <b>Validity:</b>                          | 5 years from the date of production (Ibumetin®, Nycomed Denmark).   |
|   |     | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.   |
|   |     | <b>Remarks:</b>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .<br>Not to be used in case of:<br>1. allergy to acetylsalicylic acid.<br>2. asthma patients.<br>3. patients in blood diluting treatment.<br>4. patients with symptoms of ulcer.   |
| <p>Stærke smerter:<br/>Store sårskader<br/>Kvæstelser<br/>Forbrændinger<br/>Knoglebrud<br/>Nyresten<br/>Galdesten<br/>Blodprop i hjertet (se førstehjælp under 9.1 Nitroglycerin)</p> | 3.4 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Morfin $\Delta$   |
|   |     | <b>Form:</b>                              | Injektionsvæske 10 mg/ml, ampuller à 1 ml.  |
|   |     | <b>Virkning:</b>                          | Smertestillende. Vækker velvære, virker afslappende. Virker efter 5 – 15 min ved intramuskulær (i.m.) eller subcutan (s.c.) injektion. Virker omgående ved intravenøs (i.v.) injektion. Virkningsvarighed: 3 -4 timer.  |
|   |     | <b>Dosering:</b>                          | Subcutant og intramuskulært (voksne). 10 mg. Kan gentages, hvis tilstrækkelig effekt udebliver. Intravenøst (voksne): 5 mg (halv ampul) injiceres langsomt. Kan gentages, hvis tilstrækkelig effekt udebliver.  |
|   |     | <b>Bivirkninger:</b>                      | Svækker vejrtrækningen. Kvalme og opkastning. Hæmmer optagelsen af medikamenter fra mavesækken. Kan give forstoppelse og hæmme blæretømningen.  |
|   |     | <b>Holdbarhed:</b>                        | 2 år fra produktionsdato, (Morfin, Skanderborg apotek).   |
|   |     | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur. Beskyttes mod lys.   |
|   |     | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Ved overdosering kan vejrtrækningen ophøre. Modgift: Naloxone (5.1). Denne bivirkning og morfins virkning i øvrigt forstærkes af andre beroligende stoffer som alkohol, sovemidler og lignende. Overdosering er især en risiko ved hurtig injektion. Overdosering sker sjældent ved almindelig dosering. Observer vejrtrækningen og ventilere om nødvendigt med ilt (1.1) på ventilationspose og maske (A.1). |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Severe pain<br>Major wounds<br>Injuries<br>Burns<br>Fractures<br>Kidney stone<br>Gall stone<br>Coronary thrombosis<br>(see first aid under 9.1<br>Glyceryl trinitrate) | 3.4   | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Morphine $\Delta$  |
|  |   | <b>Form:</b>                              | Injection liquid, 10 mg/ml, ampoules of 1 ml.  |
|  |   | <b>Effect:</b>                            | Pain relieving. Gives the patient a feeling of well-being, relaxant. Takes effect after about 5-15 minutes in case of intramuscular or subcutaneous injection.<br>Takes effect immediately in case of intravenous injection<br>Effective for 3-4 hours.  |
|  |   | <b>Dosage:</b>                            | Subcutaneously and intramuscularly (adults): 10 mg. May be repeated if the effect is not sufficient.<br>Intravenously (adults): 5 mg (1/2 ampoule) to be injected slowly. May be repeated if the effect is not sufficient.   |
|  |   | <b>Side-effects:</b>                      | Restricts breathing.<br>Nausea and vomiting.<br>Restricts the absorption of medicaments from the stomach.<br>May cause constipation and restrict bladder emptying.   |
|  |   | <b>Validity:</b>                          | 2 years from the date of production (Morphine, Skanderborg Pharmacy).  |
|  |   | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature. To be protected from light.  |
|  |   | <b>Remarks:</b>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .<br>In case of an overdose, the patient may stop breathing.<br>Antidote: Naloxone (5.1).<br>This side-effect and the effect of morphine as drowsiness may be increased by the use of other sedatives, such as alcohol, sleeping medicine, ect. Risk of overdose primarily if the injection is given too quickly. Overdoses are rare in case of normal dosage.<br>Observe the breathing and if necessary, ventilate by means of oxygen (1.1) ventilations bag and mask (A.1). |
| Inflammation i huden<br>Gigt<br>Smerter  | 3.7   | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Diclofenac   |
|  |   | <b>Form:</b>                              | Gel 11,6 mg/g.   |
|  |   | <b>Virkning:</b>                          | Smertestillende.   |
|  |   | <b>Dosering:</b>                          | Smøres på huden i et tyndt lag 3-4 gange i døgnet.   |
|  |   | <b>Bivirkninger:</b>                      | Rødme, hududslæt, hudkløe, eksem, hududslæt ved kontakt med midlet.  |
|  |   | <b>Holdbarhed:</b>                        | 3 år, fra produktionsdato (Voltaren® gel, Novatis Healthcare).   |
|  |   | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.   |
| <b>Anmærkninger:</b>   | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .<br>Må kun anvendes på intakt hud. |   |  |
| Inflammation of the skin.<br>Arthritis<br>Pain.  | 3.7   | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Diclofenac   |
|  |   | <b>Form:</b>                              | Ointment with 11,6 mg/g.   |
|  |   | <b>Effect:</b>                            | Analgesic.   |
|  |   | <b>Dosage:</b>                            | Apply a thin layer to the skin 3-4 times daily.  |
|  |   | <b>Side-effects:</b>                      | Redness, rash, itching, eczema, skin rashes when in contact with the product.  |
|  |   | <b>Validity:</b>                          | 3 years from the date of production (Voltaren®gel, Novatis Healthcare A/S).  |
|  |   | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.  |
|  |   | <b>Remarks:</b>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .<br>Only to be used on intact skin. Not to be used in the face.  |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Nyresten<br>Galdesten<br>Ledsmerter         | 3.8   | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Diclofenac   |
|   |   | <b>Form:</b>                              | Suppositorier 50 mg.   |
|   |   | <b>Virkning:</b>                          | Smertestillende.   |
|   |   | <b>Dosering:</b>                          | 50 -100 mg mg x 1 dagligt.   |
|   |   | <b>Bivirkninger:</b>                      | Nedsat appetit, sure opstød og halsbrand, kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré, luft i maven. Hovedpine, svimmelhed. Hududslæt og hudkløe.  |
|   |   | <b>Holdbarhed:</b>                        | 3 år fra produktionsdato, (Voltaren, 2care4).  |
|   |   | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur - ikke over 30 °C  |
|   |   | <i>Anmærkninger:</i>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .<br>Bør ikke anvendes ved:<br>1. allergi for acetylsalicylsyre.<br>2. astmapatienter.<br>3. patienter i blodfortyndende behandling.<br>4. patienter med symptomer på mavesår. |
| Kidney stone<br>Gall stone<br>Pain in joint | 3.8   | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Diclofenac   |
|   |   | <b>Form:</b>                              | Suppositorie 50 mg.  |
|   |   | <b>Effect:</b>                            | Analgesic.   |
|   |   | <b>Dosage:</b>                            | 50 - 100 mg ones daily.  |
|   |   | <b>Side-effects:</b>                      | Loss of appetite, heartburn and acid regurgitation, nausea and vomiting, abdominal pain, diarrhea, flatulence, headache, dizziness, skin rash, itchy skin.   |
|   |   | <b>Validity:</b>                          | 3 years from the date of production (Voltaren,2care4).   |
|   |   | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature - not above 30 degrees.   |
| <i>Remarks:</i>                             | Consult <i>Radio Medical</i> .<br>Not to be used in case of:<br>1. Allergy to acetylsalicylic acid.<br>2. asthma patients.<br>3. patients in blood diluting treatment.<br>4. patients with symptoms of ulcer. |   |  |
| Stærke smerter:                             | 3.9   | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Morfin $\Delta$  |
|   |   | <b>Form:</b>                              | Tablet 10 mg.  |
|   |   | <b>Virkning:</b>                          | Smertestillende  |
|   |   | <b>Dosering:</b>                          | 10 – 30 mg hver 4. time  |
|   |   | <b>Bivirkninger:</b>                      | Kvalme, forstoppelse, opkastningfeber, humørsvingninger og lavt blodtryk. Svimmelhed, hallucinationer, nedsat verjtrækning og mave smerter.  |
|   |   | <b>Holdbarhed:</b>                        | 4 år fra produktionsdato (Morfin, EQL Pharma AB)   |
|   |   | <b>Opbevaring:</b>                        | Normal temperatur. Dog under 25 °C   |
|   |   | <i>Anmærkninger:</i>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .  |
| Severe pain                                 | 3.9   | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Morphine $\Delta$  |
|   |   | <b>Form:</b>                              | Tablet 10 mg.  |
|   |   | <b>Effect:</b>                            | Pain relieving   |
|   |   | <b>Dosage:</b>                            | 10 – 30 mg every 4 hours.  |
|   |   | <b>Side-effects:</b>                      | Nausea, constipation, vomiting, fever, mood swings and low blood pressure. Dizziness, hallucinations, decreased circulation and abdominal pain.  |
|   |   | <b>Validity:</b>                          | 4 years from production date ( Morphine, EQL Pharma AB)  |
|   |   | <b>Storage:</b>                           | Normale temperature – not above 25 °C  |
|   |   | <i>Remarks:</i>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .   |

## Grp. 4 Midler mod allergi, shock og søsyge / Agents for Allergy, Shock and Seasickness

|  |     |   |   |
|--|-----|---|---|
| Allergisk shock  | 4.1 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Adrenalin   |
|  |     | <b>Form:</b>                              | Injektionsvæske 1 mg/ml, ampuller à 1 ml til intramuskulær injektion.   |
|  |     | <b>Virkning:</b>                          | Øger pulsen, hjertets pumpekraft og blodtrykket. Sammenækning af blodkar. Virker 2 - 5 minutter efter intramuskulær injektion. Omsættes meget hurtigt. Halveringstiden i blodet er 2 - 3 minutter.                                      |
|  |     | <b>Dosering:</b>                          | Omgående (voksne): 0,6 mg (godt en halv ampul) dybt intramuskulært. Kan eventuelt gentages, hvis virkningen udebliver.  |
|  |     | <b>Bivirkninger:</b>                      | Blodtryksstigning, hurtig puls, rysten og svimmelhed.   |
|  |     | <b>Holdbarhed:</b>                        | 2 år fra produktionsdato (Adrenalin®, 2care4),  |
|  |     | <b>Opbevaring:</b>                        | Læs indlægsseddel   |
|  |     | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Er livsfarligt at anvende ved shock forårsaget af blod- eller væsketab.   |
| Allergic shock   | 4.1 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Epinephrine   |
|  |     | <b>Form:</b>                              | Injection liquid, 1 mg/ml, ampoules of 1 ml for intramuscular injection.  |
|  |     | <b>Effect:</b>                            | Increases the pulse, the pumping power of the heart, and the blood pressure. Contraction of blood vessels. Takes effect 2-5 minutes after intramuscular injection. Transformed very quickly. The half-life in the blood is 2-3 minutes. |
|  |     | <b>Dosage:</b>                            | Immediately (adults): 0.6 mg (about half an ampoule) given deep intramuscular. May be repeated if the effect is insufficient.   |
|  |     | <b>Side-effects:</b>                      | High blood pressure, rapid pulse, shivering, and dizziness.   |
|  |     | <b>Validity:</b>                          | 2 years from the date of production (Adrenalin®, 2care4)  |
|  |     | <b>Storage:</b>                           | Read packet insert  |
|  |     | <b>Remarks:</b>                           | Consult <i>Radio Medical</i> . Potentially fatal if used to treat shock caused by loss of blood or fluid.   |
| Allergi<br>Høfeber<br>Nældefeber<br>Allergisk ansigtsødem<br>Allergisk astma | 4.2 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Acrivastin  |
|  |     | <b>Form:</b>                              | Kapsler à 8 mg.   |
|  |     | <b>Virkning:</b>                          | Modvirker allergi. Maksimal virkning efter 1½-2 timer. Virkningsvarighed op til 8 timer.  |
|  |     | <b>Dosering:</b>                          | Voksne: 8 mg efter behov. Maksimalt 3 gange per døgn.   |
|  |     | <b>Bivirkninger:</b>                      | Døsighed kan forekomme og forstærkes af alkohol og beroligende midler, herunder sovemidler.   |
|  |     | <b>Holdbarhed:</b>                        | 3 år fra produktionsdato (Benadryl®, McNeil ApS).   |
|  |     | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.  |
|  |     | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Lægemidlet er ikke mærket med $\Delta$ men enkelte personer sløves alligevel så meget, at det er uforvarsligt med vagttjeneste eller maskinbetjening. Ved lungesympotomer: Se tillige gruppe 15.  |

**Grp. 4 Midler mod allergi, shock og søsyge / Agents for Allergy, Shock and Seasickness**

(continued)

|  |     |   |  |
|--|-----|---|--|
| Allergy<br>Hay fever<br>Urticaria<br>Allergic face oedema<br>Allergic asthma | 4.2 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Acrivastine  |
|  |     | <b>Form:</b>                              | Capsule of 8 mg.   |
|  |     | <b>Effect:</b>                            | Eases allergic symptoms.<br>Maximum effect after 1.5-2 hours.<br>Effective for up to 8 hours.  |
|  |     | <b>Dosage:</b>                            | Adults: 8 mg when required. Maximum three times daily.   |
|  |     | <b>Side-effects:</b>                      | Drowsiness may occur and is increased by the use of alcohol and sedatives, including sleeping medicine.  |
|  |     | <b>Validity:</b>                          | 3 years from the date of production (Benadryl®, McNeil Denmark ApS).   |
|  |     | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.  |
|  |     | <i>Remarks:</i>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .<br>The medicament is not marked with a $\Delta$ , but some patients experience a high degree of drowsiness, making bridge duty and operations of machinery unsafe. In case of symptoms of from the lungs: See group 15. |
| Allergi<br>Allergisk astma<br>Allergisk ansigtsødem                          | 4.3 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Hydrocortison  |
|  |     | <b>Form:</b>                              | Injektionssubstans 100 mg i to-delt hætteglas med 2 ml sterilt vand til intramuskulært eller intravenøst brug.   |
|  |     | <b>Virkning:</b>                          | Modvirker allergi og inflammationer.<br>Virkningen indtræder først 4 - 6 timer efter injektion, hvorfor anden akut behandling skal dække dette tidsrum.  |
|  |     | <b>Dosering:</b>                          | Voksne: 100 mg intramuskulært eller intravenøst som éngangsdosis.  |
|  |     | <b>Bivirkninger:</b>                      | Ved længere tids anvendelse:<br>Forstyrrelser i sukker, vand- og saltstofskeft og i kirtlernes funktion. Sløring og/eller aktivering af infektioner. Eufori, sindsyge og søvnløshed. Ondt i maven og mavesår.  |
|  |     | <b>Holdbarhed:</b>                        | 5 år fra produktionsdato (Solu-Cortef®, Pfizer ApS).<br>Brugsfærdig injektionsvæske holdbart i 72 timer, hvis opbevaret i køleskab.  |
|  |     | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur. Beskyttes mod lys.  |
|  |     | <i>Anmærkninger:</i>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .<br>Ved lungesympotomer: Se tillige gruppe 15.  |

**Grp. 4 Midler mod allergi, shock og søsyge / Agents for Allergy, Shock and Seasickness**

(continued)

|  |     |   |   |
|--|-----|---|---|
| Allergy<br>Allergic asthma<br>Allergic face oedema | 4.3 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Hydrocortisonsuccinate  |
|  |     | <b>Form:</b>                              | Injection substance, 100 mg in capped vial divided into two sections, with 2 ml sterile water for intramuscular or intravenous use.   |
|  |     | <b>Effect:</b>                            | Eases symptoms of allergy and inflammations. Does not take effect until 4-6 hours after the injection. Other acute treatment to cover this period is needed.  |
|  |     | <b>Dosage:</b>                            | Adults: 100 mg given intramuscularly or intravenously as a single dose.   |
|  |     | <b>Side-effects:</b>                      | If used for a extended period: Disturbances in the sugar, water and salt metabolism and in the glandula functions. Masking and/or activation of infections. Euphoria, mental illness and insomnia. Stomache ache and ulcer. |
|  |     | <b>Validity:</b>                          | 5 years from the date of production (Solu-Cortef®, Pfizer ApS). Injection liquid ready for use, valid for 72 hours, if stored cold.   |
|  |     | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature. To be kept out of daylight. Injection liquid ready for use, to be stored refrigerated.  |
|  |     | <i>Remarks:</i>                           | Consult <i>Radio Medical</i> . In case of symptoms from lungs See also group 15.  |
| Søsyge   | 4.5 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Cinnarizin $\Delta$   |
|  |     | <b>Form:</b>                              | Tabletter à 25 mg.  |
|  |     | <b>Virkning:</b>                          | Modvirker søsyge.   |
|  |     | <b>Dosering:</b>                          | 25 mg ½ time før effekt ønskes. Efter behov kan derefter tages 12,5 mg hver 6. time.  |
|  |     | <b>Bivirkninger:</b>                      | Døsighed.   |
|  |     | <b>Holdbarhed:</b>                        | 5 år fra produktionsdato (Sepan®, Paranova Danmark A/S).  |
|  |     | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.  |
|  |     | <i>Anmærkninger:</i>                      | Må ikke gives til patienter med grøn stær eller vandladningsbesvær (forstørret prostata).   |
| Seasickness  | 4.5 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Cinnarizine $\Delta$  |
|  |     | <b>Form:</b>                              | Tablets of 25 mg.   |
|  |     | <b>Effect:</b>                            | Prevent seasickness.  |
|  |     | <b>Dosage:</b>                            | 25 mg ½hour before wanted effect. If needed, 12,5 mg may be given subsequently. every 6 hours.  |
|  |     | <b>Side-effects:</b>                      | Drowsiness.   |
|  |     | <b>Validity:</b>                          | 5 years from the date of production (Sepan®, Paranova Danmark A/S).   |
|  |     | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.   |
|  |     | <i>Remarks:</i>                           | Do not administer to patients with glaucoma or urinating problems (enlarged prostate).  |

**Grp. 4 Midler mod allergi, shock og søsyge / Agents for Allergy, Shock and Seasickness**

(continued)

|   |     |   |  |
|---|-----|---|--|
| Allergiske reaktioner, hævelser osv. Oral behandling          | 4.6 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Prednisolon  |
|   |     | <b>Form:</b>                              | Tabletter á 25 mg.                                   |
|   |     | <b>Virkning:</b>                          | Bremser allergiske reaktioner, hævelser.             |
|   |     | <b>Dosering:</b>                          | Efter ordination af <i>Radio Medical</i> .           |
|   |     | <b>Bivirkninger:</b>                      | Forhøjet tryk i øjet, slører infektion, infektion.   |
|   |     | <b>Holdbarhed:</b>                        | 2 år fra produktions dato (Prednisolon, Actavis).    |
|   |     | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.                               |
|   |     | <i>Anmærkninger:</i>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .                |
| Allergic reactions, swellings etc. Oral treatment preferred.. | 4.6 | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Prenisolon   |
|   |     | <b>Form:</b>                              | Tablets of 25 mg.                                    |
|   |     | <b>Effect:</b>                            | Brakes allergic reation, swelling etc.               |
|   |     | <b>Dosage:</b>                            | After precipstion from <i>Radio Medical</i> .        |
|   |     | <b>Side-effects:</b>                      | Glaucoma, blurs infections, infektions.              |
|   |     | <b>Validity:</b>                          | 2 years from production date (Prednisolon, Actavis). |
|   |     | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.                                  |
|   |     | <i>Remarks:</i>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .                       |

## Grp. 5. Antidoter / Antidotes

|   |     |   |  |
|---|-----|---|--|
| <p>Modgift ved overdosering af morfin</p> <p>Førstehjælp:<br/>Ved udsættende vejtrækning understøttes manuelt med ilt på ballon og maske 15 l ilt/minut.</p>                            | 5.1 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Naloxon  |
|   |     | <b>Form:</b>                              | Injektionsvæske 0,4 mg/ml, ampuller à 1 ml til intramuskulær injektion.  |
|   |     | <b>Virkning:</b>                          | Naloxon ophæver morfins (bi)virkning. Virker 2 - 3 minutter efter intramuskulær injektion. Virkningsvarighed: Op til 4 timer.  |
|   |     | <b>Dosering:</b>                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naloxon voksne: Der gives omgående 0,8 mg (2 ampuller) intramuskulært.</li> <li>2. Hvis virkningen udebliver kan behandlingen gentages efter 5 minutter.</li> </ol>  |
|   |     | <b>Bivirkninger:</b>                      | Rysten, utilpashed og opkastninger (abstinenssymptomer).   |
|   |     | <b>Holdbarhed:</b>                        | 3 år fra produktionsdato (Naloxon, B. Braun).  |
|   |     | <b>Opbevaring:</b>                        | Beskyttes mod lys.   |
|   |     | <i>Anmærkninger:</i>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .  |
| <p>Antidote to be administered in case of an overdose of morphine</p> <p>First Aid:<br/>If the patient stops breathing, assist breathing manually with oxygen 15l/minute on a mask.</p> | 5.1 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Naloxone   |
|   |     | <b>Form:</b>                              | Injection liquid, 0.4 mg/ml, ampoules of 1 ml for intramuscular injection.   |
|   |     | <b>Effect:</b>                            | Naloxone counteracts the (side)-effects of morphine. Takes effect 2-3 minutes after intramuscular injection. Effective for up to 4 hours.  |
|   |     | <b>Dosage:</b>                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naloxone adults: 0.8 mg (2 ampoules) is given immediately intramuscular.</li> <li>2. In case of no effect, the treatment may be repeated after 5 minutes.</li> </ol> |
|   |     | <b>Side-effects:</b>                      | Shivering, feeling unwell, and vomiting.   |
|   |     | <b>Validity:</b>                          | 3 years from the date of production (Naloxon B. Braun).  |
|   |     | <b>Storage:</b>                           | To be protected from daylight.   |
|   |     | <i>Remarks:</i>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .   |

|  |     |   |  |
|--|-----|---|--|
| Insulintilfælde<br>Insulinshock<br>Lavt blodsukker     | 5.2 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Glucagon   |
|  |     | <b>Form:</b>                              | Ready-set bestående af:<br>Injektionssubstans Glucagon 1 mg i hætteglas og sprøjte med 1 ml sterilt vand til intramuskulært brug.  |
|  |     | <b>Virkning:</b>                          | Frigør sukkerreserver fra leveren.<br>Virker normalt inden 5 - 10 minutter.<br>Virkningsvarighed: 10 - 40 minutter.  |
|  |     | <b>Dosering:</b>                          | Voksne: 1 mg intramuskulært. Kan evt. gentages efter 10 - 15 minutter.<br>Når patienten er kommet til bevidsthed gives brød og sød saft.   |
|  |     | <b>Bivirkninger:</b>                      | Kvalme og opkastninger kan forekomme.<br>Kan udløse hjertekrampe hos hjertesygge. Hjertekrampe behandles med glycerylnitrat spray (9.1).   |
|  |     | <b>Holdbarhed:</b>                        | Ved almindelig temperatur: 18 måneder fra produktionsdato (GlucaGen® HypoKit, Novo Nordisk).<br>Ved 2 - 8° C: 36 måneder fra produktionsdato.<br>Den blandede opløsning skal anvendes umiddelbart.   |
|  |     | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur eller 2 - 8° C. (GlucaGen® HypoKit, Novo Nordisk).   |
|  |     | <i>Anmærkninger:</i>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .<br>Dersom den blandede opløsning er uklar eller med krystaller, må blandingen ikke anvendes.   |
| Hypoglycaemic coma<br>Insulin shock<br>Low blood sugar | 5.2 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Glucagon   |
|  |     | <b>Form:</b>                              | Ready-set consisting of:<br>Injection substance Glucagon, 1 mg in a capped vial and a syringe with 1 ml of sterile water for intramuscular use.  |
|  |     | <b>Effect:</b>                            | Releases sugar reserves from the liver.<br>Normally, takes effect within 5-10 minutes.<br>Effective for 10-40 minutes.   |
|  |     | <b>Dosage:</b>                            | Adults: 1 mg intramuscularly. May be repeated after 10-15 minutes.<br>When the patient regains consciousness, give some bread and sweet juice.   |
|  |     | <b>Side-effects:</b>                      | Nausea and vomiting may occur.<br>May cause angina pectoris in people with heart diseases.<br>Angina pectoris is treated with glyceryl trinitrate spray (9.1).                                       |
|  |     | <b>Validity:</b>                          | At room temperature: 18 months from the date of production (GlucaGen® HypoKit, Novo Nordisk).<br>At 2-8°C: 36 months from the date of production.<br>The mixed dissolution must be used immediately. |
|  |     | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature or 2-8° C. (GlucaGen® HypoKit, Novo Nordisk).   |
|  |     | <i>Remarks:</i>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .<br>If the mixed dissolution is cloudy or contains crystals, it must not be used.  |



## Grp. 6 Midler mod psykiske lidelser og kramper / Mental disorder and Convulsion

|   |     |   |   |
|---|-----|---|---|
| Angst og urotilstande<br>Alkoholabstinenser<br>Forebyggelse af kramper<br>Ledskred og brud<br><br>1. valgspræparat ved akut sindssyge (alternativt anvendes klysma (6.3))   | 6.2 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Diazepam <span style="color: red;">Δ</span>   |
|   |     | <b>Form:</b>                              | Tabletter à 5 mg.   |
|   |     | <b>Virkning:</b>                          | Stærkt sløvende og muskelafslappende. Dæmper angst, uro og rastløshed. Virker efter 30 minutter. Udskilles meget langsomt (Halveringstid: 20 - 50 timer). Forstærker virkningen af morfin, haloperidol, alkohol og andre sløvende medikamenter.                           |
|   |     | <b>Dosering:</b>                          | 5 mg x 3 dagligt.<br>Akut sindssyge: Dosis efter aftale med <i>Radio Medical</i> .<br>Se også 6.4.  |
|   |     | <b>Bivirkninger:</b>                      | Vanedannende. Døsighed, svimmelhed, forvirring, hukommelsessvigt og balanceforstyrrelser.   |
|   |     | <b>Holdbarhed:</b>                        | 5 år fra produktionsdato (Diazepam, Nycomed Danmark).   |
|   |     | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.  |
|   |     | <i>Anmærkninger:</i>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .   |
| Anxiety and states of restlessness<br>Alcoholic withdrawal symptoms<br>Prevention of convulsions<br>Dislocations and fractures<br><br>First choice of medicament in case of acute mental disease (alternatively, Enema (6.3) are used.) | 6.2 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Diazepam <span style="color: red;">Δ</span>   |
|   |     | <b>Form:</b>                              | Tablets of 5 mg.  |
|   |     | <b>Effect:</b>                            | Strongly sedative and muscle-relaxant. Decreases anxiety and restlessness. Takes effect after 30 minutes. Is excreted very slowly (half-life: 20-50 hours). Increases the effect of morphine, haloperidole, alcohol and other sedatives.                                  |
|   |     | <b>Dosage:</b>                            | 5 mg three times daily.<br>Acute mental disease: Dosage after consultation with <i>Radio Medical</i> . See also 6.4.  |
|   |     | <b>Side-effects:</b>                      | Addictive. Drowsiness, dizziness, confusion, lapse of memory, and balance disturbances.   |
|   |     | <b>Validity:</b>                          | 5 years from the date of production (Diazepam, Nycomed Danmark).  |
|   |     | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.   |
|   |     | <i>Remarks:</i>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .  |
| Universelle kramper<br>Kramper fra forgiftninger<br>Abstinenskramper<br>Epilepsi<br><br>Akut sindssyge  | 6.3 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Diazepam <span style="color: red;">Δ</span>   |
|   |     | <b>Form:</b>                              | Klysma, 4 mg/ml, til anvendelse i endetarmen.   |
|   |     | <b>Virkning:</b>                          | Stærkt sløvende og muskelafslappende. Dæmper angst, uro og rastløshed. Virker 5 - 10 minutter efter rektal administration. Udskilles meget langsomt (Halveringstid: 20 - 50 timer). Forstærker virkningen af morfin, haloperidol, alkohol og andre sløvende medikamenter. |
|   |     | <b>Dosering:</b>                          | Efter aftale med <i>Radio Medical</i> - 1 klysma tømmes ind i endetarmen.   |
|   |     | <b>Bivirkninger:</b>                      | Døsighed, svimmelhed, forvirring, hukommelsessvigt og balanceforstyrrelser.   |
|   |     | <b>Holdbarhed:</b>                        | 2,5 år fra produktionsdato (Stesolid®, Actavis A/S). Dog maksimalt 1 år efter anbrud af aluminiumsposen.  |
|   |     | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.  |
|   |     | <i>Anmærkninger:</i>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i>   |

**Grp. 6 Midler mod psykiske lidelser og kramper / Mental disorder and Convulsion (continued)**

|   |     |   |   |
|---|-----|---|---|
| Universal convulsions<br>Convulsions caused by poisoning<br>Withdrawal convulsions<br>Epilepsy<br><br>Acute mental illness  | 6.3 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Diazepam $\Delta$   |
|   |     | <b>Form:</b>                              | Enema, 4 mg /ml, for insertion into the rectum.   |
|   |     | <b>Effect:</b>                            | Strong sedative and muscle-relaxant. Decreases anxiety and restlessness.<br>Takes effect 5-10 minutes after rectal administration. Is excreted very slowly (half-life: 20-50 hours). Increases the effect of morphine, haloperidole, alcohol and other sedatives. |
|   |     | <b>Dosage:</b>                            | After consult of <i>Radio Medical</i> - 1 enema is emptied into the rectum.   |
|   |     | <b>Side-effects:</b>                      | Drowsiness, dizziness, confusion, lapse of memory, and balance disturbances.  |
|   |     | <b>Validity:</b>                          | 2,5 years from the date of production (Stesolid®, Actavis A/ S). However, maximum 1 year after having opened the aluminiumbag.  |
|   |     | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.   |
|   |     | <i>Remarks:</i>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .  |
| 2. valgspræparat ved akut sindssyge præget af mani, vildskab, psykisk og Motorisk uro, angst, vrangforestillinger og hallucinationer.<br><br>Kvalme og opkastninger                               | 6.4 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Haloperidol $\Delta$  |
|   |     | <b>Form:</b>                              | Injektionsvæske 5 mg/ml, ampuller à 1 ml til intramuskulær injektion.   |
|   |     | <b>Virkning:</b>                          | Afdæmper symptomerne ved sindssyge.<br>Dæmper kvalme og opkastninger.   |
|   |     | <b>Dosering:</b>                          | Akut sindssyge: 5 - 10 mg intramuskulært. Kan eventuelt gentages 3 eller flere gange dagligt.<br>Behandlingen kan eventuelt forstærkes med diazepam (6.2/ 6.3).   |
|   |     | <b>Bivirkninger:</b>                      | Den sløvende effekt forstærkes af alkohol, morfin og andre sløvende midler.   |
|   |     | <b>Holdbarhed:</b>                        | 5 år fra produktionsdato (Serenase®, Janssen-Cilag).  |
|   |     | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.  |
|   |     | <i>Anmærkninger:</i>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .   |
| Second choice of medicament in case of acute mental illness characterized by mania, wildness, mental and motoric restlessness, anxiety, delusions, and hallucinations.<br><br>Nausea and vomiting | 6.4 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Haloperidole $\Delta$   |
|   |     | <b>Form:</b>                              | Injection liquid 5 mg/ml, ampoules of 1 ml for intramuscular injection.   |
|   |     | <b>Effect:</b>                            | Restricts the symptoms of mental disease.<br>Reduces nausea and vomiting.   |
|   |     | <b>Dosage:</b>                            | Acute mental disease: 5-10 mg intramuscularly. May be repeated three times daily or more.<br>The treatment may be enhanced by the use of diazepam (6.2/6.3).  |
|   |     | <b>Side-effects:</b>                      | The sedative effect is increased by alcohol, morphine, and other sedatives.   |
|   |     | <b>Validity:</b>                          | 5 years from the date of production (Serenase®, Janssen-Cilag).   |
|   |     | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.   |
|   |     | <i>Remarks:</i>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .  |

**Grp. 6 Midler mod psykiske lidelser og kramper / Mental disorder and Convulsion (continued)**

|                                       |     |   |  |
|---------------------------------------|-----|---|--|
| Søvnløshed<br>Indsovningsbesvær       | 6.5 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Zolpidem $\Delta$  |
|                                       |     | <b>Form:</b>                              | Tabletter à 10 mg.   |
|                                       |     | <b>Virkning:</b>                          | Stærkt sløvende.<br>Virker hurtigt efter indtagelse.<br>Virkningen varer op til 6 timer.<br>Virkningen forstærkes af andre sløvende stoffer, herunder alkohol. |
|                                       |     | <b>Dosering:</b>                          | Voksne. 10 mg 15-30 min. før sengetid.   |
|                                       |     | <b>Bivirkninger:</b>                      | Kvalme, opkastning, diarré.<br>Hovedpine, koncentrationsbesvær, konfusion,<br>hukommelsesbesvær, svimmelhed, døsigthed,<br>hudreaktioner, dobbeltsyn.          |
|                                       |     | <b>Holdbarhed:</b>                        | 5 år fra produktionsdato (Zolpidem Hexal A/S).   |
|                                       |     | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.   |
|                                       |     | <i>Anmærkninger:</i>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .  |
| Insomnia<br>Difficulty falling asleep | 6.5 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Zolpidem $\Delta$  |
|                                       |     | <b>Form:</b>                              | Tablets of 10 mg.  |
|                                       |     | <b>Effect:</b>                            | Strong sedative.<br>Rapid effect after ingestion.<br>Effective up to 6 hours.<br>The effect is increased by the use of other sedatives including alcohol.      |
|                                       |     | <b>Dosage:</b>                            | Adults. 10 mg 15-30 minutes before bedtime.  |
|                                       |     | <b>Side-effects:</b>                      | Nausea, vomiting, diarrhea.<br>Headache, difficulty concentrating, confusion, memory loss,<br>dizziness, drowsiness, skin reactions, double vision.            |
|                                       |     | <b>Validity:</b>                          | 5 years from the date of production (Zolpidem Hexal A/S).  |
|                                       |     | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.  |
|                                       |     | <i>Remarks:</i>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .   |

| Grp. 7 Midler mod infektioner / Infections  |     |   |  |
|---|-----|---|--|
| Halsbetændelse<br>Mundhuleinfektioner<br>Bihulebetændelse<br>Mellemøre-<br>betændelse<br>Lungebetændelse                | 7.1 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Phenoxymethylpenicillin  |
|   |     | <b>Form:</b>                              | Tabletter à 660 - 800 mg (ca.1 mill. IE).  |
|   |     | <b>Virkning:</b>                          | Dræber de hyppigst forekommende bakterier, der forårsager infektioner i luftvejene.  |
|   |     | <b>Dosering:</b>                          | 400-800 mg × 2 – 4 dagligt.  |
|   |     | <b>Bivirkninger:</b>                      | Kvalme, diarré og hududslæt.<br>Sjældent ses overfølsomhedsshock.  |
|   |     | <b>Holdbarhed:</b>                        | 3 år fra produktionsdato (Primcillin®, MEDA).  |
|   |     | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.   |
|   |     | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .<br>Overfølsomhedsshock optræder meget sjældent, og som regel senest 30 minutter efter indgift.<br>Behandling: Adrenalin 0.6 mg intramuskulært (4.1). |
| Inflammation of the throat<br>Infections of the oral cavity<br>Sinusitis<br>Inflammation of the middle ear<br>Pneumonia | 7.1 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Phenoxymethylpenicillin  |
|   |     | <b>Form:</b>                              | Tablets of 660 - 800 mg (approx. 1 MIU).   |
|   |     | <b>Effect:</b>                            | Kills the most common bacteria causing infections of the respiratory tract.  |
|   |     | <b>Dosage:</b>                            | 400-800 mg × 2-4 times daily.  |
|   |     | <b>Side-effects:</b>                      | Vomiting, diarrhoea and rash.<br>Rarely allergic shock.  |
|   |     | <b>Validity:</b>                          | 3 years from the date of production (Primcillin®, MEDA).   |
|   |     | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.  |
|   |     | <b>Remarks:</b>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .<br>Allergic shock is very rare and usually occurs within 30 minutes after administration.<br>Treatment: Adrenaline 0.6mg intramuscular (4.1).               |
| Lungebetændelse efter inhalation af giftige kemiske stoffer<br>Andre infektioner  | 7.2 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Amoxicillin  |
|   |     | <b>Form:</b>                              | Kapsler eller tabletter à 500 mg.  |
|   |     | <b>Virkning:</b>                          | Modvirker inflammation.  |
|   |     | <b>Dosering:</b>                          | 375-750 mg 2 gange daglig.   |
|   |     | <b>Bivirkninger:</b>                      | Feber, kvalme, opkastning, sure opstød, diarré, hudkløe, hududslæt.  |
|   |     | <b>Holdbarhed:</b>                        | 4 år fra produktionsdato (Imadrax, Sandoz A/S).  |
|   |     | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.   |
|   |     | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .<br>Overfølsomhedsshock optræder meget sjældent og som regel senest 30 minutter efter indgift. Behandling: Adrenalin 0,6 mg intramuskulært.(4.1)      |
| Pneumonia after inhalation of poisonous chemical substances<br>Other infections   | 7.2 | <b>Active Pharmaceutical Ingredients:</b> | Amoxicilline   |
|   |     | <b>Form:</b>                              | Capula or tablets of 500 mg.   |
|   |     | <b>Effect:</b>                            | Prevent inflammation.  |
|   |     | <b>Dosage:</b>                            | 375-750 mg twice daily.  |
|   |     | <b>Side-effects:</b>                      | Fever, nausea, vomiting, heartburn, diarrhoea, rash and urticaria, Rarely allergic shock.  |
|   |     | <b>Validity:</b>                          | 4 years from the date of production (Imadrax, Sandoz A/S).   |
|   |     | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.  |
|   |     | <b>Remarks:</b>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .<br>Allergic shock is very rare and usually it occurs within 30 minutes after administration.<br>Treatment: Adrenaline 0.6 mg intramuscular (4.1).           |

| Grp. 7 Midler mod infektioner / Infections  |     | (continued)                               |  |
|---|-----|---|--|
| HalsbyldTandbyld<br>Knogleinfektion<br>Underlivsinfektioner<br>Tarminfektioner<br>Blindtarms-<br>betændelse<br><br>(tjek urinstiks G.1)   | 7.6 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Metronidazol   |
|   |     | <b>Form:</b>                              | Tabletter à 500 mg.  |
|   |     | <b>Virkning:</b>                          | Bakteriedræbende.  |
|   |     | <b>Dosering:</b>                          | 500 mg x 3 dagligt.  |
|   |     | <b>Bivirkninger:</b>                      | Mavekneb, smagsforstyrrelser, hovedpine, hududslet og  |
|   |     | <b>Holdbarhed:</b>                        | 5 år fra produktionsdato (Metronidazol, Actavis).  |
|   |     | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.   |
|   |     | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .<br>Bør ikke anvendes til gravide.<br>Anvendes ofte i kombination med andre antibiotika, f.eks. Ciprofloxacin (7.8) eller Ceftriaxon (7.9).<br>Må ikke anvendes sammen med 15.1 Dextromethorphan. |
| Boil in the throat<br>Tooth abscess<br><br>Bone infection<br>Infection of female<br>reproductions organs<br>Abdominal infections<br>Intestinal infections<br>Appendicitis<br><br>(Check dipstick G.1) | 7.6 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Metronidazole  |
|   |     | <b>Form:</b>                              | Tabletter of 500 mg.   |
|   |     | <b>Effect:</b>                            | Kills bacteria.  |
|   |     | <b>Dosage:</b>                            | 500 mg three times daily   |
|   |     | <b>Side-effects:</b>                      | Bellyache, altered sense of taste, headache, rash, and dizziness. The urine may be coloured black. May   |
|   |     | <b>Validity:</b>                          | 5 years from the date of production (Metronidazol, Actavis).   |
|   |     | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.  |
|   |     | <b>Remarks:</b>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .<br>Should not be given to pregnant patients.<br>Often used in combination with other antibiotics, e.g. Ciprofloxacin (7.8) or Ceftriaxon (7.9).<br>May not be used with 15.1 Dextromethorphan.          |
| Halsbyld<br>Tandbyld<br><br>Knogleinfektion<br><br>Underlivsinfektioner<br>Tarminfektioner<br>Blindtarmsbetændelse  | 7.7 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Metronidazol   |
|   |     | <b>Form:</b>                              | Stikpille à 500 mg.  |
|   |     | <b>Virkning:</b>                          | Bakteriedræbende.  |
|   |     | <b>Dosering:</b>                          | 500 mg x 3 daglig.   |
|   |     | <b>Bivirkninger:</b>                      | Kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré, forstoppelse, og smagsforstyrrelse. Mørkfarvet urin. Kan virke som antabus ved samtidig indtagelse af alkohol.  |
|   |     | <b>Holdbarhed:</b>                        | 3 år fra produktionsdato (Flagyl®, Sanofi-aventis).  |
|   |     | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.   |
|   |     | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .<br>Kan om nødvendigt anvendes, til gravide.<br>Anvendes ofte i kombination med andre antibiotika, fx Ciprofloxacin (7.8) eller Ceftriaxon (7.9). Må ikke anvendes sammen med 15.1 Dexofan.       |

| Grp. 7 Midler mod infektioner / Infections  |     | (continued)                               |  |
|---|-----|---|--|
| Boil in the throat<br>Tooth abscess<br><br>Bone infection<br>Infection of female reproductions organs<br>Abdominal infections<br>Intestinal infections<br>Appendicitis<br>(Check dipstick G.1)          | 7.7 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Metronidazol   |
|   |     | <b>Form:</b>                              | Suppository of 500 mg.   |
|   |     | <b>Effect:</b>                            | Kills bacteria.  |
|   |     | <b>Dosage:</b>                            | 500 mg three times daily.  |
|   |     | <b>Side-effects:</b>                      | Nausea vomiting, abdominal pain, diarrhea, constipation, and taste disturbance.<br>Dark colored urine. May cause a reaction similar to Antabuse in connection with alcohol.  |
|   |     | <b>Validity:</b>                          | 3 years from productions date (Flagyl®, Sanofi-aventis)  |
|   |     | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.  |
|   |     | <b>Remarks:</b>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .<br>May be used during pregnancy, if nessasary.<br>Often used in combination with other antibiotics e.g. Ciprofloxacin (7.8) or Ceftriaxon (7.9).<br>May not be used with 15.1 Dextromethorphan. |
| Tandbyld<br>Halsbyld<br>Svær bronkitis<br>Lungepest<br><br>Akut diarré<br>Kolera<br>Dysenteri<br>Blindtarmsbetændelse<br>Gonoré<br>Urinrørsbetændelse<br>Nyrebækkenbetændelse<br>(tjek urinstiks G.1)   | 7.8 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Ciprofloxacin  |
|   |     | <b>Form:</b>                              | Tabletter à 250 mg.  |
|   |     | <b>Virkning:</b>                          | Dræber bakterier.  |
|   |     | <b>Dosering:</b>                          | 250 - 750 mg x 2 dagligt.  |
|   |     | <b>Bivirkninger:</b>                      | Mavekneb, kvalme, opkastninger, madlede, hovedpine, svimmelhed, træthed og kramper, muskel-, led- og seneømhed, allergi, overfølsomhedsreaktion ved samtidig   |
|   |     | <b>Holdbarhed:</b>                        | 5 år fra produktionsdato (Cifin, PharmaCoDane ApS).  |
|   |     | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.   |
|   |     | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .<br>Gives ved mange infektioner i kombination med metronidazol (7.6 eller 7.7).<br>Må ikke gives til gravide eller ammende.   |
| Boil in the throat<br>Tooth abscess<br>Severe bronchitis<br>Pneumonic plague<br>Acute diarrhoea<br>Cholera<br>Dysentery<br>Appendicitis<br>Gonorrhoea<br>Urethritis<br>Pyelitis<br>(Check dipstick G.1) | 7.8 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Ciprofloxacin  |
|   |     | <b>Form:</b>                              | Tablets of 250 mg.   |
|   |     | <b>Effect:</b>                            | Kills bacteria.  |
|   |     | <b>Dosage:</b>                            | 250-750 mg twice daily<br>The tablets are given 1 hour before a  |
|   |     | <b>Side-effects:</b>                      | Bellyache, nausea, vomiting, loss of appetite, headache, dizziness, fatigue, and convulsions.<br>Soreness in the muscles, joints and tendons.<br>Allergy. Allergic reaction in case of simultaneous exposure                   |
|   |     | <b>Validity:</b>                          | 5 years from the date of production (Cifin, PharmaCoDane Aps).   |
|   |     | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.  |
|   |     | <b>Remarks:</b>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .<br>Is given in combination with metronidazole (7.6 or 7.7) in connection with many infections.<br>Should not be given to pregnant or breast-feeding patients.                                   |

**Grp. 7 Midler mod infektioner / Infections**

(continued)

|  |     |   |   |
|--|-----|---|---|
| Blodforgiftning<br>Sepsis<br>Meningitis<br>Lungebetændelse<br><br>Blindtarmsbetændelse<br>Nyrebækkenbetændelse<br>Store sårskader<br>Åbne knoglebrud | 7.9 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Ceftriaxon  |
|  |     | <b>Form:</b>                              | Injektionssubstans, 1g tørstof i hætteglas i hætteglas til intravenøst brug. Skal blandes med 10 ml sterilt vand 16.7.<br>Kan gives intramuskulært - Kontakt <i>Radio Medical</i> .                 |
|  |     | <b>Virkning:</b>                          | Bakteriedræbende.   |
|  |     | <b>Dosering:</b>                          | 1 - 2 g intravenøst i døgnet i én dosis.  |
|  |     | <b>Bivirkninger:</b>                      | Allergiske reaktioner: Hududslet, nældefeber, ledsmerter, overfølsomhedsshock.  |
|  |     | <b>Holdbarhed:</b>                        | Injektionssubstans: 3 år fra produktionsdato (Rocephalin®).   |
|  |     | <b>Opbevaring:</b>                        | Må ikke opbevares over 30°C.  |
|  |     | <i>Anmærkninger:</i>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .<br>Gives ved mange infektioner i kombination med metronidazol (7.6 eller 7.7).<br>Er stærkt vævsirriterende ved intramuskulær injektion.                      |
| Sepsis<br>Blood poisoning<br>Meningitis<br>Pneumonia<br>Appendicitis<br>Pyelitis<br>Major wounds<br>Open fractures                                   | 7.9 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Ceftriaxone   |
|  |     | <b>Form:</b>                              | Injection substance, 1 g of dry matter in a capped vial for intravenous use. Have to be mixed with 10 ml of steril water 16.7 Can be given intramuscular - Contact <i>Radio Medical</i> .           |
|  |     | <b>Effect:</b>                            | Kills bacteria.   |
|  |     | <b>Dosage:</b>                            | 1-2 g intravenously daily as a single dose.   |
|  |     | <b>Side-effects:</b>                      | Allergic reactions: Rash, urticaria, arthralgia, allergic shock.  |
|  |     | <b>Validity:</b>                          | Injection substance: 3 years from the date of production (Rocephaline®, Roche).   |
|  |     | <b>Storage:</b>                           | Not to be stored at more than 30°C.   |
|  |     | <i>Remarks:</i>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .<br>Often used in combination with metronidazole (7.6 or 7.7) in connection with many infections.<br>In case of intramuscular injection, strong irritation of tissue. |

**Grp. 7 Midler mod infektioner / Infections** (continued)

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>Stivkrampevaccine</p> <p>Gives ved ulykker med kvæstelser og sår, med mindre den skadede med sikkerhed er dækket med stivkrampevaccine.</p> <p>Vaccinen suppleres med tetanus immunglobulin (se 7.11).</p> <p>Vaccination skal ske i behandlingsrum med adgang til adrenalin(4.1) og genoplivningsudstyr (A.1).</p>  | 7.10  | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Tetanus holdig vaccine (tetanustoxoid)  |
|   |   | <b>Form:</b>                              | Injektionsvæske   |
|   |   | <b>Virkning:</b>                          | Aktiverer patientens immunsystem.   |
|   |   | <b>Dosering:</b>                          | Følg ordination fra <i>Radio Medical</i> .  |
|   |   | <b>Bivirkninger:</b>                      | Lokal rødme, hævelse og ømhed. Hovedpine, utilpashed og feber ses undertiden og fortager                                      |
|   |   | <b>Holdbarhed:</b>                        | 2 år fra produktionsdato (Tetanusvaccine SSI).  |
|   |   | <b>Opbevaring:</b>                        | Opbevares køligt mellem 2 - 8° C. Frossen vaccine må ikke   |
| <b>Anmærkninger:</b>  | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Overfølsomhedsshock optræder sjældent. Behandling: Adrenalin 0,6 mg intramuskulært (4.1). |   |   |
| <p>Tetanus vaccine</p> <p>To be administered in case of accidents causing injury and wounds unless the wounded person is for certain covered by a tetanus vaccine.</p> <p>The vaccine is to be supplemented by tetanus immune globulin (see 7.11).</p> <p>The vaccination must be given in a room with access to Epinephrine (4.1) and Resuscitation equipment (A.1).</p> | 7.10  | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Vaccine containing Tetanus (tetanustoxoid)  |
|   |   | <b>Form:</b>                              | Injection liquid.   |
|   |   | <b>Effect:</b>                            | Activates the patient's immune system.  |
|   |   | <b>Dosage:</b>                            | Follow prescription from <i>Radio Medical</i> .   |
|   |   | <b>Side-effects:</b>                      | Local blushing, swelling, and soreness.   |
|   |   | <b>Validity:</b>                          | 2 years from the date of production (Tetanus vaccine SSI).  |
|   |   | <b>Storage:</b>                           | To be stored cool at between 2-8°C. Frozen vaccine may not  |
| <b>Remarks:</b>   | Consult <i>Radio Medical</i> .  |   |   |
| <p>Stivkrampemodgift</p> <p>Gives ved ulykker med kvæstelser og sår, med mindre den skadede med sikkerhed er dækket med stivkrampe-vaccine.</p> <p>Tetanus immunglobulin suppleres med vaccine (se 7.10).</p> <p>Behandlingen skal ske i behandlingsrum med adgang til 4.1 Adrenalin og A.1 Genoplivnings- udstyr.</p>  | 7.11  | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Humant tetanus immunglobulin  |
|   |   | <b>Form:</b>                              | Injektionsvæske 250 I.E. Ampul à 1 ml til intramuskulær injektion.  |
|   |   | <b>Virkning:</b>                          | Bekæmper giftstoffer produceret af stivkrampebakterien.   |
|   |   | <b>Dosering:</b>                          | 1 injektion à 250 I.E. (1 ml) intramuskulært. Suppleres med tetanusvaccine (se 7.10).   |
|   |   | <b>Bivirkninger:</b>                      | Lokal rødme, hævelse, ømhed og feber ses undertiden. Allergisk shock og andre allergiske reaktioner forekommer, men sjældent. |
|   |   | <b>Holdbarhed:</b>                        | 3 år fra produktionsdato (Tetagam® P/Tetanogamma® P,  |
|   |   | <b>Opbevaring:</b>                        | Opbevares køligt mellem 2 - 8° C. Frossen immunglobulin må ikke anvendes.   |
| <b>Anmærkninger:</b>  | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Overfølsomhedsshock optræder sjældent. Behandling: Adrenalin 0,6 mg intramuskulært (4.1). |   |   |



|   |      |   |   |
|---|------|---|---|
| <p>Tetanus antidote</p> <p>To be administered in case of accidents causing injury and wounds unless the wounded person is for certain covered by a tetanus vaccine.</p> <p>Tetanus immune globulin is to be supplemented by a vaccine (see 7.10).</p> <p>The treatment must be given in a room with access to 4.1 Adrenaline and A.1 Resuscitation equipment.</p> | 7.11 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Human tetanus immunoglobulin  |
|   |      | <b>Form:</b>                              | Injection liquid 250 IU. Ampoule of 1 ml for intramuscular  |
|   |      | <b>Effect:</b>                            | Combats poisonous substances produced by the tetanus  |
|   |      | <b>Dosage:</b>                            | 1 injection of 250 IU (1 ml) given intramuscularly. To be supplemented by the tetanus vaccine (see 7.10).                             |
|   |      | <b>Side-effects:</b>                      | Local blushing, swollenness, soreness, and fever are sometimes seen<br>Allergic shock and other allergic reactions occur, but rarely. |
|   |      | <b>Validity:</b>                          | 3 years from the date of production (Tetagam® P/ Tetanogamma® P, CSL Behring).  |
|   |      | <b>Storage:</b>                           | To be stored cool at between 2-8°C. Frozen immune globulin must not be used. Not to be used if the liquid is muddy or lumpy.          |
|   |      | <i>Remarks:</i>                           | Consult <i>Radio Medical</i> . Hypersensitivity Shock rarely occurs. Treatment: Adrenaline 0.6 mg intramuscularly (4.1).              |
| <p>Infektioner forårsaget af stafylokokker. Knogleinfektion</p>   | 7.12 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Flucloxacillin  |
|   |      | <b>Form:</b>                              | Tabletter à 500 mg.   |
|   |      | <b>Virkning:</b>                          | Bakteriedræbende.   |
|   |      | <b>Dosering:</b>                          | 750 - 1000 mg 3-4 gange dagligt.  |
|   |      | <b>Bivirkninger:</b>                      | Kvalme, opkastning, diarré, hududslæt.  |
|   |      | <b>Holdbarhed:</b>                        | 2 år fra produktionsdato. Åbne blisterpakninger 6 måneder (Heracillin, Meda AS).  |
|   |      | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.  |
|   |      | <i>Anmærkninger:</i>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .   |
| <p>Infections caused by staphylococci. Infections in the bones</p>  | 7.12 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Flucloxacillin  |
|   |      | <b>Form:</b>                              | Tablets of 500 mg.  |
|   |      | <b>Effect:</b>                            | Kills bacteria.   |
|   |      | <b>Dosage:</b>                            | 750-1000 mg 3-4 times daily.  |
|   |      | <b>Side-effects:</b>                      | Nausea, vomiting, diarrhea, skin rash.  |
|   |      | <b>Validity:</b>                          | 2 years from the date of production. 6 months for open blister pack(Heracillin, Meda AS).   |
|   |      | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.   |
|   |      | <i>Remarks:</i>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .  |

| Grp. 7 Midler mod infektioner / Infections   |      | (continued)                               |   |
|--|------|---|---|
| Halsbetændelse<br>Mundhuleinfektioner<br>Bihulebetændelse<br>Mellemørebetændelse<br>Lungebetændelse<br>Legionella<br>Chlamydia infektioner<br>Mavesårsinfektioner<br><br>Alternativ til penicillin<br>ved allergi<br><br>MFAG tabel 9  | 7.15 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Azithromycin  |
|  |      | <b>Form:</b>                              | Tabletter á 500mg.  |
|  |      | <b>Virkning:</b>                          | Standser bakteriernes vækst.  |
|  |      | <b>Dosering:</b>                          | Voksne: 500 mg x 1-2 dagligt.   |
|  |      | <b>Bivirkninger:</b>                      | Mavesmerter, kvalme, nedsat appetit, kraftsløshed, svimmelhed, smagsforstyrrelser, hovedpine, hudkløe og hududslæt. |
|  |      | <b>Holdbarhed:</b>                        | 5 år fra produktionsdato (Azithromycin, KRKA).  |
|  |      | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.  |
|  |      | <i>Anmærkninger:</i>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .   |
| Inflammation of the<br>throat Infections of the<br>oral cavity<br>Sinusitis Inflammation<br>of the middle ear<br>Pneumonia Legionella<br>Chlamydia infections<br>Infections in<br>connection with ulcer<br><br>Alternative to penicillin<br>in case of allergy<br><br>MFAG table 9 | 7.15 | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Azithromycin  |
|  |      | <b>Form:</b>                              | Tablets of 500mg.   |
|  |      | <b>Effect:</b>                            | Stops bacterial growth.   |
|  |      | <b>Dosage:</b>                            | Adults: 500 mg x 1-2 daily.   |
|  |      | <b>Side-effects:</b>                      | Abdominal pain, nausea, decreased appetite, weakness,   |
|  |      | <b>Validity:</b>                          | 5 years from date of production (Azithromycin, KRKA).   |
|  |      | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.   |
|  |      | <i>Remarks:</i>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .  |
| Urinvejsinfektioner  | 7.16 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Pivmecillinam   |
|  |      | <b>Form:</b>                              | Tabletter a 400 mg.   |
|  |      | <b>Virkning:</b>                          | Bakteriedræbende.   |
|  |      | <b>Dosering:</b>                          | 400 mg x 3 daglig i 3 dage  |
|  |      | <b>Bivirkninger:</b>                      | Diarré, kvalme, træthed, hovedpine opkast, hudkløe og hududslæt.  |
|  |      | <b>Holdbarhed:</b>                        | 3 år fra produktions dato (Selexid, Karo Pharma AB)   |
|  |      | <b>Opbevaring:</b>                        | Normal temperatur   |
|  |      | <i>Anmærkninger:</i>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .   |
| Urinary tract infection  | 7.16 | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Pivmecillinam   |
|  |      | <b>Form:</b>                              | Tablets 400 mg.   |
|  |      | <b>Effect:</b>                            | Kills bacteria.   |
|  |      | <b>Dosage:</b>                            | 400 mg x 3 times daily for 3 days   |
|  |      | <b>Side-effects:</b>                      | Diarrhoea, nausea, fatigue, headache vomiting, skin itching and skin rash.  |
|  |      | <b>Validity:</b>                          | 3 years from production date ( Selexid, Karo Pharma AB)   |
|  |      | <b>Storage:</b>                           | Normale tempeture   |
|  |      | <i>Remarks:</i>                           | Consult <i>Radio Medical</i>  |

|   |      |   |   |
|---|------|---|---|
| Herpes simplex, Herpes zoster.<br>(Forkølelsessår, helvedesild) | 7.17 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Aciclovir   |
|   |      | <b>Form:</b>                              | Tabletter 400 mg  |
|   |      | <b>Virkning:</b>                          | Bekæmper herpes infektioner   |
|   |      | <b>Dosering:</b>                          | 800 mg x 3 dagligt i 2 dage eller<br>200 mg x 5 dagligt i 5 dage eller<br>400 mg x 3 dagligt i 5 dage             |
|   |      | <b>Bivirkninger:</b>                      | Mavesmerter, Diarre, Kvalme, Opkast, Feber, træthed, Hovedpine, Svimmelhed, Døsighed, Hudkløe og -udslæt          |
|   |      | <b>Holdbarhed:</b>                        | 3 år fra produktions dato ( Aciclovir, 1A Farma A/S)  |
|   |      | <b>Opbevaring:</b>                        | Normal temperatur   |
|   |      | <i>Anmærkninger:</i>                      | øg samråd med <i>Radio Medical</i> .  |
| Herpes simplex, Herpes zoster.<br>(Cold sores, shingles)        | 7.17 | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Acyclovir   |
|   |      | <b>Form:</b>                              | Tablets 400 mg.   |
|   |      | <b>Effect:</b>                            | Fights herpes infections  |
|   |      | <b>Dosage:</b>                            | 800 mg x 3 daily for 2 days or<br>200 mg x 5 daily for 5 days or<br>400 mg x 3 daily for 5 days                   |
|   |      | <b>Side-effects:</b>                      | Stomach pain, Diarrhoea, Nausea, Vomiting, Fever, Fatigue, Headache, Dizziness, Drowsiness, Skin itching and rash |
|   |      | <b>Validity:</b>                          | 3 years from production date (Aciclovir, 1A Farma A/S)  |
|   |      | <b>Storage:</b>                           | Normale temperture  |
|   |      | <i>Remarks:</i>                           | Consult <i>Radio Medical</i>  |

## Grp. 8 Malaria – forebyggelse / Malaria – Prevention

|   |     |   |  |
|---|-----|---|--|
| Forebyggelse af malaria   | 8.1 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Atovaquon/Proguanil (Malarone®)  |
|   |     | <b>Form:</b>                              | Tabletter à 250/100 mg.  |
|   |     | <b>Virkning:</b>                          | Forebygger malaria.  |
|   |     | <b>Dosering:</b>                          | Tabletterne <i>skal</i> indtages med fedtholdigt mad (mælk/smør).<br>Forebyggelse fra 1 dag før ankomst til 7 dage efter afrejse fra malariaområdet.<br>Dosis voksne: 1 tablet dagligt.                                |
|   |     | <b>Bivirkninger:</b>                      | Hovedpine, mavekneb, kvalme, opkastning, appetitløshed, diaré, hoste og allergisk hududslæt.<br>Ved opkastning inden én time efter indtagelse af medikamentet indtages ny tablet.                                      |
|   |     | <b>Holdbarhed:</b>                        | 5 år fra produktionsdato (Malarone®, GlaxoSmithKline Pharma A/S).  |
|   |     | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.   |
|   |     | <b>Anmærkninger:</b>                      | Forebyggelse: Se Søfartsstyrelsens gældende vejledning om Malaria.   |
| Prevention of malaria   | 8.1 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Atovaquone/Proguanil (Malarone®)   |
|   |     | <b>Form:</b>                              | Tablets of 250/100 mg.   |
|   |     | <b>Effect:</b>                            | Prevents malaria.  |
|   |     | <b>Dosage:</b>                            | The tablets <i>must</i> be taken with fatty food (milk/butter).<br>The prevention starts 1 day before arrival and lasts until 7 days after departure from the malaria area.<br>Dose, adults: 1 tablet a day.           |
|   |     | <b>Side-effects:</b>                      | Headache, stomach pains, nausea, vomiting, loss of appetite, diarrhoea, coughing and allergic rash.<br>If the patient vomits within 1 hour after have taken the medicament, a new tablet has to be consumed.           |
|   |     | <b>Validity:</b>                          | 5 years from the date of production (Malarone®, GlaxoSmithKline Pharma A/S).   |
|   |     | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.  |
|   |     | <b>Remarks:</b>                           | Primary prevention of malaria: See the Danish Maritime Authority's guide on Malaria.   |
| Forebyggelse af malaria<br><br>Anvendes til forebyggelse, dersom man ikke tåler 8.1<br><br>Anvendes sommetider i kombinations-behandling. | 8.2 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Doxycyklin   |
|   |     | <b>Form:</b>                              | Tabletter à 100 mg.  |
|   |     | <b>Virkning:</b>                          | Forebygger malaria.  |
|   |     | <b>Dosering:</b>                          | Dosis voksne og børn over 12 år: 1 tablet dagligt.<br>Indtages med et glas vand eller et let måltid uden mælkeprodukter.<br>Behandlingen udstrækkes fra 1 dag før ankomst til 4 uger efter afrejse fra malariaområdet. |
|   |     | <b>Bivirkninger:</b>                      | Kvalme, vaginal svamp og toksiske hudreaktioner i forbindelse med sollys.  |
|   |     | <b>Holdbarhed:</b>                        | 3 år fra produktionsdato (Vibradox®, Sandoz).  |
|   |     | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.   |
|   |     | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .<br>Må ikke anvendes af gravide eller ammende eller af børn under 12 år.<br>Direkte sollys bør undgås. Interaktion med mange lægemidler.  |

## Grp. 8 Malaria – forebyggelse / Malaria – Prevention

(continued)

|   |     |   |  |
|---|-----|---|--|
| Prevention of malaria<br><br>To be used for prevention if 8.1 is not tolerated<br><br>Sometimes used in combination therapy | 8.2 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Doxycycline  |
|   |     | <b>Form:</b>                              | Tablets of 100 mg.   |
|   |     | <b>Effect:</b>                            | Prevents malaria.  |
|   |     | <b>Dosage:</b>                            | To be taken with a glass of water or a light meal without any milk products.<br>The prevention starts 1 day before arrival and lasts until 4 weeks after departure from the malaria area.<br>Dose, adult and children over the age of 12 or 45 kg: 1 tablet daily. |
|   |     | <b>Side-effects:</b>                      | Nausea, vaginal candidiasis, toxic skin reaction in connection with sunlight.  |
|   |     | <b>Validity:</b>                          | 5 years from the date of production (vibradox®, Sandoz).   |
|   |     | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.  |
|   |     | <b>Remarks:</b>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .<br>Not to be used by pregnant or breast-feeding woman or children below the age of 12.<br>Direct sunlight should be avoided.<br>Interaction with many other medicines.  |

## Grp. 8 Malaria – behandling / Malaria – Treatment

|   |     |                        |   |
|---|-----|------------------------|---|
| Til behandling af P. Falciparum malaria. På baggrund af: Positiv malaria test for P. Falciparum eller almen sygdomsforenemmelse og feber kombineret med relevant risiko for malaria | 8.4 | <b>Lægemiddelstof:</b> | Artemether og lumefantrine  |
|   |     | <b>Form:</b>           | Tabletter á 20mg/120mg.   |
|   |     | <b>Virkning:</b>       | Dræbermalaria parasitterne.   |
|   |     | <b>Dosering:</b>       | Efter kontakt med <i>Radio Medical</i> .<br>Start omgående med 4 tbl.<br>Derefter:<br>4 tbl 8 timer efter første dosis<br>4 tbl 24 timer efter første dosis.<br>4 tbl. 36 timer efter første dosis.<br>4 tbl. 48 timer efter første dosis.<br>4 tbl. 60 timer efter første dosis. |
|   |     | <b>Bivirkninger:</b>   | Mave-Tarm gener, hudkløe, hududslæt, hovedpine og svimmelhed.   |
|   |     | <b>Holdbarhed:</b>     | 2 år fra produktionsdato (Riamet®, Novatis).  |
|   |     | <b>Opbevaring:</b>     | Må ikke opbevares over 30°C.  |
|   |     | <b>Anmærkninger:</b>   | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> uanset resultatet af malariatest.   |

  

|  |     |   |  |
|--|-----|---|--|
| Treatment of P. Falciperum malaria Based on: Positive Malaria Test for P. Falciparum or general malaise and fever combined with relevant risk of malaria | 8.4 | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Artemether and lumefantrine  |
|  |     | <b>Form:</b>                              | Tablets of 20mg/120mg.   |
|  |     | <b>Effect:</b>                            | Kills the malaria parasite.  |
|  |     | <b>Dosage:</b>                            | Consult <i>Radio Medical</i> .<br>4 tablets as soon as possible.<br>Then:<br>4 tablets 8 hours later, then<br>4 tablets 24 hours after the first dose, then<br>4 tablets 36 hours after the first dose, then<br>4 tablets 48 hours after the first dose and then<br>4 tablets 60 hours after the first dose. |
|  |     | <b>Side-effects:</b>                      | Gastrointestinal disorders, itchy skin, skin rash, headache and dizziness.   |
|  |     | <b>Validity:</b>                          | 2 years from production date (Riamet®, Novatis).   |
|  |     | <b>Storage:</b>                           | Do not store above 30°C.   |
|  |     | <b>Remarks:</b>                           | Consult <i>Radio Medical</i> regardless of the result of the malaria test.   |

## Grp. 9 Hjertemedicin / Cardiac Medicine

|   |     |   |  |
|---|-----|---|--|
| <p>Hjertekrampe<br/>Smerter i hjertet<br/>Blodprop i hjertet</p> <p>Førstehjælp:<br/>Hjertestilling<br/>(eleveret overkrop)<br/>2 - 3 l ilt/minut<br/>Glycerylnitrat (9.1)<br/>Acetylsalicylsyre (9.3)</p> <p>Evt. for smerter:<br/>Morfin (3.4) /<br/>Tramadol (3.5)</p>   | 9.1 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Glycerylnitrat   |
|   |     | <b>Form:</b>                              | Mundhule spray med 0,4 mg/dosis.   |
|   |     | <b>Virkning:</b>                          | Udvider blodkar. Virker inden 1 minut.<br>Virkningsvarighed: 10 - 30 minutter.   |
|   |     | <b>Dosering:</b>                          | Medikamentet pustes ind under tungen eller på kindens inderside.<br>1 pust så hurtigt som muligt efter smerter opståen.<br>Kan gentages 1 gang.<br>Hvis smerterne ikke fortager sig, suppleres med morfin (3.4).                     |
|   |     | <b>Bivirkninger:</b>                      | Ansigtserødem, hovedpine og kvalme.<br>Kan sænke blodtrykket lidt.   |
|   |     | <b>Holdbarhed:</b>                        | 2 år fra produktionsdato (Glytrin®, Meda).   |
|   |     | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur. Beskyttes mod frost, direkte varme og sollys.   |
|   |     | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .<br>Overvåg blodtrykket, som helst ikke må komme under 90 mmHg systolisk.<br>Må ikke anvendes i nærheden af åben ild eller gløder.  |
| <p>Angina pectoris<br/>Heart pain<br/>Coronary thrombosis</p> <p>First aid:<br/>Sit up in comfortable position<br/>2-3 l oxygen/minute<br/>Glyceryl trinitrate (9.1)<br/>Acetylsalicylic acid (9.3)</p> <p>Possibly against pain:<br/>Morfin (3.4) /<br/>Tramadol (3.5)</p> | 9.1 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Glyceryl trinitrate  |
|   |     | <b>Form:</b>                              | Oral cavity spray with 0.4 mg/dose.  |
|   |     | <b>Effect:</b>                            | Expands the blood vessels.<br>Takes effect within 1 minute.<br>Effective for 10-30 minutes.  |
|   |     | <b>Dosage:</b>                            | The medicament is sprayed under the tongue or at the inner side of the cheek.<br>1 spray as soon as possible after the pain has occurred.<br>May be repeated once.<br>If the pain does not decrease, supplement with morphine (3.4). |
|   |     | <b>Side-effects:</b>                      | Blushing, headache, and nausea.<br>May cause a minor fall in blood pressure.   |
|   |     | <b>Validity:</b>                          | 2 years from the date of production (Glytrin®, Meda).  |
|   |     | <b>Storage:</b>                           | Not to be stored above 25°C. Protect from frost, direct heat and sunlight.   |
|   |     | <b>Remarks:</b>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .<br>Control the blood pressure, which should not be below 90 mmHg systolic.<br>Not to be used close to open fire or embers.  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Hjertekrampe<br>Smerter i hjertet<br>Blodprop i hjertet<br>Blodfortynding<br><br>Se også 9.1 | 9.3  | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Acetylsalicylsyre  |
|  |  | <b>Form:</b>                              | Tabletter à 150 mg.  |
|  |  | <b>Virkning:</b>                          | Virker blodfortyndende. Forhindrer blodpropper.  |
|  |  | <b>Dosering:</b>                          | Akut: 300 mg som tygges.<br>Vedligehold: 75 mg dagligt.  |
|  |  | <b>Bivirkninger:</b>                      | Øget blødningsrisiko.<br>Risiko for allergiske reaktioner.<br>Farlig dosis: 150 mg per kg legemsvægt.  |
|  |  | <b>Holdbarhed:</b>                        | 5 år fra produktionsdato (Hjertemagnyl®, Nycomed Danmark).   |
|  |  | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.   |
|  |  | <i>Anmærkninger:</i>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .<br>Bør ikke gives til patienter med mavesår.   |
| Cardiospasm<br>Heart pain<br>Coronary thrombosis<br>Blood-thinning<br><br>See also 9.1       | 9.3  | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Acetylsalicylic acid   |
|  |  | <b>Form:</b>                              | Tablets of 150 mg.   |
|  |  | <b>Effect:</b>                            | Thins the blood. Prevents thrombosis.  |
|  |  | <b>Dosage:</b>                            | Acute: 300 mg has to be chewed.<br>Hereafter: 75 mg, daily.  |
|  |  | <b>Side-effects:</b>                      | Increased risk of bleeding. Risk of allergic reactions.<br>Dangerous dosage: 150 mg per kg bodyweight.   |
|  |  | <b>Validity:</b>                          | 5 years from the date of production (Hjertemagnyl®, Nycomed Denmark).  |
|  |  | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.  |
| <i>Remarks:</i>  | Consult <i>Radio Medical</i> .<br>Not to be given to ulcer patients. |   |  |
| Vand i lungerne<br>Forhøjet blodtryk   | 9.4  | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Furosemid  |
|  |  | <b>Form:</b>                              | Tabletter à 40 mg.   |
|  |  | <b>Virkning:</b>                          | Tvinger væske ud af blodbanen via nyrene til urinblæren, hvorefter væske suges fra lungerne (og andet væv).<br>Virker 1/2 time efter indtagelse.<br>Maksimumeffekt efter 2 timer.<br>Virkningsvarighed: 3 - 6 timer. |
|  |  | <b>Dosering:</b>                          | Vand i lungerne: 40 - 120 mg. Kan gentages efter 30 minutter.<br>Blodtryksforhøjelse: 40 - 80 mg x 1 - 3 dagligt. (maksimalt 1500 mg/døgn).  |
|  |  | <b>Bivirkninger:</b>                      | Ingen relevante.   |
|  |  | <b>Holdbarhed:</b>                        | 5 år fra produktionsdato (Furix®, Nycomed Danmark).  |
|  |  | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.   |
|  |  | <i>Anmærkninger:</i>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .  |

|                                      |     |   |   |
|--------------------------------------|-----|---|---|
| Lung edema<br>High blood pressure    | 9.4 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Furosemide  |
|                                      |     | <b>Form:</b>                              | Tablets of 40 mg.   |
|                                      |     | <b>Effect:</b>                            | Extracts fluids from the blood vessel via the kidneys to the urinary bladder, after which the fluid is absorbed from the lungs (and other tissue).<br>Takes effect after 1/2 hour.<br>Maximum effect after 2 hours.<br>Effective for 3-6 hours. |
|                                      |     | <b>Dosage:</b>                            | Lungedema: 40-120 mg. May be repeated after 30 minutes<br>High blood pressure: 40-80 mg once to three times daily (maximum 1500 mg/day).  |
|                                      |     | <b>Side-effects:</b>                      | None relevant.  |
|                                      |     | <b>Validity:</b>                          | 5 years from the date of production (Furix®, Nycomed Denmark).  |
|                                      |     | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.   |
|                                      |     | <i>Remarks:</i>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .  |
| Vand i lungerne<br>Forhøjet blodtryk | 9.5 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Furosemid   |
|                                      |     | <b>Form:</b>                              | Injektionsvæske 10 mg/ml. Ampuller à 4 ml til intramuskulær eller intravenøs injektion.   |
|                                      |     | <b>Virkning:</b>                          | Tvinger væske ud af blodbanen via nyrerne til urinblæren, hvorefter væske suges fra lungerne (og andet væv).<br>Virker inden for 5 minutter efter IV. injektion.<br>Maksimumeffekt inden 30 minutter.   |
|                                      |     | <b>Dosering:</b>                          | Individuelt. 40-120 mg. Kan gentages efter 30 minutter.   |
|                                      |     | <b>Bivirkninger:</b>                      | Ingen relevante.  |
|                                      |     | <b>Holdbarhed:</b>                        | 5 år fra produktionsdato (Furix®, Nycomed Danmark).   |
|                                      |     | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.  |
|                                      |     | <i>Anmærkninger:</i>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .   |
| Lung edema<br>High blood pressure    | 9.5 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Furosemide  |
|                                      |     | <b>Form:</b>                              | Injection liquid 10 mg/ml. Ampoules of 4 ml for intramuscular or intravenous injection.   |
|                                      |     | <b>Effect:</b>                            | Extracts fluids from the blood vessel via the kidneys to the urinary bladder, after which the fluid is absorbed from the lungs (and other tissue).<br>Takes effect 5 minutes after I.V injection.<br>Maximum effect within 30 minutes.          |
|                                      |     | <b>Dosage:</b>                            | Dependent on the patient. 40-120 mg. May be repeated after 30 minutes.  |
|                                      |     | <b>Side-effects:</b>                      | No relevant ones.   |
|                                      |     | <b>Validity:</b>                          | 5 years from the date of production (Furix®, Nycomed Denmark).  |
|                                      |     | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.   |
|                                      |     | <i>Remarks:</i>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .  |



|   |     |   |  |
|---|-----|---|--|
| Forhøjet blodtryk<br>Hjertekrampe<br>Smerter i hjertet<br>Forebyggelse efter<br>blodprop i hjertet    | 9.6 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Atenolol   |
|   |     | <b>Form:</b>                              | Tabletter à 50 mg.   |
|   |     | <b>Virkning:</b>                          | Sænker puls og blodtryk.   |
|   |     | <b>Dosering:</b>                          | Forhøjet blodtryk:<br>Voksne. 50-100 mg i døgnet.<br>Hjertekrampe og hjerterytmeforstyrrelser:<br>Sædvanligvis 50 mg 1 gang i døgnet stigende til 100 mg i døgnet.<br>Forebyggelse efter blodprop i hjertet:<br>50-100 mg 1 gang i døgnet under kontrol af puls og blodtryk.   |
|   |     | <b>Bivirkninger:</b>                      | Træthed.<br>Kvalme, opkastning, diarré, forstoppelse.<br>Langsom puls, sammentrækning af blodkarrene, lavt blodtryk.<br>Muskelsvaghed.<br>Øget svedtendens.  |
|   |     | <b>Holdbarhed:</b>                        | 5 år fra produktionsdato (Atenolol, Orifarm Generics A/S).   |
|   |     | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.   |
|   |     | <i>Anmærkninger:</i>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .<br>Bør ikke anvendes til patienter med astma, kroniske obstruktiv lungesygdom (KOL) og ved svær regulerbar sukkersyge.   |
| High blood pressure<br>Angina pectoris Heart pain<br>Preventiv treatment after<br>Coronary thrombosis | 9.6 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Atenolol   |
|   |     | <b>Form:</b>                              | Tablets of 50 mg.  |
|   |     | <b>Effect:</b>                            | Reduces pulse and blood pressure.  |
|   |     | <b>Dosage:</b>                            | High blood pressure: Adults: 50- 100 mg daily.<br>Angina pectoris and heart rhythm disturbances:<br>Usually 50 mg once a day, increasing to 100 mg daily.<br>Prevention after coronary thrombosis:<br>50-100 mg once a day under the control of heart rate and blood pressure. |
|   |     | <b>Side-effects:</b>                      | Fatigue, nausea, vomiting, diarrhoea, constipation, low pulse, low blood pressure, contraction of blood vessels, muscle weakness, increased sweating.  |
|   |     | <b>Validity:</b>                          | 5 years from the date of production (Atenolol, Orifarm Generics A/S).  |
|   |     | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.  |
|   |     | <i>Remarks:</i>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .<br>Should not be used in patients with asthma, chronic obstructive pulmonary disease (COPD).<br>and in severe controllable diabetes.  |

|                 |     |   |   |
|-----------------|-----|---|---|
| Blodfortyndende | 9.8 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Apixaban  |
|                 |     | <b>Form:</b>                              | Tablet 5 mg   |
|                 |     | <b>Virkning:</b>                          | Virker blodfortyndende. Forhindrer blodpropper.   |
|                 |     | <b>Dosering:</b>                          | 5 - 10 mg x 2 dagligt, efter ordination af Radio Medical Danmark  |
|                 |     | <b>Bivirkninger:</b>                      | Øget blødningstendens, kvalme hududslæt, blodig urin, vaginal blødning, blødning under huden.                   |
|                 |     | <b>Holdbarhed:</b>                        | 3 år fra produktion dato (Blister pk., Teva GmbH)   |
|                 |     | <b>Opbevaring:</b>                        | Normal temperature  |
|                 |     | <i>Anmærkninger:</i>                      | Søg samråd med Radio Medical.   |
| Blood diluting  | 9.8 | <b>Active Pharmaceutical Ingredients:</b> | Apixaban  |
|                 |     | <b>Form:</b>                              | Tablets 5 mg  |
|                 |     | <b>Effect:</b>                            | Acts as a blood thinner. Prevents blood clots.  |
|                 |     | <b>Dosage:</b>                            | 5-10 mg x 2 time daily, after precription from Radio Medical Denmark  |
|                 |     | <b>Side-effects:</b>                      | Increased tendency to bleed, nausea skin rash, bloody urine, vaginal bleeding, bleeding under the skin.         |
|                 |     | <b>Validity:</b>                          | 3 years from production date (Blister pack,. Teva GmbH)<br>5 years from production date ( Container, Teva GmbH) |
|                 |     | <b>Storage:</b>                           | Normale Temperature   |
|                 |     | <i>Remarks:</i>                           | Consult <i>Radio Medical</i>  |

|                    |     |   |   |
|--------------------|-----|---|---|
| Stopper blødninger | 9.9 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Tranexamsyre  |
|                    |     | <b>Form:</b>                              | injektion væske 100 mg/ml                                     |
|                    |     | <b>Virkning:</b>                          | Forebyggelse og behandling af blødninger                      |
|                    |     | <b>Dosering:</b>                          | 1 g i.v , 3 gange dagligt                                     |
|                    |     | <b>Bivirkninger:</b>                      | Diarré, kvalme, opkast, hovedpine, allergisk hudreaktion      |
|                    |     | <b>Holdbarhed:</b>                        | 3 år fra produktions dato (Tranexamsyre, Pfizer ApS)          |
|                    |     | <b>Opbevaring:</b>                        | Normal temperatur. Må ikke fryses.                            |
|                    |     | <i>Anmærkninger:</i>                      | Søg samråd med Radio Medical.                                 |
| Stops Bleedings    | 9.9 | <b>Active Pharmaceutical Ingredients:</b> | Tranexamacid  |
|                    |     | <b>Form:</b>                              | Injection liquid 100 mg/ml                                    |
|                    |     | <b>Effect:</b>                            | Prevention and treatment of bleedings                         |
|                    |     | <b>Dosage:</b>                            | 1g i.v., 3 times daily  |
|                    |     | <b>Side-effects:</b>                      | Diarrhoea, nausea, vomiting, headache, allergic skin reaction |
|                    |     | <b>Validity:</b>                          | 3 years from production date ( Tranexamacid, Pfizer ApS)      |
|                    |     | <b>Storage:</b>                           | Normale temperature. Do not freeze                            |
|                    |     | <i>Remarks:</i>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .                                |

## Grp. 10 Hudmidler / Dermatological agents

|  |      |   |  |
|--|------|---|--|
| Svamp<br>Hudsvamp<br><br>(Se også 14.1)      | 10.2 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Miconazol  |
|  |      | <b>Form:</b>                              | Creme 20 mg/g (2%).  |
|  |      | <b>Virkning:</b>                          | Dræber svampe i huden.   |
|  |      | <b>Dosering:</b>                          | Den angrebne hud indsmøres 2 gange dagligt. Behandlingen bør fortsætte 1 uge efter symptomfrihed.                |
|  |      | <b>Bivirkninger:</b>                      | Ingen relevante.   |
|  |      | <b>Holdbarhed:</b>                        | 2 år fra produktionsdato (Brentan®, McNeil Denmark ApS).   |
|  |      | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.   |
|  |      | <i>Anmærkninger:</i>                      | Bør ikke anvendes i åbne sår, i hårbund, skæg eller negle.   |
| Fungus<br>Skin fungus<br><br>(See also 14.1) | 10.2 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Miconazole   |
|  |      | <b>Form:</b>                              | Lotion 20 mg/g (2%).   |
|  |      | <b>Effect:</b>                            | Restricts fungus growth in the skin.   |
|  |      | <b>Dosage:</b>                            | Apply to the skin twice daily. The treatment should be continued for a week after the symptoms have disappeared. |
|  |      | <b>Side-effects:</b>                      | No relevant ones.  |
|  |      | <b>Validity:</b>                          | 2 years from the date of production (Brentan®, McNeil Denmark ApS).  |
|  |      | <b>Storage:</b>                           | Not above 25°C.  |
|  |      | <i>Remarks:</i>                           | Should not be used in open wounds, on scalps, beards, or nails.  |
| Lus Fladlus Fnat                             | 10.5 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Permethrin   |
|  |      | <b>Form:</b>                              | Creme 50 mg/g (5%).  |
|  |      | <b>Virkning:</b>                          | Gift, der dræber lus, fnatmidler og deres æg.  |
|  |      | <b>Dosering:</b>                          | Påsmøres den rene og tørre hud.  |
|  |      | <b>Bivirkninger:</b>                      | Kløe og rødme af huden.  |
|  |      | <b>Holdbarhed:</b>                        | 5 år fra produktionsdato (Nix®, ACO Hud Nordic AB).  |
|  |      | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.   |
|  |      | <i>Anmærkninger:</i>                      | Se instruktionen i indlægsseddel.  |
| Lice<br>Crab lice<br>Scabies                 | 10.5 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Permethrin   |
|  |      | <b>Form:</b>                              | Lotion 50 mg/g (5%).   |
|  |      | <b>Effect:</b>                            | Poison that kills lice, scab mites, and their eggs.  |
|  |      | <b>Dosage:</b>                            | Apply to clean, dry skin.  |
|  |      | <b>Side-effects:</b>                      | Itching and skin blushing.   |
|  |      | <b>Validity:</b>                          | 5 years from the date of production (Nix®, ACO Hud Nordic AB).   |
|  |      | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.  |
|  |      | <i>Remarks:</i>                           | See package leaflet.   |

**Grp. 10 Hudmidler / Dermatological agents**

(continued)

|   |      |   |   |
|---|------|---|---|
| Lus Fladlus<br>Fnat   | 10.6 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Permethrin  |
|   |      | <b>Form:</b>                              | Shampo 10 mg/g (1%).  |
|   |      | <b>Virkning:</b>                          | Gift, der dræber lus, fnatmider og deres æg.  |
|   |      | <b>Dosering:</b>                          | Indgnides i det renvaskede, froterede og fugtige hår og hårbund.<br>Shampooen skal sidde i 10 minutter før den skylles  |
|   |      | <b>Bivirkninger:</b>                      | Kløe og rødme af huden.   |
|   |      | <b>Holdbarhed:</b>                        | 2 år fra produktionsdato (Nix®, ACO Hud Nordic AB).   |
|   |      | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.  |
|   |      | <i>Anmærkninger:</i>                      | Se instruktionen i indlægsseddel.   |
| Lice<br>Crab lice<br>Scabies  | 10.6 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Permethrin  |
|   |      | <b>Form:</b>                              | Shampoo 10 mg/g (1%).   |
|   |      | <b>Effect:</b>                            | Poison that kills lice, scab mites, and their eggs.   |
|   |      | <b>Dosage:</b>                            | Apply to washed, rubbed, and wet hair and scalp.<br>The shampoo should not be rinsed off until after 10 minutes.<br>Dead lice and eggs are removed with a fine comb while the |
|   |      | <b>Side-effects:</b>                      | Itching and skin blushing.  |
|   |      | <b>Validity:</b>                          | 2 years from the date of production (Nix®, ACO Hud Nordic AB).  |
|   |      | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.   |
|   |      | <i>Remarks:</i>                           | See package leaflet.  |
| Eksem<br>Psoriasis<br>Hudkløe<br>Solskoldning<br>Hudsvi<br>e efter<br>insektb<br>id   | 10.7 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Glukokortikoid gruppe II  |
|   |      | <b>Form:</b>                              | Creme til udvortes brug.  |
|   |      | <b>Virkning:</b>                          | Modvirker betændelsestilstande, der er fremkaldt af allergiske  |
|   |      | <b>Dosering:</b>                          | Voksne: Påsmøres tyndt 1-2 gange daglig.  |
|   |      | <b>Bivirkninger:</b>                      | Hudkløe brændende fornemmelse i huden, tynd hud,  |
|   |      | <b>Holdbarhed:</b>                        | 3 år fra produktionsdato (Locoid, Astellas Pharma A/S).   |
|   |      | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur. Må ikke opbevares koldt eller fryses.  |
|   |      | <i>Anmærkninger:</i>                      | Søg samråd med Radio Medical.   |
| Eczema<br>Psoriasis<br>Itching<br>Sunburns<br>Burning sensation after<br>insect bites | 10.7 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Glucocorticoid group II   |
|   |      | <b>Form:</b>                              | Lotion for external use.  |
|   |      | <b>Effect:</b>                            | Eases inflammations caused by allergic or toxic agents.   |
|   |      | <b>Dosage:</b>                            | Adults: Apply a thin layer to the skin 1-2 times daily.   |
|   |      | <b>Side-effects:</b>                      | Pruritic, burning sensation in the skin, thin skin, contact   |
|   |      | <b>Validity:</b>                          | 3 years from the date of production (Locoid, Astellas Pharma A/S).  |
|   |      | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature. Do not refrigerate or freeze.   |
|   |      | <i>Remarks:</i>                           | Consult Radio Medical.  |

**Grp. 10 Hudmidler / Dermatological agents**
**(continued)**

|                |      |   |  |
|----------------|------|---|--|
| Hudinfektioner | 10.8 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Fusidin  |
|                |      | <b>Form:</b>                              | Salve 2%   |
|                |      | <b>Virkning:</b>                          | Bakteriedræbende   |
|                |      | <b>Dosering:</b>                          | Påsmøres det berørte hudområde 2-3 gange dagligt                                 |
|                |      | <b>Bivirkninger:</b>                      | Kontakteksem   |
|                |      | <b>Holdbarhed:</b>                        | 2 år efter produktion dato (Fusidinsyre, Orifarm)                                |
|                |      | <b>Opbevaring:</b>                        | Normal temperatur  |
|                |      | <i>Anmærkninger:</i>                      | Søg samråd med Radio Medical<br>Må ikke anvendes i åbne sår.                     |
| Skininfections | 10.8 | <b>Active Pharmaceutical Ingredients:</b> | Fusidin  |
|                |      | <b>Form:</b>                              | Ointment 2%  |
|                |      | <b>Effect:</b>                            | Kills bacteria   |
|                |      | <b>Dosage:</b>                            | Applies the affected skin area 2-3 times daily                                   |
|                |      | <b>Side-effects:</b>                      | Contact eczema   |
|                |      | <b>Validity:</b>                          | 2 years from production date ( Fusidins acid, Orifarm)<br>4 weeks after opening. |
|                |      | <b>Storage:</b>                           | Normale temperature  |
|                |      | <i>Remarks:</i>                           | Consult Radio Medical.<br>Do not use in open wounds.                             |

## Grp. 11 Desinficerende midler / Disinfectants

|   |      |   |  |
|---|------|---|--|
| Rengøring af:<br>1. Instrumenter<br>FØR og<br>EFTER brug<br>2. Hænder<br>3. Intakt hud      | 11.1 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Klorhexidin/ethanol  |
|   |      | <b>Form:</b>                              | Væske 0,5 -5%/70 - 85%.  |
|   |      | <b>Virkning:</b>                          | Desinficerende.  |
|   |      | <b>Dosering:</b>                          | -  |
|   |      | <i>Anmærkninger:</i>                      | Må ikke anvendes i sår, i øjne eller på slimhinder. Indeholder 85 % alkohol.<br>Se Lægebog for søfarende<br>Alternativt indkøbes Chlorhexidin 0,5 % og Ethanol minimum 70 %, i 2 separate flasker.<br>Først anvendes chlorhexidin, derefter Eethanol.                    |
| Disinfection of:<br>1. Instruments<br>BEFORE and<br>AFTER use<br>2. Hands<br>3. Intact skin | 11.1 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Chlorhexidine/ethanol  |
|   |      | <b>Form:</b>                              | Liquid 0.5 - 5%/70 - 85%.  |
|   |      | <b>Effect:</b>                            | Disinfective.  |
|   |      | <b>Dosage:</b>                            | -  |
|   |      | <i>Remarks:</i>                           | Not be used in wounds, in eyes, or on mucous membranes. Contains 85% alcohol.<br>See Medical guide for seafarers!. Alternatively, Chlorhexidine 0.5% and ethanol with a minimum of 70% may be purchased in 2 separate bottles. Use chlorhexidine first and then ethanol. |
| Førstehjælpsbehandling af urene sår<br>Mundskylning   | 11.2 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Klorhexidin  |
|   |      | <b>Form:</b>                              | Væske 0,2%.  |
|   |      | <b>Virkning:</b>                          | Desinficerende.  |
|   |      | <b>Dosering:</b>                          | Kan anvendes i forurenede sår, der er utilgængelig for normal sårrensning.   |
|   |      | <i>Anmærkninger:</i>                      | Se Lægebog for søfarende   |
| First aid treatment of dirty wounds<br>Mouth rinse  | 11.2 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Chlorhexidine  |
|   |      | <b>Form:</b>                              | Liquid 0.2%.   |
|   |      | <b>Effect:</b>                            | Disinfective.  |
|   |      | <b>Dosage:</b>                            | May be used for dirty wounds that are not accessible for normal wound disinfection.  |
|   |      | <i>Remarks:</i>                           | See the Medical guide for seafarers  |

## Grp. 12 Midler mod mave- og tarmsygdomme / Gastro intestinal agents

|   |      |   |  |
|---|------|---|--|
| Diarré  | 12.6 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Loperamid  |
|   |      | <b>Form:</b>                              | Tabletter à 2 mg.  |
|   |      | <b>Virkning:</b>                          | Hæmmer tarmenes bevægelser.  |
|   |      | <b>Dosering:</b>                          | Start: 2 tabletter.<br>Pause 1 time.<br>Derpå 1 tablet for hver uformet afføring. Maksimum: 8 tabletter (16 mg) per døgn.  |
|   |      | <b>Bivirkninger:</b>                      | Mundtørhed, kvalme, mavesmerter. Risiko for tarmstop.  |
|   |      | <b>Holdbarhed:</b>                        | 5 år fra produktionsdato (Imodium®, McNeil).   |
|   |      | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.   |
|   |      | <i>Anmærkninger:</i>                      | Undersøg om den syge har feber.<br>Bør kun anvendes til børn efter <i>Radio Medicals</i> anvisninger.<br>Bør kun anvendes kortvarigt ved akut diaré hos i øvrigt upåvirkede personer.  |
| Diarrhoea   | 12.6 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Loperamide   |
|   |      | <b>Form:</b>                              | Tablets of 2 mg.   |
|   |      | <b>Effect:</b>                            | Restricts the motility of the intestines.  |
|   |      | <b>Dosage:</b>                            | Start: 2 tablets.<br>Wait for 1 hour.<br>1 tablet for every loose stool. Maximum: 8 tablets (16 mg) daily.   |
|   |      | <b>Side-effects:</b>                      | Dry mouth, nausea, slight stomach pains. Risk of intestinal  |
|   |      | <b>Validity:</b>                          | 5 years from the date of production (Imodium®, McNeil).  |
|   |      | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.  |
|   |      | <i>Remarks:</i>                           | Examine whether the patient has a fever.<br>Should only be given to children on directions given by <i>Radio Medical</i> .<br>Use only for a short period of time in case of acute diarrhoea on patients not otherwise affected. |
| Væsketab<br>Salttab<br>Febertilstande<br>Opkastninger<br>Diarré | 12.7 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Glucose/kaliumklorid/magnesiumsulfat/natriumcitrat/<br>natriumklorid   |
|   |      | <b>Form:</b>                              | Afdelte pulvere.   |
|   |      | <b>Virkning:</b>                          | Erstatter væske og salte.  |
|   |      | <b>Dosering:</b>                          | 1 pulver opløses i 1 liter kogt, afkølet vand.<br>Basisbehov: 2,5 liter per døgn.<br>For hver grad over 37°C gives yderligere<br>300 ml per døgn. For hver diaré gives   |
|   |      | <b>Bivirkninger:</b>                      | Ingen.   |
|   |      | <b>Holdbarhed:</b>                        | 2 år fra produktionsdato (Revolyt®, Gunnar Kjems APS).   |
|   |      | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur. Færdigblandet opløsning opbevares i   |
|   |      | <i>Anmærkninger:</i>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .  |



**Grp. 12 Midler mod mave- og tarmsygdomme / Gastro intestinal agents**

(continued)

|   |      |   |   |
|---|------|---|---|
| Loss of fluid<br>Loss of salt<br>Feverish conditions<br>Vomiting<br>Diarrhoea | 12.7 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Glucose/potassium/magnesium/sodium citrate/sodium   |
|   |      | <b>Form:</b>                              | Divided powder.   |
|   |      | <b>Effect:</b>                            | Replaces liquids and salts.   |
|   |      | <b>Dosage:</b>                            | 1 powder is dissolved in 1 litre of boiled, cooled water.<br>Basic need: 2.5 litres daily.<br>For every degree above 37°C, the patient is given another 300 ml daily. For every instance of diarrhoea, the patient is given another 200 ml daily. |
|   |      | <b>Side-effects:</b>                      | None.   |
|   |      | <b>Validity:</b>                          | 2 years from the date of production (Revolyt®, Gunnar Kjems   |
|   |      | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature. The mixed dissolution should be stored  |
|   |      | <b>Remarks:</b>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .  |
| Mavesår   | 12.8 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Omeprazol   |
|   |      | <b>Form:</b>                              | Tablet eller kapsel 20 à mg.  |
|   |      | <b>Virkning:</b>                          | Hæmmer dannelsen af mavesyre.   |
|   |      | <b>Dosering:</b>                          | Mavesår: 20 – 40 mg dagligt.<br>Langtidsbehandling: 10 – 20 mg dagligt.   |
|   |      | <b>Bivirkninger:</b>                      | Kvalme, opkastning, diarré, forstoppelse, luft i tarmen.  |
|   |      | <b>Holdbarhed:</b>                        | 4 år fra produktionsdato (Omeprazol, Copyfarm A/S).   |
|   |      | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.  |
|   |      | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .<br>Kan eventuelt kombineres med antibiotika.  |
| Stomach ulcer   | 12.8 | <b>Active</b>                             | Omeprazol   |
|   |      | <b>Form:</b>                              | Tablet or capsules of 20 mg.  |
|   |      | <b>Effect:</b>                            | Inhibits gastric acid secretion.  |
|   |      | <b>Dosage:</b>                            | Stomach ulcer: 20-40 mg daily.<br>Long term treatment: 10-20 mg daily.  |
|   |      | <b>Side-effects:</b>                      | Nausea, vomiting, diarrhoea, constipation, flatulence, headache, fatigue, dizziness, sleep disturbances.  |
|   |      | <b>Validity:</b>                          | 4 years from the date of production (Omeprazol, Copyfarm A/S).  |
|   |      | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.   |
|   |      | <b>Remarks:</b>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .  |

|   |       |                              |   |
|---|-------|------------------------------|---|
| Sure opstød<br>Halsbrand  | 12.9  | <b>Lægemiddelstof:</b>       | Antacida  |
|   |       | <b>Form:</b>                 | Tablet eller oral opløsning.  |
|   |       | <b>Virkning:</b>             | Neutraliserer mavesyre.   |
|   |       | <b>Dosering:</b>             | Jf. indlægsseddel i præparatet.<br>Efter ordination af <i>Radio Medical</i> . |
|   |       | <b>Bivirkninger:</b>         | Forstoppelse, diarré.   |
|   |       | <b>Holdbarhed:</b>           | 5 år fra produktionsdato (Alminox®, Nycomed Danmark).                         |
|   |       | <b>Opbevaring:</b>           | Almindelig temperatur.  |
|   |       | <b>Anmærkninger:</b>         | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .   |
| Acid indigestion<br>Heartburn                                   | 12.9  | <b>Active</b>                | Antacid   |
|   |       | <b>Form:</b>                 | Tablet or oral solution.  |
|   |       | <b>Effect:</b>               | Neutralizes acid in the stomach.  |
|   |       | <b>Dosage:</b>               | See patients information leaflet. Prescription from <i>Radio Medical</i> .    |
|   |       | <b>Side-effects:</b>         | Constipation, diarrhoea.  |
|   |       | <b>Validity:</b>             | 5 years from the date of production (Alminox®, Nycomed                        |
|   |       | <b>Storage:</b>              | Normal temperature.   |
|   |       | <b>Remarks:</b>              | Consult <i>Radio Medical</i> .  |
| Hæmorider<br>Kløe ved endetarmen<br>Smerter ved afføring        | 12.10 | <b>Lægemiddelstof:</b>       | Anti-hæmoride creme (skal indeholde glucokortikoid og smertestillende middel) |
|   |       | <b>Form:</b>                 | Salve eller creme.  |
|   |       | <b>Virkning:</b>             | Lindring af smerter, hævelse, brændende fornemmelse og                        |
|   |       | <b>Dosering:</b>             | Voksne: Smøres på 2-3 gange daglig, samt efter afføring.                      |
|   |       | <b>Bivirkninger:</b>         | Anal slimhindeatrofi.   |
|   |       | <b>Holdbarhed:</b>           | 3 år fra produktionsdato (Proctosedyl, 2care4 ApS).                           |
|   |       | <b>Opbevaring:</b>           | Almindelig temperatur.  |
|   |       | <b>Anmærkninger:</b>         | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .   |
| Haemorrhoids<br>Itching at the rectum<br>Pain during defecation | 12.10 | <b>Active pharmaceutical</b> | Anti haemorrhoid ointment (Must contain glucocorticoid and analgesic )        |
|   |       | <b>Form:</b>                 | Ointment.   |
|   |       | <b>Effect:</b>               | Relief of pain, swelling and burning sensation / itching                      |
|   |       | <b>Dosage:</b>               | Apply 2-3 times daily and after defecation.                                   |
|   |       | <b>Side-effects:</b>         | Thin skin in the anus.  |
|   |       | <b>Validity:</b>             | 3 years from the date of production (Proctosedyl, 2care4                      |
|   |       | <b>Storage:</b>              | Normal temperature.   |
|   |       | <b>Remarks:</b>              | Consult <i>Radio Medical</i> .  |

**Grp. 12 Midler mod mave- og tarmsygdomme / Gastro intestinal agents**

(continued)

|                       |       |                        |  |
|-----------------------|-------|------------------------|--|
| Kvalme<br>Opkastninge | 12.13 | <b>Lægemiddelstof:</b> | Ondansetron  |
|                       |       | <b>Form:</b>           | Tablet 4 mg  |
|                       |       | <b>Virkning:</b>       | Modvirker kvalme og opkast                                     |
|                       |       | <b>Dosering:</b>       | Efter ordination fra Radio Medical Danmark                     |
|                       |       | <b>Bivirkninger:</b>   | Hovedpine, forstoppelse, Rødme og varmfølelse                  |
|                       |       | <b>Holdbarhed:</b>     | 5 år fra produktions dato ( Aurobindo Pharma)                  |
|                       |       | <b>Opbevaring:</b>     | Normal temperatur  |
|                       |       | <i>Anmærkninger:</i>   | Søg samråd med <i>Radio Medical</i>                            |
| Nausea<br>Vomiting    | 12.13 | <b>Active</b>          | Ondansetron  |
|                       |       | <b>Form:</b>           | Tablets 4 mg   |
|                       |       | <b>Effect:</b>         | Prevent nausea and vomiting                                    |
|                       |       | <b>Dosage:</b>         | By prescription from Radio Medical Danmark                     |
|                       |       | <b>Side-effects:</b>   | Headache, Constipation, Redness and warm feeling               |
|                       |       | <b>Validity:</b>       | 5 years from production date ( Aurobindo Pharma)               |
|                       |       | <b>Storage:</b>        | Normal temperature   |
|                       |       | <i>Remarks:</i>        | Consult <i>Radio Medical</i>                                   |
| Forstoppelse          | 12.14 | <b>Lægemiddelstof:</b> | Movicol®   |
|                       |       | <b>Form:</b>           | Pulver til oral opløsning                                      |
|                       |       | <b>Virkning:</b>       | Binder væske i tarmen, hvorved afføringen blødgøres            |
|                       |       | <b>Dosering:</b>       | Efter ordination fra Radio Medical Danmark                     |
|                       |       | <b>Bivirkninger:</b>   | Mavesmerter, Anal irritation, Diarré, Flatulens, Kvalme,       |
|                       |       | <b>Holdbarhed:</b>     | 3 år fra produktions dato ( Norgine BV)                        |
|                       |       | <b>Opbevaring:</b>     | Ikke over 25 °C  |
|                       |       | <i>Anmærkninger:</i>   | Søg samråd med Radio Medical                                   |
| Constipation          |       | <b>Active</b>          | Movicol®   |
|                       |       | <b>Form:</b>           | Powder for oral solution                                       |
|                       |       | <b>Effect:</b>         | Binds fluid in the intestine, thereby softening the stools     |
|                       |       | <b>Dosage:</b>         | By prescription from Radio Medical Danmark                     |
|                       |       | <b>Side-effects:</b>   | Abdominal pain, Anal irritation, Diarrhea, Flatulence, Nausea, |
|                       |       | <b>Validity:</b>       | 3 years from production date (Norgine BV)                      |
|                       |       | <b>Storage:</b>        | Not above 25 °C  |
|                       |       | <i>Remarks:</i>        | Consult <i>Radio Medical</i>                                   |

## Grp. 13 Øjen- og øremidler / Agents for Eyes and Ears

|  |      |   |  |
|--|------|---|--|
| Allergiske øjensygdomme<br><br>Inflammatoriske øjensygdomme<br><br>Øregangseksem | 13.3 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Dexamethason   |
|  |      | <b>Form:</b>                              | Dråber à 1 mg/ml.  |
|  |      | <b>Virkning:</b>                          | Standser den allergiske eller inflammatoriske proces.  |
|  |      | <b>Dosering:</b>                          | Øjet: 1 - 2 dråber bag nederste øjenlåg hver time indtil bedring. Herefter 1 dråbe 4 - 6 gange per døgn.     |
|  |      | <b>Bivirkninger:</b>                      | Allergi. Risiko for maskering af infektioner, skader eller sygdomme i øjet.                                  |
|  |      | <b>Holdbarhed:</b>                        | 3 år fra produktionsdato (Maxidex®, S.A. Alcon-couvreur  |
|  |      | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.   |
|  |      | <i>Anmærkninger:</i>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .<br>Kan ikke anvendes sammen med kontaktlinser.                         |
| Allergic eye diseases<br>Inflammatory eye diseases<br>Ear eczema                 | 13.3 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Dexamethasone  |
|  |      | <b>Form:</b>                              | Eye drops of 1 mg/ml.  |
|  |      | <b>Effect:</b>                            | Stops the allergic or inflammatory process.  |
|  |      | <b>Dosage:</b>                            | The eye: 1-2 drops behind the lower eyelid every hour until improvement. Subsequently, 1 drop four-six times |
|  |      | <b>Side-effects:</b>                      | Allergy. Risk of masking of infections, injuries, or diseases in the eye.                                    |
|  |      | <b>Validity:</b>                          | 3 years from the date of production produktionsdato (Maxidex®, S.A. Alcon-couvreur N.V.).                    |
|  |      | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.  |
|  |      | <i>Remarks:</i>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .<br>Not to be used when wearing contact lenses.                                |
| Grøn stær:<br>Smerter i øjet<br>Regnbuesyn<br>Tågesyn                            | 13.4 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Pilocarpin   |
|  |      | <b>Form:</b>                              | Dråber à 20 mg/ml.   |
|  |      | <b>Virkning:</b>                          | Nedsætter trykket i det indre øje.   |
|  |      | <b>Dosering:</b>                          | Hyppig drypning bag nederste øjenlåg efter ordination fra <i>Radio Medical</i> .                             |
|  |      | <b>Bivirkninger:</b>                      | Sammentrækning i pupillens lukkemuskel ("knappenålpupil") og hovedpine.                                      |
|  |      | <b>Holdbarhed:</b>                        | 1½ år fra produktionsdato (Pilocarpin "ophta"®, Ophtha A/S)<br>Må højst anvendes 1 måned efter åbning.       |
|  |      | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.   |
|  |      | <i>Anmærkninger:</i>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .<br>Kan ikke anvendes sammen med kontaktlinser.                         |

|   |      |   |   |
|---|------|---|---|
| Glaucoma:<br>Pains in the eye,<br>Rainbow vision,<br>Blurred vision | 13.4 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Pilocarpine   |
|   |      | <b>Form:</b>                              | Eye drops of 20 mg/ml.  |
|   |      | <b>Effect:</b>                            | Reduces pressure inside the eye.  |
|   |      | <b>Dosage:</b>                            | Frequent drops behind the lower eyelid after prescription from <i>Radio Medical</i> .   |
|   |      | <b>Side-effects:</b>                      | Spasms of the sphincter of the pupil ("pin-hole pupil") and headache.   |
|   |      | <b>Validity:</b>                          | 1½ years from the date of production (Pilocarpin "ophtha" <sup>®</sup> , Ophtha A/S).   |
|   |      | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.   |
|   |      | <b>Remarks:</b>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .<br>Not to be used when wearing contact lenses.   |
| Herpes<br>Helvedesild   | 13.6 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Aciclovir   |
|   |      | <b>Form:</b>                              | Øjensalve à 30 mg/g.  |
|   |      | <b>Virkning:</b>                          | Hæmmer virus.   |
|   |      | <b>Dosering:</b>                          | Øjet: 1 cm salve bag nederste øjenlåg 5 gange dagligt indtil 3 døgn efter symptomfrihed.                                      |
|   |      | <b>Bivirkninger:</b>                      | Øjenirritation.   |
|   |      | <b>Holdbarhed:</b>                        | 5 år fra produktionsdato<br>(Zovir <sup>®</sup> , GlaxoSmithKline Pharma A/ S).   |
|   |      | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.  |
|   |      | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .<br>Kan ikke anvendes sammen med kontaktlinser.  |
| Herpes<br>Shingles  | 13.6 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Acyclovir   |
|   |      | <b>Form:</b>                              | Eye ointment of 30 mg/g.  |
|   |      | <b>Effect:</b>                            | Restricts virus.  |
|   |      | <b>Dosage:</b>                            | The eye: Apply ointment in a layer of 1 cm behind the lower eyelid five times a day until 3 days after the patient is free of |
|   |      | <b>Side-effects:</b>                      | Irritation of the eye.  |
|   |      | <b>Validity:</b>                          | 5 years from the date of production (Zovir <sup>®</sup> , GlaxoSmithKline Pharma A/S).  |
|   |      | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.   |
|   |      | <b>Remarks:</b>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .<br>Not to be used when wearing contact lenses.   |

|                                   |       |   |  |
|-----------------------------------|-------|---|--|
| Blødgøring og løsning af ørevoks. | 13.9  | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Allantoin  |
|                                   |       | <b>Form:</b>                              | Væske.   |
|                                   |       | <b>Virkning:</b>                          | Blødgør og løsner ørevoks.   |
|                                   |       | <b>Dosering:</b>                          | 10-20 dråber dryppes i øret. Et stykke vat anbringes i øret og personen lejres således at dråberne forbliver i øret. Efter 20 -50 min. skylles øret med lunkent vand (37°C).                   |
|                                   |       | <b>Bivirkninger:</b>                      | Se indlæggelsesseddel.   |
|                                   |       | <b>Holdbarhed:</b>                        | Se produktet.(Removax®).   |
|                                   |       | <b>Opbevaring:</b>                        | Opbevares ved almindelig temperatur.   |
|                                   |       | <i>Anmærkninger:</i>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .<br>Må ikke anvendes hvis der er hul i trommehinden. Må ikke  |
| Softens and loosens cerumen       | 13.9  | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Allantoin  |
|                                   |       | <b>Form:</b>                              | Fluid.   |
|                                   |       | <b>Effect:</b>                            | Softens and dissolving earwax.   |
|                                   |       | <b>Dosage:</b>                            | 10-20 drops in the ear. A piece of cotton wool is placed in the ear and the person is placed, so that the droplets remain in the ear.<br>After 20-50 min rinse the ear with warm water (37°C). |
|                                   |       | <b>Side-effects:</b>                      | See package leaflet.   |
|                                   |       | <b>Validity:</b>                          | See expire date on the product (Remowax®).   |
|                                   |       | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.  |
|                                   |       | <i>Remarks:</i>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .<br>Do not use if there is a hole in the eardrum. Not for use by   |
| Inflammatoriske øjensygdomme      | 13.11 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Tropicamid   |
|                                   |       | <b>Form:</b>                              | Øjendråber 1%.   |
|                                   |       | <b>Virkning:</b>                          | Udvider pupillen.  |
|                                   |       | <b>Dosering:</b>                          | Akut: 1-2 dråber 3 gange dagligt.  |
|                                   |       | <b>Bivirkninger:</b>                      | Feber, forstoppelse, hjertebanken, hallucinationer, excitation, konfusion, ansigtsrødme, akkomodationsbesvær, øjenirritation, fotofobi.  |
|                                   |       | <b>Holdbarhed:</b>                        | 3 år fra produktionsdato,<br>(Mydracyl® S.A. Alcon-couvreur N.V)   |
|                                   |       | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.   |
|                                   |       | <i>Anmærkninger:</i>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .  |
| Inflammatory eye diseases         | 13.11 | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Tropicamid   |
|                                   |       | <b>Form:</b>                              | Eye drops 1%.  |
|                                   |       | <b>Effect:</b>                            | Enlarges the pupil.  |
|                                   |       | <b>Dosage:</b>                            | Acut: 1-2 drops 3 times a day.   |
|                                   |       | <b>Side-effects:</b>                      | Fever, constipation, palpitations, hallucinations, excitation, comfusion, flushing, difficulties with accommodation, eye irritation, photophobia.  |
|                                   |       | <b>Validity:</b>                          | 3 years from the date of production,<br>( Mydracyl® , S.A. Alcon-couvreur N.V).  |
|                                   |       | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.  |
|                                   |       | <i>Remarks:</i>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .   |

|                |       |   |  |
|----------------|-------|---|--|
| Øregangs eksem | 13.12 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Ciprofloxacin / Hydrocortison  |
|                |       | <b>Form:</b>                              | Øredråber.   |
|                |       | <b>Virkning:</b>                          | Behandling af øregangs eksem.  |
|                |       | <b>Dosering:</b>                          | 3 dråber i berørte øre 2 gange daglig.                                   |
|                |       | <b>Bivirkninger:</b>                      | Ørekløe, øresmerter, svimmelhed.   |
|                |       | <b>Holdbarhed:</b>                        | Ubrudt 2 år fra produktionsdato (Ciflox, Novartis Healthcare A/S).       |
|                |       | <b>Opbevaring:</b>                        | Beskytte mod lys og ikke over 25°C. Må ikke opbevares i                  |
|                |       | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .                                    |
| Ear eczema     | 13.12 | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Ciprofloxacin / Hydrocortisone   |
|                |       | <b>Form:</b>                              | Eardrops.  |
|                |       | <b>Effect:</b>                            | Treatment of ear canal eczema.   |
|                |       | <b>Dosage:</b>                            | 3 drops in affected ear twice daily.                                     |
|                |       | <b>Side-effects:</b>                      | Ear itching, earache, dizziness.   |
|                |       | <b>Validity:</b>                          | Unbroken 2 years from production date (Ciflox, Novartis Healthcare A/S). |
|                |       | <b>Storage:</b>                           | Protect from light and not more than 25°C. Do not refrigerate.           |
|                |       | <b>Remarks:</b>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .   |
| Øjenbetændelse | 13.13 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Kloramfenikol  |
|                |       | <b>Form:</b>                              | Øjensalve 1%   |
|                |       | <b>Virkning:</b>                          | Bakteriedræbende   |
|                |       | <b>Dosering:</b>                          | Smørres 3- 6 gange dagligt i øjet  |
|                |       | <b>Bivirkninger:</b>                      | Øjenkløe, øjenirritation, allergisk reaktion                             |
|                |       | <b>Holdbarhed:</b>                        | 2 år fra produktion dato (Kloramfenikol, 2care4)                         |
|                |       | <b>Opbevaring:</b>                        | Se indlægsseddel. Efter anbrud ikke over 25°C                            |
|                |       | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i>                                      |
| Eye infection  | 13.13 | <b>Active Pharmaceutical Ingredients:</b> | Chloramphenicol  |
|                |       | <b>Form:</b>                              | Eye ointment 1%  |
|                |       | <b>Effect:</b>                            | Kills bacteria   |
|                |       | <b>Dosage:</b>                            | Apply 3-6 times daily in the eye   |
|                |       | <b>Side-effects:</b>                      | Eye itching, eye irritation, allergic reaction                           |
|                |       | <b>Validity:</b>                          | 2 years from production date (Kloramfenikol, 2care4)                     |
|                |       | <b>Storage:</b>                           | See leaflet..After opening not above 25°C                                |
|                |       | <b>Remarks:</b>                           | Consult <i>Radio Medical</i>   |

**Grp. 13 Øjen- og øremidler / Agents for Eyes and Ears**

|   |       |   |  |
|---|-------|---|--|
| Svejseøjne<br>Lokalbedøvelse af øjet                  | 13.14 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Diclofenac   |
|   |       | <b>Form:</b>                              | Øjendråber 1 mg/ml                                 |
|   |       | <b>Virkning:</b>                          | Lokalbedøvende                                     |
|   |       | <b>Dosering:</b>                          | 1 dråbe 3-5 gange dagligt                          |
|   |       | <b>Bivirkninger:</b>                      | Irritation af øje, øjenkløe, sløret syn            |
|   |       | <b>Holdbarhed:</b>                        | 2 år fra produktion dato (Dicloabak, 2care4)       |
|   |       | <b>Opbevaring:</b>                        | Ikke over 25°C                                     |
|   |       | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med Radio Medical                       |
| Arc eye / Welders eye<br>Local anaesthetic of the eye | 13.14 | <b>Active Pharmaceutical Ingredients:</b> | Diclofenac   |
|   |       | <b>Form:</b>                              | Eye drops 1mg /ml                                  |
|   |       | <b>Effect:</b>                            | Local anaesthetic.                                 |
|   |       | <b>Dosage:</b>                            | 1 drop, 3-5 time daily                             |
|   |       | <b>Side-effects:</b>                      | Eye irritation, eye itching, blurred vision        |
|   |       | <b>Validity:</b>                          | 2 years from production date ( Dicloabak, 2 care4) |
|   |       | <b>Storage:</b>                           | Not above 25°C.                                    |
|   |       | <b>Remarks:</b>                           | Consult Radio Medical                              |



## Grp. 14 Gynækologiske midler / Gynaecological agents

|   |      |   |   |
|---|------|---|---|
| Svamp i skeden<br><br>Hudsvamp (se også 10.2)<br>Neglesvamp   | 14.1 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Fluconazol  |
|   |      | <b>Form:</b>                              | Kapsler à 150 mg.   |
|   |      | <b>Virkning:</b>                          | Hæmmer svampevækst.   |
|   |      | <b>Dosering:</b>                          | Skedesvamp: 150 mg som éngangsdosis.<br>Hudsvamp: 150 mg per uge i 4 - 6 uger.<br>Neglesvamp: 150 mg per uge i 3 - 12 måneder (til en ny negl er dannet).   |
|   |      | <b>Bivirkninger:</b>                      | Allergi.<br>I sjældne tilfælde alvorlig leverforgiftning.<br>Fluconazol påvirker virkningen af adskillige andre medikamenter, herunder bl.a. blodfortyndende og beroligende midler, samt p-piller.  |
|   |      | <b>Holdbarhed:</b>                        | 5 år fra produktionsdato (Fluconazol "KRKA", KRKA Sverige AB).  |
|   |      | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.  |
|   |      | <i>Anmærkninger:</i>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .<br>Bør ikke anvendes til gravide.   |
| Vaginal fungus<br><br>Skin fungus (see also 10.2) Nail fungus | 14.1 | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Fluconazole   |
|   |      | <b>Form:</b>                              | Capsule of 150 mg.  |
|   |      | <b>Effect:</b>                            | Restricts fungal growth.  |
|   |      | <b>Dosage:</b>                            | Vaginal fungus: 150 mg as a single dose.<br>Skin fungus: 150 mg a week for 4-6 weeks.<br>Nail fungus: 150 mg a week for 3-12 months (until a new nail has been formed).                             |
|   |      | <b>Side-effects:</b>                      | Allergy In rare cases, serious liver poisoning.<br>Fluconazole affects the effect of several other medicaments, including inter alia blood-thinning substances, sedatives, and birth control pills. |
|   |      | <b>Validity:</b>                          | 5 years from the date of production (Fluconazol "KRKA", KRKA Sverige AB).   |
|   |      | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.   |
|   |      | <i>Remarks:</i>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .<br>Not to be used by pregnant women.   |
| Blødning EFTER abort eller fødsel                             | 14.2 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Methylegometrin   |
|   |      | <b>Form:</b>                              | Tabletter à 0,125 mg.   |
|   |      | <b>Virkning:</b>                          | Livmodersammentrækkende.  |
|   |      | <b>Dosering:</b>                          | Efter abort eller fødsel: 0,125 - 0,250mg 3 gange dagligt.  |
|   |      | <b>Bivirkninger:</b>                      | Overfølsomhed, hovedpine, mavesmerter, forhøjet blodtryk, hududslet.  |
|   |      | <b>Holdbarhed:</b>                        | 5 år fra produktionsdato (Methergin®, Novartis).  |
|   |      | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.  |
|   |      | <i>Anmærkninger:</i>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .<br>Må ikke anvendes til gravide med blødninger.   |

**Grp. 14 Gynækologiske midler / Gynaecological agents**

(continued)

|  |      |   |  |
|--|------|---|--|
| Bleeding AFTER giving birth or miscarriage | 14.2 | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Methylergometrine.   |
|  |      | <b>Form:</b>                              | Tablets of 0.125 mg.   |
|  |      | <b>Effect:</b>                            | Contracts the uterus.  |
|  |      | <b>Dosage:</b>                            | After giving birth or miscarriage:<br>0.125-0.250mg three times daily.               |
|  |      | <b>Side-effects:</b>                      | Allergy, headache, stomachache, high blood pressure, rash.                           |
|  |      | <b>Validity:</b>                          | 5 years from the date of production (Methergine®, Novartis).                         |
|  |      | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.  |
|  |      | <b>Remarks:</b>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .<br>Not to be used by pregnant women who are bleeding. |

**Grp. 15 Midler mod forkølelse og astma / Agents for common Cold and Asthma**

|                |      |   |   |
|----------------|------|---|---|
| Hostestillende | 15.1 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Dextromethorphan  |
|                |      | <b>Form:</b>                              | Tabletter á 30 mg.  |
|                |      | <b>Virkning:</b>                          | Hostestillende.   |
|                |      | <b>Dosering:</b>                          | 15-30 mg. 3-4 gange daglig.   |
|                |      | <b>Bivirkninger:</b>                      | Ufrivillige muskelsammentrækning, dødsighed, svimmelhed, hallucinationer, mani.   |
|                |      | <b>Holdbarhed:</b>                        | 3 år fra produktionsdato (Dexofan® Nycomed).  |
|                |      | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.  |
|                |      | <b>Anmærkninger:</b>                      | Bør ikke anvendes af børn under 6 år.<br>Bør ikke anvendes ved samtidig behandling med 7.6 og 7.7 Metronidazol.<br>Bør ikke anvendes ved samtidig behandling med Disulfiram (Antabus®).   |
| Cough          | 15.1 | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Dextromethorphan  |
|                |      | <b>Form:</b>                              | Tablets of 30 mg.   |
|                |      | <b>Effect:</b>                            | Reduces coughs.   |
|                |      | <b>Dosage:</b>                            | 15- 30 mg. 3-4 times daily.   |
|                |      | <b>Side-effects:</b>                      | Unvoluntary muscle contraction, drowsiness, dizziness, hallucinations and mania.  |
|                |      | <b>Validity:</b>                          | 3 years from the date of production (Dexofan®, Nycomed).  |
|                |      | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.   |
|                |      | <b>Remarks:</b>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .<br>Should not be used by children under the age of 6 years<br>Should not be used during concomitant treatment with 7.6 or 7.7 Metronidazole.<br>Should not be used during concomitant treatment with disulfiram (Antabuse®). |

**Grp. 15 Midler mod forkølelse og astma / Agents for common Cold and Asthma (continued)**

|  |      |   |  |
|--|------|---|--|
| Forkølelse<br>Bihulebetændelse<br>Kæbehulebetændelse<br>Pandehulebetændelse<br>Mellemørebetændelse                   | 15.5 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Xylometazolin  |
|  |      | <b>Form:</b>                              | Næsedråber/næsespray. 1 mg/ml.   |
|  |      | <b>Virkning:</b>                          | Skaffer afløb fra mellemøret, bihuler, pandehuler og kæbehuler. Virker øjeblikkeligt og i 10-12 timer.     |
|  |      | <b>Dosering:</b>                          | 2 pust/dråber i hvert næsebor 2 - 3 gange dagligt i maksimum   |
|  |      | <b>Bivirkninger:</b>                      | Ved længere tids anvendelse kan stoffet skade næsens   |
|  |      | <b>Holdbarhed:</b>                        | 3 år fra produktionsdato (Zymelin®, Nycomed Danmark).  |
|  |      | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.   |
|  |      | <i>Anmærkninger:</i>                      | Må ikke anvendes ved symptomer på grøn stær (se 13.4).   |
| Cold<br>Sinusitis<br>Maxillary sinusitis Frontal<br>sinusitis Otitis media   | 15.5 | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Xylometazoline   |
|  |      | <b>Form:</b>                              | Nose drops/nose spray. 1 mg/ml.  |
|  |      | <b>Effect:</b>                            | Opens drainage from middle ears and sinuses. Takes effect immediately and stays effective for 10-12 hours. |
|  |      | <b>Dosage:</b>                            | 2 sprays/drops in each nostril two-three times daily for a   |
|  |      | <b>Side-effects:</b>                      | If used for a long period, the substance may damage the  |
|  |      | <b>Validity:</b>                          | 3 years from the date of production (Zymelin®, Nycomed Danmark).   |
|  |      | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.  |
|  |      | <i>Remarks:</i>                           | Not to be used if there are symptoms of glaucoma (see 13.4).   |
| Førstevalg ved astma eller astmalignende vejtrækning som følge af udsættelse for røg, gasarter og dampe.             | 15.7 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Salbutamol.  |
|  |      | <b>Form:</b>                              | Spray, 0.1 mg per dose.  |
|  |      | <b>Virkning:</b>                          | Løser kramper i den glatte muskulatur i luftvejene.  |
|  |      | <b>Dosering:</b>                          | 1 -2 dosage as required. Maximum 4 times daily   |
|  |      | <b>Bivirkninger:</b>                      | Muskelkramper, hurtig puls, rystelser, hovedpine   |
|  |      | <b>Holdbarhed:</b>                        | 3 years from the date of production (Salbutamol, Teva B.V.)  |
|  |      | <b>Opbevaring:</b>                        | Ikke over 25 °C - beskyt mod kulde og frost  |
|  |      | <i>Anmærkninger:</i>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .  |
| First choice of medicament in case of asthma or asthma-like breathing caused by exposure to smoke, gases, and fumes. |      | <b>Active Pharmaceutical Ingredients:</b> | Salbutamol   |
|  |      | <b>Form:</b>                              | Spray, 0.1 mg per dose.  |
|  |      | <b>Effect:</b>                            | Loosens convulsions in the smooth musculature in the respiratory tract.                                    |
|  |      | <b>Dosage:</b>                            | 1 -2 dosage as required. Maximum 4 times daily   |
|  |      | <b>Side-effects:</b>                      | Muscle cramps, fast pulse, tremors, headache   |
|  |      | <b>Validity:</b>                          | 3 years from the date of production (Salbutamol, Teva B.V.)  |
|  |      | <b>Storage:</b>                           | Below 25 °C - protect against cold and frost   |
|  |      | <i>Remarks:</i>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .   |

**Grp. 15 Midler mod forkølelse og astma / Agents for common Cold and Asthma (continued)**

|   |                                |   |  |
|---|--------------------------------|---|--|
| Astma eller astmalignende vejrtrækning som følge af udsættelse for røg, gasarter og dampe.<br>IMFAG tabel 9 | 15.8                           | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Glucocorticoid til inhalation                                      |
|   |                                | <b>Form:</b>                              | Spray 100-200 mikrogram/dosis                                      |
|   |                                | <b>Virkning:</b>                          | Fjerner inflammatorisk ødem og hævelse i luftvejene.               |
|   |                                | <b>Dosering:</b>                          | 1 dosis efter behov.   |
|   |                                | <b>Bivirkninger:</b>                      | Svamp i munden, hovedpine, hæshed, hoste og halsgener              |
|   |                                | <b>Holdbarhed:</b>                        | 3 år fra produktionsdato (AeroBec, 2care4)                         |
|   |                                | <b>Opbevaring:</b>                        | Ikke over 25 °C  |
|   |                                | <i>Anmærkninger:</i>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .                              |
| Asthma or asthma-like breathing caused by exposure to smoke, gases, and fumes.<br>MFAG tabel 9              | 15.8                           | <b>Active Pharmaceutical Ingredients:</b> | Glycocorticoid for inhalation                                      |
|   |                                | <b>Form:</b>                              | Spray 100-200 microgram/dosage                                     |
|   |                                | <b>Effect:</b>                            | Removes inflammatory oedema and swelling of the respiratory tract. |
|   |                                | <b>Dosage:</b>                            | 1 dose as required   |
|   |                                | <b>Side-effects:</b>                      | Fungus in the mouth, headache, hoarseness, cough and sore throat   |
|   |                                | <b>Validity:</b>                          | 3 years from the date of production (AeroBec, 2care4)              |
|   |                                | <b>Storage:</b>                           | Below 25 °C  |
| <i>Remarks:</i>   | Consult <i>Radio Medical</i> . |   |  |

| Grp. 16 Infusionsvæsker og lign. / Liquid for infusion and similar                               |      |   |   |
|--|------|---|---|
| 1. valgs præparat ved:<br>Blodtab<br>Væsketab<br>Forebyggelse af shock                           | 16.1 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Natriumklorid   |
|  |      | <b>Form:</b>                              | Infusionsvæske 9 mg/ml.<br>Beholdere à 1000 ml til intravenøs anvendelse.   |
|  |      | <b>Virkning:</b>                          | Erstatter væske og salte.   |
|  |      | <b>Dosering:</b>                          | Normalt ikke over 500 ml per time (godt 150 dråber per minut). 20 dråber = 1 ml.  |
|  |      | <b>Bivirkninger:</b>                      | Ingen relevante.  |
|  |      | <b>Holdbarhed:</b>                        | 3 år fra produktionsdato (Natriumklorid isotonisk, Frenius Kabi).   |
|  |      | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.  |
|  |      | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .<br>Ved malaria og ved hjertetilfælde bør infusionshastigheden være langsom af hensyn til risikoen for udvikling af lungeødem (9.4/9.5). |
| First choice of medicament in case of:<br>Loss of blood<br>Loss of liquid<br>Prevention of shock | 16.1 | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Sodium chloride   |
|  |      | <b>Form:</b>                              | Infusion liquid 9 mg/ml.<br>Containers of 1000 ml for intravenous use.  |
|  |      | <b>Effect:</b>                            | Replaces liquids and salts.   |
|  |      | <b>Dosage:</b>                            | Normally, no more than 500 ml per hour (about 150 drops a minute). 20 drops = 1 ml.   |
|  |      | <b>Side-effects:</b>                      | None relevant.  |
|  |      | <b>Validity:</b>                          | 3 years from the date of production (Sodium chloride, Frenius Kabi).  |
|  |      | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.   |
|  |      | <b>Remarks:</b>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .<br>In case of malaria and heart attacks, the infusion speed should be slow because of the risk of developing lung oedema (9.4/9.5).            |
| Ernæringserstatning<br>Væsketab<br><br>(Se også 12.7)  | 16.2 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Glucose og natriumklorid  |
|  |      | <b>Form:</b>                              | Infusionsvæske med glucose 25 mg/ml og natriumklorid 4,5 mg/ml. Beholdere à 1000 ml til intravenøs anvendelse.  |
|  |      | <b>Virkning:</b>                          | Erstatter væske, glucose og salte.  |
|  |      | <b>Dosering:</b>                          | Normalt ikke over 500 ml per time (godt 150 dråber per minut). 20 dråber = 1 ml.  |
|  |      | <b>Bivirkninger:</b>                      | Ingen relevante.  |
|  |      | <b>Holdbarhed:</b>                        | 3 år fra produktionsdato (Natriumklorid-Glucose "Braun", B. Braun Medical A/S).   |
|  |      | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.  |
|  |      | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .<br>Ved malaria og ved hjertetilfælde bør infusionshastigheden være langsom af hensyn til risikoen for udvikling af lungeødem (9.4/9.5). |

|   |      |   |  |
|---|------|---|--|
| Food substitute<br>Loss of liquids<br><br>(See also 12.7)                           | 16.2 | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Glucose and sodium chloride  |
|   |      | <b>Form:</b>                              | Infusion liquid containing glucose 25 mg/ml and sodium chloride 4.5 mg/ml. Containers of 1000 ml for intravenous use.  |
|   |      | <b>Effect:</b>                            | Replaces liquids, glucose and salts.   |
|   |      | <b>Dosage:</b>                            | Normally, no more than 500 ml per hour (about 150 drops a minute). 20 drops = 1 ml.  |
|   |      | <b>Side-effects:</b>                      | None relevant.   |
|   |      | <b>Validity:</b>                          | 3 years from the date of production (Natriumklorid-Glucose" Braun", B. Braun Medical A/S).   |
|   |      | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.  |
|   |      | <b>Remarks:</b>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .<br>In case of malaria and heart attacks, the infusion speed should be slow because of the risk of developing lung oedema (9.4/9.5). |
| Væske til gennemskylning af intravenøs kanyle.<br>Sårbehandling.<br>Øjenbehandling  | 16.5 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Natriumklorid  |
|   |      | <b>Form:</b>                              | Væske 0,9% i ca. 20 ml beholder.   |
|   |      | <b>Virkning:</b>                          | Fjerner blod fra venekanyle, renser sår og øjne.   |
|   |      | <b>Dosering:</b>                          | Se instruks i Søfartsstyrelsens lægebog eller efter ordination fra <i>Radio Medical</i> .  |
|   |      | <b>Bivirkninger:</b>                      | Ingen relevante.   |
|   |      | <b>Holdbarhed:</b>                        | 3 år fra produktionsdato (Fresenius Kabi).   |
|   |      | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.   |
|   |      | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .  |
| Fluid for flushing intravenous needle.<br>Treatment of wounds.<br>Treatment of eyes | 16.5 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Sodium chloride  |
|   |      | <b>Form:</b>                              | Fluid 0,9 % in containers of 20 ml.  |
|   |      | <b>Effect:</b>                            | Removes blood from intravenous needle, clean wounds and eyes.  |
|   |      | <b>Dosage:</b>                            | See the instructions in The Maritime Medical Manual or on prescription from <i>Radio Medical</i> .   |
|   |      | <b>Side-effects:</b>                      | No relevant ones.  |
|   |      | <b>Validity:</b>                          | 3 years from the date of production (Fresenius Kabi).  |
|   |      | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.  |
|   |      | <b>Remarks:</b>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .   |

**Grp. 16 Infusionsvæsker og lign. / Liquid for infusion and similar**
**(continued)**

|   |      |   |  |
|---|------|---|--|
| Vand til opløsning af 7.9<br>Ceftriaxon pulver    | 16.7 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Sterilt vand   |
|   |      | <b>Form:</b>                              | Væske i 10 ml beholder   |
|   |      | <b>Virkning:</b>                          | -  |
|   |      | <b>Dosering:</b>                          | -  |
|   |      | <b>Bivirkninger:</b>                      | -  |
|   |      | <b>Holdbarhed:</b>                        | 3 år fra produktionsdato ( Sterilt vand Mini-plasco®, B. Braun Melsungen AG)               |
|   |      | <b>Opbevaring:</b>                        | Normal temperatur  |
|   |      | <i>Anmærkninger:</i>                      | -  |
| Water for dissolution of 7.9<br>Ceftriaxon powder |      | <b>Active Pharmaceutical Ingredients:</b> | Sterile water  |
|   |      | <b>Form:</b>                              | Liquid in 10 ml container  |
|   |      | <b>Effect:</b>                            | -  |
|   |      | <b>Dosage:</b>                            | -  |
|   |      | <b>Side-effects:</b>                      | -  |
|   |      | <b>Validity:</b>                          | 3 years from the date of production<br>(sterile water mini-plasco®, B. Braun Melsungen AG) |
|   |      | <b>Storage:</b>                           | Normale temperature  |
|   |      | <i>Remarks:</i>                           | -  |

# **Fortegnelse og kontroldokument over lægemiddelstoffer**

## **Inventory and Control Document of Active Pharmaceutical Ingredients**



| Grp. No.  | ATC-code | Lægemiddelstof/<br>Active Pharmaceutical Ingredient | Adm. Form/Form       | Styrke /<br>Strength | Mængde/ Quantity<br>A |
|---|----------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Grp. 1 Ilt / Oxygen</b>  |          |   |                      |                      |                       |
| 1.1   | V03AN01  | Medicinsk ilt                                       | Gas                  | -                    | 20 l / 200 bar        |
| 1.1   | V03AN01  | Oxygen, Medical                                     | Gas                  | -                    | 20 l / 200 bar        |
| 1.3   | V03AN01  | Medicinsk ilt passende til A.1<br>(se note)         | Gas                  | -                    | 2 x 2 l / 200 bar     |
| 1.3   | V03AN01  | Oxygen Medical suitable to A.1<br>(see note)        | Gas                  | -                    | 2 x 2 l / 200 bar     |
| <b>1.3 Meddelelser A kapitel A IX B, bilag 1 / Notice A Chapter IX B, annex 1</b> |          |   |                      |                      |                       |
| <b>Grp. 2 Lokalbedøvelse / Local Anaesthetic</b>                                  |          |   |                      |                      |                       |
| 2.1 (π)   | N01BB02  | Lidocain  | Inj. Væske           | 10 mg / ml           | 5 x 20 ml             |
| 2.1 (π)   | N01BB02  | Lidocaine   | Inj. Liquid          | 10 mg / ml           | 5 x 20 ml             |
| 2.2   | D04AB01  | Lidocain  | Gel                  | 2%                   | 2 x 30 g              |
| 2.2   | D04AB01  | Lidocaine   | Gel                  | 2%                   | 2 x 30 g              |
| <b>Grp. 3 Smertestillende midler / Analgesics</b>                                 |          |   |                      |                      |                       |
| 3.1   | N02BE01  | Paracetamol   | Tablet               | 500 mg               | 200 stk.              |
| 3.1   | N02BE01  | Paracetamol   | Tablets              | 500 mg               | 200 pcs.              |
| 3.2 (π)   | M01AE01  | Ibuprofen   | Tablet               | 400 mg               | 100 stk.              |
| 3.2 (π)   | M01AE01  | Ibuprofen   | Tablets              | 400 mg               | 100 pcs.              |
| 3.4 (π)   | N02AA01  | Morfin Δ  | Inj. Væske           | 10 mg / ml           | 10 x 1 ml             |
| 3.4 (π)   | N02AA01  | Morphine Δ  | Inj. Liquid          | 10 mg / ml           | 10 x 1 ml             |
| 3.7   | M02AA15  | Diclofenac  | Gel                  | 11,6 mg / g          | 50 g                  |
| 3.7   | M02AA15  | Diclofenac  | Gel                  | 11,6 mg / g          | 50 g                  |
| 3.8 (π)   | M01AB05  | Diclofenac  | Supp.                | 50 mg                | 50 stk.               |
| 3.8 (π)   | M01AB05  | Diclofenac  | Supp.                | 50 mg                | 50 pcs.               |
| 3.9(π)  | N02AA01  | Morphin Δ   | Tablet               | 10 mg                | 30 stk                |
| 3.9(π)  | N02AA01  | Morphine Δ  | Tablets              | 10 mg                | 30 pcs.               |
| <b>Grp. 4 Allergi, shock og søsyge / Allergy, Shock and Seasickness</b>           |          |   |                      |                      |                       |
| 4.1 (π)   | C01CA24  | Adrenalin   | Inj. Væske           | 1 mg / ml            | 5 x 1ml               |
| 4.1(π)  | C01CA24  | Epinephrine   | Inj. Liquid          | 1 mg / ml            | 5 x 1ml               |
| 4.2   | R06AX18  | Acrivastin  | Kapsel               | 8 mg                 | 12 pcs.               |
| 4.2   | R06AX18  | Acrivastine   | Capsula              | 8 mg                 | 12 pcs.               |
| 4.3 (π)   | H02AB09  | Hydrocortison                                       | Inj. Tørstof + væske | 100 mg               | 2 hætteglas           |
| 4.3(π)  | H02AB09  | Hydrocortisonsuccinate                              | Inj. Subst + solvens | 100 mg               | 2 vials               |
| 4.5   | N07CA02  | Cinnarizin Δ  | Tablet               | 25 mg                | 50 pcs.               |
| 4.5   | N07CA02  | Cinnarizine Δ                                       | Tablets              | 25 mg                | 50 pcs.               |
| 4.6(π)  | H02AB06  | Prednisolon   | Tablet               | 25 mg                | 30 stk.               |
| 4.6(π)  | H02AB06  | Prednisolon   | Tablets.             | 25 mg                | 30 pcs.               |

| Grp. No.   | ATC-code | Lægemiddelstof/<br>Active Pharmaceutical Ingredient | Adm. Form/ Form      | Styrke /<br>Strength | Mængde/ Quantity A |
|--|----------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Grp. 5 Antidoter / Antidotes</b>  |          |   |                      |                      |                    |
| 5.1 (π)  | V03AB15  | Naloxon   | Inj. Væske           | 0,4 mg /ml           | 5 x 1 ml           |
| 5.1 (π)  | V03AB15  | Naloxone  | Inj. Liquid          | 0,4 mg /ml           | 5 x 1 ml           |
| 5.2 (π)  | H04AA01  | Glucagon "K" (se note)                              | Inj. Tørstof + væske | 1 mg                 | 0                  |
| 5.2 (π)  | H04AA01  | Glucagon "R" (see note)                             | Inj. Subst + solvens | 1 mg                 | 0                  |
| <b>5.2:</b> 2 sæt skal medbringes af besætningsmedlemmer med insulinkrævende sukkersyge / 2 sets to be carried by crew members with insulin dependent diabetes.              |          |   |                      |                      |                    |
| <b>Grp. 6 Akut sindssyge og kramper / Mental disorder and convulsion</b>   |          |   |                      |                      |                    |
| 6.2(π)   | N05BA01  | Diazepam Δ  | Tablet               | 5 mg                 | 25 stk.            |
| 6.2(π)   | N05BA01  | Diazepam Δ  | Tablets              | 5 mg                 | 25 pcs.            |
| 6.3(π)   | N05BA01  | Diazepam Δ  | Klyзма               | 4 mg / ml            | 10 x 2½ ml         |
| 6.3(π)   | N05BA01  | Diazepam Δ  | Enema                | 4 mg / ml            | 10 x 2½ ml         |
| 6.4(π)   | N05AD01  | Haloperidol Δ                                       | Inj. Væske           | 5 mg / ml            | 10 x 1 ml          |
| 6.4(π)   | N05AD01  | Haloperidol Δ                                       | Inj. Liquid          | 5 mg / ml            | 10 x 1 ml          |
| 6.5(π)   | N05CF02  | Zolpidem Δ  | Tablet               | 10 mg                | 20 stk.            |
| 6.5(π)   | N05CF02  | Zolpidem Δ  | Tablets              | 10 mg                | 20 pcs.            |
| <b>Grp. 7 Infektioner / Infections</b>   |          |   |                      |                      |                    |
| 7.1 (π)  | J01CE02  | Phenoxymethylpenicillin                             | Tablet               | 660-800 mg           | 100 stk.           |
| 7.1 (π)  | J01CE02  | Phenoxymethylpenicillin                             | Tablets              | 660-800 mg           | 100 pcs.           |
| 7.2(π)   | J01CA04  | Amoxicillin   | Tablet               | 500 mg               | 30 stk.            |
| 7.2(π)   | J01CA04  | Amoxicillin   | Tablets              | 500 mg               | 30 pcs.            |
| 7.6 (π)  | P01AB01  | Metronidazol  | Tablet               | 500 mg               | 24 stk.            |
| 7.6 (π)  | P01AB01  | Metronidazole                                       | Tablets              | 500 mg               | 24 pcs.            |
| 7.7(π)   | P01AB01  | Metronidazol  | Supp.                | 500 mg               | 20 stk.            |
| 7.7 (π)  | P01AB01  | Metronidazole                                       | Supp.                | 500 mg               | 20 pcs.            |
| 7.8(π)   | J01MA02  | Ciprofloxacin                                       | Tablet               | 250 mg               | 40 stk.            |
| 7.8 (π)  | J01MA02  | Ciprofloxacin                                       | Tablets              | 250 mg               | 40 pcs.            |
| 7.9 (π)  | J01DD04  | Ceftriaxon (se note)                                | inj. Tørstof         | 1 g                  | 20 x 1g            |
| 7.9 (π)  | J01DD04  | Ceftriaxon (see note)                               | inj. Subst           | 1 g                  | 20 x 1g            |
| 7.10 (π)   | -        | Tetanus holdig vaccine "K"                          | Inj. Væske           | -                    | 1 stk.             |
| 7.10 (π)   | -        | Vaccine containing Tetanus "R"                      | Inj. Liquid          | -                    | 1 pc.              |
| 7.11 (π)   | J06BB02  | Tetanus immunglobulin "K"                           | Inj. Væske           | 250 IU.              | 1 x 1 ml           |
| 7.11 (π)   | J06BB02  | Tetanus immunglobulin "R"                           | Inj. Liquid          | 250 IU.              | 1 x 1 ml           |
| 7.12 (π)   | J01CF05  | Flucloxacillin                                      | Tablet               | 500 mg               | 50 pcs             |
| 7.12 (π)   | J01CF05  | Flucloxacillin                                      | Tablet               | 500 mg               | 50 pcs             |
| 7.15(π)  | J01FA10  | Azithromycin  | Tablet               | 500 mg               | 5 x 3 stk.         |
| 7.15(π)  | J01FA10  | Azithromycin  | Tablets              | 500 mg               | 5 x 3 pcs.         |
| 7.16(π)  | J01CA08  | Pivmecillinam                                       | Tablet               | 400 mg               | 50 stk.            |
| 7.16(π)  | J01CA08  | Pivmecillinam                                       | Tablets              | 400 mg               | 50 pcs.            |
| 7.17(π)  | J05AB01  | Aciclovir   | Tablet               | 400 mg               | 70 stk.            |
| 7.17(π)  | J05AB01  | Acyclovir   | Tablets              | 400 mg               | 70 pcs.            |
| <b>7.9</b> Skibe med en overfartstid under 24 timer kan reducere mængden af Ceftriaxon fra 20 x1g til 5 x1 g. <b>OBS skal blandes med sterilt vand 16.7</b>                  |          |   |                      |                      |                    |
| <b>7.9</b> Ships which are engaged in voyage less than 24 hours may reduce the amount of Ceftriaxon from 20 x1g to 5 x1 g. <b>OBS shall be mixed with sterile water 16.7</b> |          |   |                      |                      |                    |

| Grp. No.   | ATC-code | Lægemiddelstof/<br>Active Pharmaceutical Ingredient | Adm. Form/<br>Form | Styrke /<br>Strength | Mængde/ Quantity A |                           |
|--|----------|---|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Grp. 8 Malaria / Malaria (se note /see note)</b>  |          |   |                    |                      | <b>Treatment</b>   | <b>Prevention</b>         |
| 8.1 (π)  | P01BB51  | Atovaquon/Proguanil                                 | Tablet             | 250 / 100 mg         | 0.                 | 24 stk.<br>/besætningmedl |
| 8.1 (π)  | P01BB51  | Atovaquon/Proguanil                                 | Tablets            | 250 / 100 mg         | 0                  | 24 pcs.<br>/crewmember    |
| 8.2 (π)  | J01AA02  | Doxycycline   | Tablet             | 100 mg               | 0                  | 80 stk.                   |
| 8.2 (π)  | J01AA02  | Doxycycline   | Tablets            | 100 mg               | 0                  | 80 pcs.                   |
| 8.4(π)   | P01BF01  | Artemether og lumefantrine                          | Tablet             | 20 / 120 mg          | 24 stk             | 0                         |
| 8.4(π)   | P01BF01  | Artemether and lumefantrine                         | tablets.           | 20 / 120 mg          | 24 pcs             | 0                         |
| <p>Malariamidler til behandling skal forefindes i skibe, der sejler til områder med malaria - uanset risiko.<br/>           Medicinsk forebyggelse kræves hovedsagelig ved sejls i høj risikoområder.<br/>           Højrisikoområder findes opdateret og beskrevet i Søfartsstyrelsens malariastrategi på følgende link<br/> <a href="http://www.sofartsstyrelsen.dk">http://www.sofartsstyrelsen.dk</a>.<br/>           Drugs for treatment of malaria must be carried by all ships sailing to or in areas where malaria is rec m morderd - irrespective of the risk.<br/>           Medical prevention is mainly required for ships sailing in high risk areas.<br/>           The High risk areas are available and updated on the "Danish Maritime Authority's malaria strategy" on the following link<br/> <a href="http://www.dma.dk">http://www.dma.dk</a></p> |          |   |                    |                      |                    |                           |
| Grp. No.   | ATC-code | Lægemiddelstof/<br>Active Pharmaceutical Ingredient | Adm. Form/ Form    | Styrke /<br>Strength | Mængde/ Quantity A |                           |
| <b>Grp. 9 Hjerte / Cardiac</b>   |          |   |                    |                      |                    |                           |
| 9.1  | C01DA02  | Glycerylnitrat                                      | Mund pray          | 0,4 mg/dose          | 1x200 doser        |                           |
| 9.1  | C01DA02  | Glyceryl trinitrate                                 | Oral spray         | 0,4 mg/dose          | 1x200 doses        |                           |
| 9.3  | B01AC06  | Acetylsalisylsyre                                   | Tablet             | 150 mg               | 100 stk.           |                           |
| 9.3  | B01AC06  | Acetylsalicylic Acid                                | Tablet             | 150 mg               | 100 pcs.           |                           |
| 9.4 (π)  | C03CA01  | Furosemid   | Tablet             | 40 mg                | 50 stk.            |                           |
| 9.4 (π)  | C03CA01  | Furosemide  | Tablet             | 40 mg                | 50 pcs.            |                           |
| 9.5 (π)  | C03CA01  | Furosemid   | Inj. væske         | 10 mg/ml             | 10x4 ml            |                           |
| 9.5 (π)  | C03CA01  | Furosemide  | Inj. Liquid        | 10 mg/ml             | 10x4 ml            |                           |
| 9.6 (π)  | C07AB03  | Atenolol  | Tablet             | 50 mg                | 100 stk.           |                           |
| 9.6 (π)  | C07AB03  | Atenolol  | Tablet             | 50 mg                | 100 pcs.           |                           |
| 9.8(π)   | B01AF02  | Apixaban  | Tablet             | 5 mg                 | 28 stk.            |                           |
| 9.8(π)   | B01AF02  | Apixaban  | Tablets            | 5 mg                 | 28 pcs.            |                           |
| 9.9(π)   | B02AA02  | Tranexamsyre  | Inj. væske         | 100 mg/ml            | 10 x 5 ml          |                           |
| 9.9(π)   | B02AA02  | Tranexamsyre  | Inj. liquid        | 100 mg/ml            | 10 x 5ml           |                           |
| <b>Grp. 10 Hud / Skin</b>  |          |   |                    |                      |                    |                           |
| 10.2 (π)   | D01AC02  | Miconazol   | Creme              | 2%                   | 4 x15 g            |                           |
| 10.2 (π)   | D01AC02  | Miconazol   | Lotion/Cream       | 2%                   | 4 x15 g            |                           |
| 10.5   | P03AC04  | Permethrin  | Creme              | 5%                   | 30 g               |                           |
| 10.5   | P03AC04  | Permethrin  | Lotion/Cream       | 5%                   | 30 g               |                           |
| 10.6   | P03AC04  | Permethrin  | Shampoo            | 1%                   | 50 ml              |                           |
| 10.6   | P03AC04  | Permethrin  | Shampoo            | 1%                   | 50 ml              |                           |
| 10.7 (π)   | D07AB02  | Glukocorticoid gruppe II                            | Creme              | Gruppe II            | 2 x 30 g           |                           |
| 10.7 (π)   | D07AB02  | Glucocorticoid group II                             | Lotion/Cream       | Group II             | 2 x 30 g           |                           |
| 10.8(π)  | D06AX01  | Fusidin   | Cream / Salve      | 2%                   | 4 x15 g            |                           |
| 10.8(π)  | D06AX01  | Fusidine  | Cream / Lotion     | 2%                   | 4 x 15 g           |                           |

| Grp. No.   | ATC-code | Lægemiddelstof/<br>Active Pharmaceutical Ingredient                | Adm. Form/ Form             | Styrke /<br>Strength   | Mængde/ Quantity A   |
|--|----------|--|-----------------------------|--|----------------------|
| <b>Grp. 11 Desinficering / Desinfectants</b>   |          |  |                             |  |                      |
| 11.1   | -        | Klorhexidin/ethanol (se note)                                      | Væske                       | 0.5 -5 %/70-85%  | 175 ml               |
| 11.1   | -        | Chlorhexidine/ethanol (see note)                                   | Liquid                      | 0.5 -5 %/70-85%  | 175 ml               |
| 11.2   | -        | Klorhexidin  | Væske                       | 0.2 %  | 4 x 250 ml           |
| 11.2   | -        | Chlorhexidine  | Liquid                      | 0.2 %  | 4 x 250 ml           |
| <b>11.1:</b> Alternativt kan anvendes Klorhexidin 0,5 % og Ethanol minimum 70 %, i 2 separate flasker. Blandes 1:1<br>Alternatively, Chlorhexidine 0,5 % and ethanol with a minimum of 70 % in 2 separate bottles. Mix 1:1 |          |  |                             |  |                      |
| <b>Grp. 12 Mave og tarm / Gastrointestinal</b>   |          |  |                             |  |                      |
| 12.6   | A07DA03  | Loperamid  | Tablet                      | 2 mg   | 60 pcs.              |
| 12.6   | A07DA03  | Loperamide   | Tablet                      | 2 mg   | 60 pcs.              |
| 12.7   | -        | Glukose/kalium/natriumcitrat /natriumklorid                        | Pulver                      | 13,5/1,5/2,9/2,6 g/pulver  | 18 x 20,5 g          |
| 12.7   | -        | Glucose/potassium/sodiumcitrate / sodiumchlorid                    | Powder                      | 13,5/1,5/2,9/2,6 g/powder  | 18 x 20,5 g          |
| 12.8 (π)   | A02BC01  | Omeprazol  | Tablet/Kapsel               | 20 mg  | 28 pcs.              |
| 12.8 (π)   | A02BC01  | Omeprazole   | Tablet/Capsula              | 20 mg  | 28 pcs.              |
| 12.9   | A02A     | Antacida   | Tablet eller oral opløsning | -  | 40 stk. eller 250 ml |
| 12.9   | A02A     | Antacid  | Tablet or oral solution     | -  | 40 pcs. or 250 ml    |
| 12.10 (π)  | C05A     | Hæmoride creme (skal indeholde glukokortikoid and smertestillende) | Creme/Salve                 | -  | 2 x 30 g             |
| 12.10 (π)  | C05A     | Anti haemorrhoid agent (Must contain glucocorticoid and analgesi)  | Lotion/Ointment             | -  | 2 x 30 g             |
| 12.13 (π)  | A04AA01  | Ondasetron   | Tablet                      | 4 mg   | 10 stk.              |
| 12.13 (π)  | A04AA01  | Ondasetron   | tablets.                    | 4 mg   | 10 pcs.              |
| 12.14  | A06AD65  | Movicol  | oral opløsning              | 46,6 mg kaliumchlorid, 13,125 g macrogol 3350, 350,7 mg natriumchlorid, 178,5 mg natriumhydroge ncarbonat. | 4 bokse af 8 stk.    |
| 12.14  | A06AD65  | Movicol  | oral solution               | 46,6 mg kaliumchlorid, 13,125 g macrogol 3350, 350,7 mg natriumchlorid, 178,5 mg natriumhydroge ncarbonat. | 4 boxes of 8 pcs.    |

| Grp. No.  | ATC-code | Lægemiddelstof/<br>Active Pharmaceutical Ingredient | Adm. Form/ Form  | Styrke /<br>Strength               | Mængde/ Quantity A |
|---|----------|---|------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>Grp. 13 Øjne og øre / Eyes and ears</b>  |          |   |                  |                                    |                    |
| 13.3 (π)  | S01BA01  | Dexamethasone                                       | Dråber           | 1 mg / ml                          | 5 ml               |
| 13.3 (π)  | S01BA01  | Dexamethasone                                       | Drops            | 1 mg / ml                          | 5 ml               |
| 13.4 (π)  | S01EB51  | Pilocarpin  | Dråber           | 2 %                                | 10 ml              |
| 13.4 (π)  | S01EB51  | Pilocarpine   | Drops            | 2 %                                | 10 ml              |
| 13.6 (π)  | S01AD03  | Aciclovir   | Salve            | 3 %                                | 4,5 g              |
| 13.6 (π)  | S01AD03  | Acyclovir   | Ointment         | 3 %                                | 4,5 g              |
| 13.9  | -        | Medium til at blødgøre ørevoks,<br>inkl. øresprøjte | -                | -                                  | 10 ml              |
| 13.9  | -        | Medium to soften earwax,<br>incl. earsyringe        | -                | -                                  | 10 ml              |
| 13.11 (π)   | S01FA06  | Tropicamid  | Dråber           | 1 %                                | 15 ml              |
| 13.11 (π)   | S01FA06  | Tropicamide   | Drops            | 1 %                                | 15 ml              |
| 13.12(π)  | S02CA03  | Ciprofloxacin / Hydrocortison                       | Øredråber        | 10+2 mg/ml                         | 3 x 10 ml          |
| 13.12(π)  | S02CA03  | Ciprofloxacin / Hydrocortisone                      | Eardrops         | 10+2 mg/ml                         | 3 x 10ml           |
| 13.13(π)  | S01AA01  | Kloramfenikol                                       | øjensalve        | 1%                                 | 2 x 4,3 - 5 g      |
| 13.13(π)  | S01AA01  | Chloramphenicol                                     | eye ointment     | 1%                                 | 2 x 4,3 - 5 g      |
| 13.14(π)  | S01BC03  | Diclofenac  | øjendråber       | 1 mg/ml                            | 5 x10 ml           |
| 13.14(π)  | S01BC03  | Diclofenac  | eye drops        | 1 mg/ml                            | 5 x10 ml           |
| <b>Grp. 14 Gynækologi /Gynaecology</b>  |          |   |                  |                                    |                    |
| 14.1 (π)  | J02AC01  | Fluconazol  | Kapsel           | 150 mg                             | 2 stk.             |
| 14.1 (π)  | J02AC01  | Fluconazole   | Capsula          | 150 mg                             | 2 pcs.             |
| 14.2 (π)  | G02AB01  | Methyleergometrin                                   | Tablet           | 0,125 mg                           | 10 pcs.            |
| 14.2 (π)  | G02AB01  | Methyleergometrine                                  | Tablet           | 0,125 mg                           | 10 pcs.            |
| <b>14.2 skal kun forefindes, HVIS der er kvinder om bord.<br/>14.2 shall only be available IF women on board.</b> |          |   |                  |                                    |                    |
| <b>Grp. 15 Astma og forkølelse / Astma and common cold</b>  |          |   |                  |                                    |                    |
| 15.1 (π)  | R05DA09  | Dextromethorphan                                    | Tablet           | 30 mg                              | 40 stk.            |
| 15.1 (π)  | R05DA09  | Dextromethorphane                                   | Tablet           | 30 mg                              | 40 pcs.            |
| 15.5  | R01AA07  | Xylometazolin                                       | Dråber / Spray   | 1 mg / ml                          | 3 x 10 ml          |
| 15.5  | R01AA07  | Xylometazoline                                      | Drops / Spray    | 1 mg / ml                          | 3 x 10 ml          |
| 15.7(π)   | R03AC03  | Salbutamol  | Spray            | 0,1 mg/dosis                       | 200 doser          |
| 15.7(π)   | R03AC03  | Salbutamol  | Spray            | 0,1 mg/dosage                      | 200 dosis          |
| 15.8(π)   | R03BA01  | Glucocorticoid (inhalation)                         | Spray            | 100-200<br>mikrogram pr.<br>dosis  | 100 doser          |
| 15.8(π)   | R03BA01  | Glucocorticoid (inhalation)                         | Spray            | 100-200<br>mikrogram per<br>dosage | 100 dosis          |
| <b>Grp. 16 Infusionsvæsker og lign. / Liquid for infusion and similar (se note / see note)</b>                    |          |   |                  |                                    |                    |
| 16.1 (π)  | B05BB01  | Natriumklorid                                       | Inf. Væske       | 0.9 %                              | 10 x 1 liter       |
| 16.1 (π)  | B05BB01  | Sodium chloride                                     | Inf. Liquid      | 0.9 %                              | 10 x 1 litre       |
| 16.2 (π)  | B05BB02  | Glucose + Natriumklorid                             | Inf. Væske       | 25/4,5 mg/ml                       | 10 x 1 liter       |
| 16.2 (π)  | B05BB02  | Glucose + Sodium chlorid                            | Inf. Liquid      | 25/4,5 mg/ml                       | 10 x 1 litre       |
| 16.5 (π)  | V07AB    | Natriumklorid                                       | Væske            | 0.9 %                              | 20 x 20 ml         |
| 16.5 (π)  | V07AB    | Sodium chloride                                     | Liquid           | 0.9 %                              | 20 x 20 ml         |
| 16.7  | V07AB    | Steril vand til blanding af 7.9                     | Parenteral væske | -                                  | 20 x10 ml          |
| 16.7  | V07AB    | Sterile water to mix 7.9                            | Parenteral væske | -                                  | 20 x 10 ml         |
| Infusionsvæskerne må ikke være i glasbeholder<br>Infusion liquids may not be in glass container                   |          |   |                  |                                    |                    |

**Besætningens medbragte medicin / Crew member's private medicine**

| Tilhører besætningsmedlem<br><i>Belongs to crewmember</i> | Medicinens navn<br><i>Name of medicine</i> | Antal<br><i>Quantity</i> | Daglig dosis<br><i>Daily dosage</i> | Dato ind<br><i>Date in</i> | Kvittering modtagelsen<br><i>Signature recieving</i> | Dato ud<br><i>Date out</i> | Kvittering for udlevering<br><i>Signature for extradition</i> |
|---|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|----------------------------|---|
|   |  |                          |                                     |                            |  |                            |   |
|   |  |                          |                                     |                            |  |                            |   |
|   |  |                          |                                     |                            |  |                            |   |
|   |  |                          |                                     |                            |  |                            |   |
|   |  |                          |                                     |                            |  |                            |   |
|   |  |                          |                                     |                            |  |                            |   |
|   |  |                          |                                     |                            |  |                            |   |
|   |  |                          |                                     |                            |  |                            |   |
|   |  |                          |                                     |                            |  |                            |   |
|   |  |                          |                                     |                            |  |                            |   |
|   |  |                          |                                     |                            |  |                            |   |
|   |  |                          |                                     |                            |  |                            |   |
|   |  |                          |                                     |                            |  |                            |   |
|   |  |                          |                                     |                            |  |                            |   |
|   |  |                          |                                     |                            |  |                            |   |
|   |  |                          |                                     |                            |  |                            |   |
|   |  |                          |                                     |                            |  |                            |   |
|   |  |                          |                                     |                            |  |                            |   |
|   |  |                          |                                     |                            |  |                            |   |
|   |  |                          |                                     |                            |  |                            |   |
|   |  |                          |                                     |                            |  |                            |   |
|   |  |                          |                                     |                            |  |                            |   |
|   |  |                          |                                     |                            |  |                            |   |
|   |  |                          |                                     |                            |  |                            |   |
|   |  |                          |                                     |                            |  |                            |   |
|   |  |                          |                                     |                            |  |                            |   |
|   |  |                          |                                     |                            |  |                            |   |
|   |  |                          |                                     |                            |  |                            |   |
|   |  |                          |                                     |                            |  |                            |   |
|   |  |                          |                                     |                            |  |                            |   |
|   |  |                          |                                     |                            |  |                            |   |
|   |  |                          |                                     |                            |  |                            |   |
|   |  |                          |                                     |                            |  |                            |   |
|   |  |                          |                                     |                            |  |                            |   |



**Fortegnelse og Kontrolokument  
over medicinsk udstyr**

**Inventory and Control Document  
of Medical Equipment**



| Grp. No.  | Medicinsk udstyr / Medical equipment                   | Mængde/ Quantity A |
|---|--|--------------------|
| <b>A. Genoplivningsudstyr / Resuscitation equipment</b>                                 |  |                    |
| A.1   | Mobilt genoplivningsudstyr, klargjort (se note)        | 1 sæt              |
| A.1   | Mobile resuscitation equipment (see note)              | 1 set              |
| A.5   | Tungeholdere, størrelse 3                              | 1 stk.             |
| A.5   | Guidel airway, size 3                                  | 1 pcs.             |
| A.8   | Kraftig klædesaks                                      | 1 stk.             |
| A.8   | Strong scissors for clothes                            | 1 pcs.             |
| A.9   | Sugekatetre, lige, CH 12                               | 5 stk.             |
| A.9   | Suction catheters, straight, CH 12                     | 5 pcs.             |
| A.10  | Tæppe til behandling af hypotermi                      | 1 stk.             |
| A.10  | Blanket for treatment of hypothermia                   | 1 pcs.             |
| A.11  | Almindelige tæpper                                     | 6 stk.             |
| A.11  | Ordinary blankets                                      | 6 pcs.             |
| A.12  | Saturationsmåler (fingermodel)                         | 1 stk.             |
| A.12  | Puls oximeter (finger)                                 | 1 pcs.             |
| A.13  | Hudson maske med reservoirpose med ca. 1,8 m slange    | 5 stk.             |
| A.13  | Hudson mask with reservoir bag with approx. 1.8 m tube | 5 pcs.             |
| A.18  | Hjertestarter 8AED)                                    | 1 stk.             |
| A.18  | Automatic extern difibrillator (AED)                   | 1 pc.              |
| A.19  | Iltbrille  | 5 stk.             |
| A.19  | Nasal Cannula  | 5 pcs.             |
| <b>A.1:</b> Meddelelser A kapitel A IX B, bilag 1 / A.1: Notice A Chapter IX B, annex 1 |  |                    |

| <b>B. Forbindinger og plastre / Dressings and adhesive tape</b> |  |             |
|---|--|-------------|
| B.1   | Sterile gazekompresser, ca.5 x 5 cm, ca.8 lag                                | 20 stk.     |
| B.1   | Sterile gaze compress, approx.5 x 5 cm, approx. 8 layers                     | 20 pcs.     |
| B.2   | Sterile gazekompresser, ca. 10 x 10 cm, ca. 8 lag                            | 20 stk.     |
| B.2   | Sterile gaze compress, approx.10 x10 cm, approx. 8 layers                    | 20 pcs.     |
| B.3   | Steril absorberende ikke-klæbende forbindelse, ca. 20 x 30 cm                | 5 stk.      |
| B.3   | Sterile absorbent non-adhesive surgical dressing bandage, approx. 20 x 30 cm | 5 pcs.      |
| B.4   | Sterile kompresforbindinger, ca. 8 cm  | 10 ruller   |
| B.4   | Sterile compress bandages, approx. 8 cm                                      | 10 rolls    |
| B.5   | Imprægnerede net, ca. 10 x 10 cm, "Jelonet"                                  | 2 x 10 stk. |
| B.5   | Impregnated nets, approx. 10 x 10 cm, "Jelonet"                              | 2 x 10 pcs. |
| B.6   | Steril absorberende forbindinger, ikke klæbende, ca. 10 x 10 cm              | 5 stk.      |
| B.6   | Sterile non-adhesive surgical dressing bandages, approx. 10 x 10 cm          | 5 pcs.      |
| B.7   | Gazeviskers, usterile  | 100 stk.    |
| B.7   | Gauze swaps, non-sterile   | 100 pcs.    |
| B.8   | Tube gaze til fingerforbindinger   | 10 stk.     |
| B.8   | Tube shaped gauze for finger bandaging                                       | 10 pcs.     |
| B.9   | Elastisk gazebind, ca. 4 cmx4m   | 10 ruller   |
| B.9   | Elastic gauze bandage, approx. 4 cmx4m                                       | 10 rolls    |
| B.10  | Hæfteplaster med sårpude, forskellige størrelser, lommepakning               | 1 pakke     |
| B.10  | Adhesive tape with compress, various sizes, pocket pack                      | 1 pack      |
| B.11  | Hæfteplaster med sårpude, ca. 6 cm x 1m                                      | 5 pakker    |
| B.11  | Adhesive tape with compress, approx. 6 cm x 1m                               | 5 packs     |
| B.12  | Fikseringsplaster Fixomull, ca. 10 cm x 10 m                                 | 1 rulle     |
| B.12  | Adhesive tape Fixomull, approx. 10 cm x 10 m                                 | 1 roll      |
| B.13  | Fikseringsplaster, "Englehud", ca. 2 cm                                      | 2 ruller    |
| B.13  | Adhesive tape, "peau d'ange", approx. 2 cm                                   | 2 rolls     |
| B.18  | Årepresse til massiv blødning  | 1 stk.      |
| B.18  | Tourniquet for massive bleeding  | 1 pc.       |

| Grp. No.   | Medicinsk udstyr / Medical equipment                                   | Mængde/ Quantity A |
|--|--|--------------------|
| <b>C. Udstyr til hygiejne / Equipment for sanitation</b> |  |                    |
| C.1  | Engangshandsker af latex, usterile, X-large                            | 100 stk.           |
| C.1  | Disposable gloves, latex, non-sterile, X-large                         | 100 pcs.           |
| C.2  | Engangshandsker af latex, usterile, large                              | 100 stk.           |
| C.2  | Disposable gloves, latex, non-sterile, large                           | 100 pcs.           |
| C.5  | Vaskesvampe, éngangs   | 25 stk.            |
| C.5  | Bath sponge, disposable  | 25 pcs.            |
| C.6  | Beskyttelsesbriller  | 1 stk.             |
| C.6  | Protective goggles   | 1 pc.              |
| C.7  | Steril afdækning, ca. 50 x 50 cm                                       | 5 stk.             |
| C.7  | Sterile drape, approx. 50 x 50 cm                                      | 5 pcs.             |
| C.8  | Flydende medicinsk sæbe pH 4,5   | 250 ml             |
| C.8  | Liquid medical soap pH 4,5   | 250 ml             |
| C.9  | Mundbind 3 lags, bredde 18 cm  | 50 stk.            |
| C.9  | Mask, 3 layer, width 18 cm   | 50 pcs.            |
| C.10   | Ligpose voksen   | 1 stk.             |
| C.10   | Body bag adult   | 1 pc.              |
| C.11   | Engangshandsker af latex, usterile, medium                             | 100 stk.           |
| C.11   | Disposable gloves, latex, non-sterile, medium                          | 100 pcs.           |
| C.12   | Engangshandsker af latex, usterile, small                              | 100 stk.           |
| C.12   | Disposable gloves, latex, non-sterile, small                           | 100 pcs.           |
| C.13   | Engangsforklæde  | 10 stk.            |
| C.13   | Disposable apron   | 10 pcs.            |
| C.14   | Lagen, sterilt   | 1 stk.             |
| C.14   | Bed sheet, sterile   | 1 pc.              |
| C.15   | Absorberende underlag, ca.6 lag, 60x40 cm, usteril, engangs            | 10 stk.            |
| C.15   | Absorbent underlay, approx.6 layers, 60x40 cm, non-sterile, disposable | 10 pcs.            |
| C.16   | Opkastpose   | 10 stk.            |
| C.16   | Vormit bag   | 10 pcs.            |

| Grp. No.                                      | Medicinsk udstyr / Medical equipment                        | Mængde/ Quantity A |
|---|---|--------------------|
| <b>D. Sårbehandling / Treatment of wounds</b> |   |                    |
| D.1   | Suturtape, "Steri-Strip™"                                   | 25 stk.            |
| D.1   | Suturetape, "Steri-Strip™"                                  | 25 pcs.            |
| D.2   | Klæbesutur, Dermabond                                       | 6 amuller          |
| D.2   | Adhesive suture, Dermabond                                  | 6 ampoules         |
| D.4   | Ikke-absorberbar sutur, 3.0; 45 cm. FS eller DS 25          | 12 stk.            |
| D.4   | Non-absorbable suture, 3.0; 45 cm. FS or DS 25              | 12 pcs.            |
| D.5   | Rustfri stålæske med låg, ca. 18x9x3 cm                     | 1 stk.             |
| D.5   | Instrument box, stainless steel with lid, approx. 18x9x3 cm | 1 pc.              |
| D.6   | Engangsskalpel, steril, nr. 23                              | 5 stk.             |
| D.6   | Disposable scalpel, sterile, no. 23                         | 5 pcs.             |
| D.7   | Kirurgisk saks med lige spids                               | 1 stk.             |
| D.7   | Surgical scissors w/straight points                         | 1 pc.              |
| D.8   | Kirurgisk saks med krum spids                               | 1 stk.             |
| D.8   | Surgical scissors w/curved points                           | 1 pc.              |
| D.9   | Kirurgisk pincet, ca. 14 - 16 cm                            | 1 stk.             |
| D.9   | Surgical forceps (tweezers), approx. 14 -16 cm              | 1 pc.              |
| D.10  | Anatomisk pincet  | 1 stk.             |
| D.10  | Anatomical forceps (tweezers)                               | 1 pc.              |
| D.11  | Splintpincet  | 1 stk.             |
| D.11  | Forceps, splinter (tweezers)                                | 1 pc.              |
| D.12  | Pean, krum  | 2 stk.             |
| D.12  | Pean, curved  | 2 pcs.             |
| D.13  | Nåleholder  | 2 stk.             |
| D.13  | Suture - holder   | 2 pcs.             |
| D.14  | Barbermaskine (skraber), engangs                            | 3 stk.             |
| D.14  | Safety razor, disposable single use                         | 3 pcs.             |
| D.15  | Absorberbar hæmostatisk gelatinesvamp, ca.1 x 1 x 1 cm      | 8 stk.             |
| D.15  | Haemostatic absorbable gelatine sponge, approx.1 x 1 x 1 cm | 8 pcs.             |
| D.17  | Ikke-absorberbar sutur, 5.0; 45 cm. FS eller DS25           | 12 stk             |
| D.17  | Non-absorbable suture, 5.0; 45 cm. FS eller DS25            | 12 pcs.            |

| Grp. No.  | Medicinsk udstyr / Medical equipment                               | Mængde/ Quantity A |
|---|--|--------------------|
| <b>E. Udstyr til injektion og infusion / Equipment for injection and infusion</b> |  |                    |
| E.1   | Kanylebøtte  | 1 stk.             |
| E.1   | Box for contaminated needles                                       | 1 pc.              |
| E.2   | Afsprøjtningssvaps m. isopropylalkohol 70%                         | 200 stk.           |
| E.2   | Alcohol swabs, isopropyl alcohol 70%                               | 200 pcs.           |
| E.3   | Staserem   | 2 stk.             |
| E.3   | Tourniquet for i.v.  | 2 pcs.             |
| E.4   | Intravenøs kanyler, 1,1 x 32, 20 g                                 | 20 stk.            |
| E.4   | Intravenous Cannula, 1.1 x 32, 20 g                                | 20 pcs.            |
| E.5   | Fikseringsplaster til intravenøs kanyler                           | 20 stk.            |
| E.5   | Fixing plaster for intravenous cannula                             | 20 pcs.            |
| E.6   | Kanyler, steril til engangsbrug, 0,6 x 30 (~ 23G x 1 1/4)          | 50 stk.            |
| E.6   | Needle, sterile, disposable single use, 0.6 x 30 (~ 23G x 1 1/4)   | 50 pcs.            |
| E.7   | Sprøjter, sterile til engangsbrug, Luer, 2 ml                      | 20 stk.            |
| E.7   | Syringes, sterile, single use, Luer, 2 ml                          | 20 pcs.            |
| E.8   | Sprøjter, sterile til engangsbrug, Luer, 5 ml                      | 20 stk.            |
| E.8   | Syringes, sterile, single use, Luer, 5 ml                          | 20 pcs.            |
| E.9   | Sprøjter, sterile til engangsbrug, Luer, 10 ml                     | 20 stk.            |
| E.9   | Syringes, sterile, single use, Luer, 10 ml                         | 20 pcs.            |
| E.10  | Infusionsæt med gevindtilslutning til E.4, sterile til engangsbrug | 10 stk.            |
| E.10  | Infusion set with threaded connection for E.4, sterile, single use | 10 pcs.            |
| <b>F. Udstyr til medicinsk undersøgelse / Equipment for medical examination</b>   |  |                    |
| F.1   | Blodtryksmåler   | 1 stk.             |
| F.1   | Instrument for measuring blood pressure                            | 1 pc.              |
| F.2   | Stetoskop  | 1 stk.             |
| F.2   | Stethoscope  | 1 pc.              |
| F.3   | Digitalt lægetermometer  | 2 stk.             |
| F.3   | Digital clinical thermometer                                       | 2 pcs.             |
| F.4   | Pencillygte m. batterier   | 2 stk.             |
| F.4   | Pencil lamp w/batteries  | 2 pcs.             |
| F.5   | Tungespatel, usterile, engangs                                     | 10 stk.            |
| F.5   | Tongue depressor, non-sterile, single use disposable               | 10 pcs.            |
| F.7   | Hypotermi Termometer se note *                                     | 1 stk              |
| F.7   | Hypotermi thermometer see note *                                   | 1 pc.              |

\*)F.7 Termometret skal kunne måle minimum ned til 26°C. Bruges i endetarm.

\*)F.7 The thermometer have to be able to minimum measure down to 26°C. The thermometer is used rectal.

| Grp. No.   | Medicinsk udstyr / Medical equipment   | Mængde/ Quantity A |
|--|--|--------------------|
| <b>G. Udstyr til undersøgelse af blod og urin / Equipment for examination of blood and urine</b> |  |                    |
| G.1  | "Multistix® 5", urintest for blod/glukose/protein/nitrit/leukocytter   | 50 stk.            |
| G.1  | "Multistix® 5", Urinetest for blood/glucose/protein/nitrite/leukocytes   | 50 pcs.            |
| G.2  | Graviditetstest  | 2 stk.             |
| G.2  | Pregnancy test kit   | 2 pcs.             |
| G.5  | Malariatest, minimum for Plasmodium Falciparum, inkl. reagens og brugervejledning.   | 6 stk.             |
| G.5  | Malaria test, minimum for Plasmodium Falciparum, incl. reagens and userinstruction.  | 6 pcs.             |
| G.6  | Lancetter (fingerprikker)  | 6 stk.             |
| G.6  | Lancets (finger pricker)   | 6 pcs.             |
| G.7  | Udstyr til måling af blodsukker (se note)  | 0                  |
| G.7  | Equipment for measuring bloodsugar (see note)  | 0                  |
| G.8  | Hurtig test C-reaktiv protein (CRP)  | 5 stk.             |
| G.8  | Rapid test for C- reaktive proteine (CRP)  | 5 pcs.             |
| <b>G.2</b>   | Skal kun forefindes, HVIS der er kvinder om bord.  |                    |
| <b>G.2</b>   | Shall only be available IF women on board.   |                    |
| <b>G.5+G.6</b>   | Malariatest og Lancetter skal forefindes i skibe, der sejler til områder med malaria - uanset risiko.                              |                    |
| <b>G.5+G.6</b>   | Malaria test and Lancets must be carried by all ships sailing to or in areas where malaria is recorded - irrespective of the risk. |                    |
| <b>G.7</b>   | 1 sæt skal medbringes af besætningsmedlemmer med insulinkrævende sukkersyge  |                    |
| <b>G.7</b>   | 1 set to be carried by crew members with insulin dependent diabetes.   |                    |
| <b>H. Øjenundersøgelse og behandling / Eye examination and treatment</b>                         |  |                    |
| H.1  | Pencillygte med UV lys, inkl. batterier  | 1 stk.             |
| H.1  | Lamp with UV light w/batteries   | 1 pc.              |
| H.2  | Fluoretsstrips til farvning af øjet  | 10 stk.            |
| H.2  | Fluorescent colour for the eye   | 10 pcs.            |
| H.3  | Vatpinde, sterile  | 50 stk.            |
| H.3  | Cotton sticks, sterile   | 50 pcs.            |
| H.4  | Horners hulmejsel  | 1 stk.             |
| H.4  | Horners spud   | 1 pc.              |
| H.5  | Øjenklap   | 2 stk.             |
| H.5  | Eye patch  | 2 pcs.             |
| H.6  | Øjenskyllvæske, Natriumchlorid 0,9%, 250 ml  | 8 stk.             |
| H.6  | Eye irrigating liquid, Sodium chloride 0.9%, 250 ml  | 8 pcs.             |
| <b>I. Udstyr til tømning af urinblæren / Equipment for drainage of urinary bladder</b>           |  |                    |
| I.1  | Engangskatetre m. krum spids, CH 14, til mænd  | 10 stk.            |
| I.1  | Catheters for single use w/ curved tip, CH 14 for men  | 10 pcs.            |
| I.2  | Urinkolbe, plastic   | 1 stk.             |
| I.2  | Bed bottle, plastic  | 1 pc.              |
| I.3  | Engangskatetre CH 14 til kvinder   | 5 stk.             |
| I.3  | Catheters for single use, CH 14 for women  | 5 pcs.             |

| Grp. No.   | Medicinsk udstyr / Medical equipment                    | Mængde/ Quantity A |
|--|---|--------------------|
| <b>J. Udstyr til forstuvninger og brud / Equipment for sprains and fractures</b>                   |   |                    |
| J.1  | "ColdHot™" kulde/varme omslag, 11 x 27 cm               | 1 stk.             |
| J.1  | "ColdHot™" pack 11x24 cm                                | 1 pc.              |
| J.2  | Elastikbind, ca. 10 cmx5m                               | 3 stk.             |
| J.2  | Elastic bandage, approx. 10 cmx5m                       | 3 pcs.             |
| J.3  | Elastikbind, ca. 6 cmx5m                                | 1 stk.             |
| J.3  | Elastic bandage, approx. 6 cmx5m                        | 1 pc.              |
| J.4  | Trekantet tørklæde (Mitella)                            | 2 stk.             |
| J.4  | Triangular scarf (Mitella)                              | 2 pcs.             |
| J.5  | Sikkerhedsnåle  | 12 stk.            |
| J.5  | Safety pins   | 12 pcs.            |
| J.6  | Fingerskinne til immobilisering af ét led               | 5 stk.             |
| J.6  | Finger splint for immobilisation of one joint           | 5 pcs.             |
| J.7  | Fingerskinne til immobilisering af to led               | 5 stk.             |
| J.7  | Finger splint for immobilisation of two joints          | 5 pcs.             |
| J.8  | Polsterbind, ca. 10 cm x 2,7 m                          | 10 stk.            |
| J.8  | Padded bandages, approx. 10 cm x 2.7 m                  | 10 pcs.            |
| J.9  | Gipsbind, ca. 12 cm x 2m                                | 10 stk.            |
| J.9  | Plaster bandage, approx. 12 cm x 2m                     | 10 pcs.            |
| J.10   | Fikseringsplaster, Tensoplast, ca. 2 cm x 2m            | 2 ruller           |
| J.10   | Adhesive tape, Tensoplast, approx. 2 cm x 2m            | 2 rolls            |
| <b>K. Udstyr til immobilisering og transport / Equipment for immobilisation and transportation</b> |   |                    |
| K.1  | Båre, egnet til K.5 (se note)                           | 1 stk.             |
| K.1  | Stretcher, suitable for K.5 (see note)                  | 1 pc.              |
| K.2  | Oppustelig frakturskinne, senior, hel arm               | 1 stk.             |
| K.2  | Inflatable fracture splint, senior, full arm            | 1 pc.              |
| K.3  | Oppustelig frakturskinne, senior, hel ben               | 1 stk.             |
| K.3  | Inflatable fracture splint, senior, full leg            | 1 pc.              |
| K.4  | Stiv halskrave, indstillelig til forskellige positioner | 2 stk.             |
| K.4  | Stiff neck collar, adjustable                           | 2 pcs.             |
| K.5  | Langt rygbræt, inkl. seler (se note)                    | 1 stk.             |
| K.5  | Spineboard, incl straps (see note)                      | 1 pc.              |
| <b>K.2 - K.4</b> pakkes og opbevares sammen. / <b>K.2-K.4</b> packed and stored together           |   |                    |
| <b>K.1 + K.5</b> Meddelelser A kapitel IX B, bilag 3 / <b>Notice A Chapter IX B, annex 3</b>       |   |                    |

| Grp. No.   | Medicinsk udstyr / Medical equipment                                      | Mængde/ Quantity A |
|--|---|--------------------|
| <b>L. Tandlægeudstyr / Equipment for dental examination and treatment (Se note / see note)</b>   |   |                    |
| L.1  | Coltosol®, færdigblandet tandcement i tuber à 8g (se note)                | 5 stk.             |
| L.1  | Coltosol®, dental filling material ready for use, tubes of 8 g (see note) | 5 pcs.             |
| L.2  | Skyllekanyle  | 1 stk.             |
| L.2  | Dental rinse needle   | 1 pc.              |
| L.3  | Specialinstrument til tandcement  | 1 stk.             |
| L.3  | Special instrument for dental filling material                            | 1 pc.              |
| L.4  | Mundspejl   | 1 stk.             |
| L.4  | Mouth mirror  | 1 pc.              |
| L.5  | Ekskavator  | 1 stk.             |
| L.5  | Excavator   | 1 pc.              |
| L.6  | Fyldningsfjerner  | 1 stk.             |
| L.6  | Filling remover   | 1 pc.              |
| L.7  | Rustfri stålæske med låg til tandudlægeudstyr                             | 1 stk.             |
| L.7  | Instrument box, stainless steel with lid for dental equipment             | 1 pc.              |
| <p><b>L:</b> Tandlægeudstyr skal ikke forefindes på skibe med fart mindre end 175 sømil fra EU/EØS landes kyster.<br/> <b>L:</b> Dental equipment shall not be on ships in voyage less than 175 nautical miles from EU/EEA countries' coast<br/> <b>L.1:</b> Tandcement skal være inklusive instrument til uddrivning af cement fra tuben.<br/> <b>L.1:</b> Filling material shall include instrument for expulsion of the material from the tube.</p> |   |                    |
| <b>M. Udstyr til sygepleje / Requisites for nursing</b>  |   |                    |
| M.1  | Medicinmålebægre, ca. 25 ml, éngangs                                      | 20 stk.            |
| M.1  | Graduated measuring cup, approx. 25 ml, disposable                        | 20 pcs.            |
| M.2  | Varmedunk   | 1 stk.             |
| M.2  | Hot-water bottle  | 1 pc.              |
| M.3  | Bækken  | 1 stk.             |
| M.3  | Bedpan  | 1 pc.              |
| <b>N. Insektbekæmpelsesmidler og kloreringsmidler til rensning af drikkevand/ Insecticides and chlorinating agents for purifying drinking water (se note / see note)</b>   |   |                    |
| N.1  | Insektbekæmpelsesmiddel - pulver form (se note)                           | 1 dåse             |
| N.1  | Insecticide, not specified - powder form ( see note)                      | 1 tin              |
| N.2  | Kloreringsmiddel til drikkevand, 100 g                                    | 2 stk.             |
| N.2  | Chlorinating agent for drinking water, 100 g                              | 2 pcs.             |
| N.3  | Insektbekæmpelsesmiddel- væskeform (se note)                              | 1 dåse             |
| N.3  | Insecticide - liquid form (see note)                                      | 1 Tin              |
| <p><b>N.1 + N.2 + N.3</b> Klor og insektbekæmpelsesmidler må ikke opbevares sammen med lægemidler og medicinsk udstyr.<br/> <b>N.1 + N.2 + N.3</b> Chlor and insecticides must not be stored within the ship medicine chest</p>  |   |                    |
| <b>O. Fortegnelser, lægebog m.v. / Inventories, Medical Guide, etc.</b>  |   |                    |
| O.2  | Lægebog for Søfarende, udgivet af Seahealth                               | 1 stk.             |
| O.2  | Medical guide for seafarers issued by Seahealth                           | 1 pc.              |
| O.3  | Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning (se note)                | 1 stk kat. A       |
| O.3  | Inventory, Control Document and User Instruction (see note)               | 1 pc. Cat. A       |
| O.5  | Radio Medical Optegnelser   | 1 stk.             |
| O.5  | Radio Medical Records   | 1 pc.              |
| <p><b>O.2</b> Skal også forefindes på engelsk, såfremt der om bord er påmønstret ikke dansktalende besætningsmedlemmer.<br/> <b>O.2</b> Must also be available in English, if crewmembers who don't speak Danish have signed on.<br/> <b>O.3</b> skal være tilgængelig i digital eller printet udgave.<br/> <b>O.3</b> must be available in digital or printed version.</p>  |   |                    |



# Labels

|  |
|--|
| <p>1.1 + 1.3 Gas / Gas<br/> <b>Medicinsk ilt / Medical Oxygen</b><br/> Indikation : Bevidstløse uden vejtrækning, Bevidstløse med vejtrækning, Medtaget almen tilstand. Slag mod kraniet, Større kvæstelser, Vejtrækningsbesvær<br/> Indication: Unconscious, Weak general condition, Blows to the skull. Severe injuries, Difficulty breathing.<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring: Opbevares adskilt fra brandbare gasser og stoffer.<br/> Hold flasketemperaturen under 50°C /<br/> Storage: Keep away from flammable gases and substances. Keep the temperature of the bottle under 50°C</p> |
| <p>2.1 Inj. væske / inj. liquid<br/> <b>Lidocain 10 mg/ml</b><br/> Indikation / Indication: Lokalbedøvelse / Local anaesthetic<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>  |
| <p>2.2 Gel / gel<br/> <b>Lidocain 2%</b><br/> Indikation/Indication: Lokalbedøvelse / Local anaesthetic<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>   |
| <p>3.1 Tablet / tablet<br/> <b>Paracetamol 500 mg</b><br/> Indikation / Indication: Svage smerter / Weak pain;<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>  |
| <p>3.2 Tablet / tablet<br/> <b>Ibuprofen 400 mg</b><br/> Indikation / Indication: Moderate smerter / Moderate pain<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>  |
| <p>3.4 Inj.væske / inj.liquid <math>\Delta</math><br/> <b>Morfin 10 mg/ml</b><br/> Indikation / Indication: Stærke smerter / Severe pain;<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>   |
| <p>3.7 Gel / ointment<br/> <b>Diclofenac 11.6 mg/g</b><br/> Indikation / Indication: Smerte / pain , inflammation I huden / inflammation of the skin.<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: &lt; 30 C</p>  |
| <p>3.8 Supp. / Supp.<br/> <b>Diclofenac 50 mg</b><br/> Indikation / Indication: Galdesten, nyresten, ledsmerter / Gall stone, kidney stone, pain in joint<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>   |
| <p>3.9 tablet/tablets<br/> Morphine 10 mg<br/> Indikation / Indication: Stærke smerter / Severe pain;<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>   |
| <p>4.1 Inj.væske / inj.liquid<br/> <b>Adrenalin 1 mg/ml</b><br/> Indikation / Indication: Allergisk Shock / Allergic shock<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring: Læs indlgssedel/ Storage: Read packet insert</p>  |

|   |
|---|
| <p>4.2 Kapsel / capsule<br/> <b>Acrivastin 8 mg</b><br/> Indikation / Indication: Allergi / Allergy<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>  |
| <p>4.3 Inj.væske / inj.liquid<br/> <b>Hydrocortisonsuccinat 100 mg</b><br/> Indikation / Indication: Allergi / Allergy<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>                     |
| <p>4.5 Tablet / tablet <math>\Delta</math><br/> <b>Cinnarizin 25 mg</b><br/> Indikation / Indication: Søsyge / Seasickness<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>   |
| <p>4.6 Tablet / Tablets<br/> Prednisolon 25 mg<br/> Indikation / Indication Allergi / Allergy<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>  |
| <p>5.1 Inj.væske / inj.liquid<br/> <b>Naloxone 0,4 mg/ml</b><br/> Indikation/Indication: Morfin antidot / Morphine antidote<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>                |
| <p>6.2 Tablet / tablet <math>\Delta</math><br/> <b>Diazepam 5 mg</b><br/> Indikation / Indication: Angst / Anxiety<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>                         |
| <p>6.3 Klyisma / enema <math>\Delta</math><br/> <b>Diazepam 4 mg/ml</b><br/> Indikation / Indication: Kræmper / Convulsions;<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>               |
| <p>6.4 Inj.væske / inj liquid <math>\Delta</math><br/> <b>Haloperidol 5 mg/ml</b><br/> Indikation / Indication: Sindssyge / Mental disease<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p> |
| <p>6.5 Tablet / tablet <math>\Delta</math><br/> <b>Zolpidem 10 mg</b><br/> Indikation / Indication: Søvnløshed / insomnia<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>                  |
| <p>7.1 Tablet / tablet<br/> <b>Phenoxymethylpenicillin 660 - 800 mg</b><br/> Indikation / Indication: Infektioner / Infections<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>             |
| <p>7.2 tablet / tablets<br/> <b>Amoxicillin 500 mg</b><br/> Indikation / Indication: Infektioner / Infections / MFAg table 9<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>               |

|   |
|---|
| <p>7.6 Tablet / tablet<br/> <b>Metronidazol 500 mg</b><br/> Indikation / Indication: Infektioner / Infections<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>                              |
| <p>7.7 Suppositorie / suppository<br/> <b>Metronidazol 500 mg</b><br/> Indikation / Indication: Infektioner / Infections / MFAG table 10<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>   |
| <p>7.8 Tablet / tablet<br/> <b>Ciprofloxacin 250 mg</b><br/> Indikation / Indication: Infektioner / Infections<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>                             |
| <p>7.9 Inj.substans. / inj.substance<br/> <b>Ceftriaxon 1 g</b><br/> Indikation / Indication: Infektioner / Infections<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>                     |
| <p>7.10 Vaccine / vaccine<br/> <b>indeholdende / contain Tetanus</b><br/> Indikation / Indication: Forebyggelse mod stivkrampe / Tetanus prevention<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: 2- 8°C</p>                        |
| <p>7.11 Immunglobulin / immunglobuline<br/> <b>Tetanus 250 I.E./ml / 250 I.U/ml</b><br/> Indikation / Indication: Forebyggelse mod stivkrampe / Tetanus prevention<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: 2- 8°C</p>         |
| <p>7.12 Tablet / tablet<br/> <b>Flucloxacillin 500 mg</b><br/> Indikation / Indication: Infektioner / Infections<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>                           |
| <p>7.15 Tablet / Tablets<br/> <b>Azithromycin 500 mg</b><br/> Indikation / Indication: Infektioner / Infections<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>                            |
| <p>7.16 Tablet / Tablets<br/> <b>Pivmecillinam 400 mg</b><br/> Indikation / Indication: Infektioner / Infections<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>                           |
| <p>7.17 Tablet / Tablets<br/> <b>Acyclovir 400 mg</b><br/> Indikation / Indication: virus-Infektioner / virus-Infections<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>                   |
| <p>8.1 Tablet / tablet<br/> <b>Atovaquon/Proguanil 250/100 mg</b><br/> Indikation / Indication: Malaria forebyggelse / Malaria Prevention.<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p> |

|  |
|--|
| <p>8.2 Tablet / tablet<br/> <b>Doxycylin 100 mg</b><br/> Indikation / Indication: Malaria forebyggelse / Malaria prevention<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>                       |
| <p>8.4 tablet / tablet<br/> <b>Artemether and lumefantrine 20 mg / 120 mg</b><br/> Indikation / Indication: Malaria behandling / Malaria treatment<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: ikke over 30° C / Not above 30° C</p>     |
| <p>9.1 Spray / aerosol<br/> <b>Glycerylnitrat / Glyceryl trinitrate 0,4 mg/doses</b><br/> Indikation / Indication: Hjertekrampe / Angina pectoris<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: 2 - 25°C</p>                               |
| <p>9.3 Tablet / tablet<br/> <b>Acetylsalicylsyre / acetylsalicylic acid 150 mg</b><br/> Indikation / Indication: Blodfortyndende / Blood thinning<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p> |
| <p>9.4 Tablet / tablet<br/> <b>Furosemid 40 mg</b><br/> Indikation / Indication: Vanddrivende / Diuretic<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>  |
| <p>9.5 Inj.væske / inj.liquid<br/> <b>Furosemid 10 mg/ ml</b><br/> Indikation / Indication: Vanddrivende / Diuretic<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory.<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>  |
| <p>9.6 Tablet / tablet<br/> <b>Atenolol 50 mg</b><br/> Indikation / Indication: Blodtryksforhøjelse / High blood pressure<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>                         |
| <p>10.2 Creme / lotion<br/> <b>Miconazol 2%</b><br/> Indikation / Indication: Hudsved / Skinfungus<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: &lt; 25°C</p>   |
| <p>10.5 Creme / lotion<br/> <b>Permethrin 5%</b><br/> Indikation / Indication: Fladlus og fnat / Crab lice and scabies<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>  |
| <p>10.6 Shampoo / shampoo<br/> <b>Permethrin 1%</b><br/> Indikation / Indication: Lus/ Lice<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>   |
| <p>10.7 Creme / lotion<br/> <b>Glukokortikoid gruppe II / glucocorticoid group II</b><br/> Indikation / Indication: Eksem / Eczema<br/> Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>                |

|  |
|--|
| <p>10.8 Salve / ointment<br/>Fusidin 2 %<br/>Indikation / Indication: Hud infektion / Skin infection<br/>Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/>Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/>Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>   |
| <p>11.1 Væske / liquid<br/><b>Chlorhexidin / Ethanol 0,5 - 5% / 70 - 85%</b><br/>Indikation / Indication: Desinfektion af instrumenter / Disinfection of instruments<br/>Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/>Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>  |
| <p>11.2 Væske / liquid<br/><b>Chlorhexidin 0,2%</b><br/>Indikation / Indication: Behandling af urene sår, mundskyl / Treatment of dirty wounds, mouth rinse.<br/>Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/>Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/>Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>             |
| <p>12.6 Tablet / tablet<br/><b>Loperamid 2 mg</b><br/>Indikation / Indication: Diaré / Diarrhea<br/>Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/>Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>   |
| <p>12.7 Pulver / powder<br/><b>Glucose / kalium / magnesium / natrium citrat/natrium/ Glucose/potassium/magnesium/sodium citrate/sodium 30/1,1/0,11/2,1 g</b><br/>Indikation / Indication: Væske- og salttab / Rehydration<br/>Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/>Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>        |
| <p>12.8 Kapsler / capsule<br/><b>Omeprazol 20 mg</b><br/>Indikation / Indication: Mavesår / Stomach ulcer<br/>Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/>Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/>Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>  |
| <p>12.9 Tablet eller oral opløsning / tablet or oral solution<br/><b>Antacida</b><br/>Indikation / Indication: Sure opstød og halsbrand / acid indigestion and heartburn<br/>Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/>Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/>Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p> |
| <p>12.10 Rektalsalve / rectal ointment<br/><b>Antihæmorrhoid creme / Anti haemorrhoid ointment</b><br/>Indikation / Indication: Analkløe / Anal pruitis<br/>Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/>Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/>Opbevaring / storage: &lt; 25 C</p>   |
| <p>12.13 Tablet / Tablets<br/><b>Ondasetron 4 mg</b><br/>Indikation / Indication: Kvalme og opkastning / Nausea and vomiting MFAg table 7, 8, 10, 13, 15, 20<br/>Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory.<br/>Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/>Opbevaring / Storage normal temperatur.</p>                                 |
| <p>12.14 Pulver / Power<br/><b>Movicol®</b><br/>Indikation / Indication: Forstoppelse / Constipation<br/>Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory.<br/>Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/>Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>  |
| <p>13.3 Øjendråber / eyedrops<br/><b>Dexamethason 1 mg/ml</b><br/>Indikation / Indication: Allergi / Regnbuehindebetændelse / Allergic / Inflammatory eye diseases<br/>Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/>Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/>Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>       |

|  |
|--|
| <p>13.4 Øjendråber / eyedrops<br/><b>Pilocarpin 20 mg/ml</b><br/>Indikation / Indication: Grøn stær / Glaucoma<br/>Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/>Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/>Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>   |
| <p>13.6 Øjensalve / eyeointment<br/><b>Aciclovir 30 mg/g</b><br/>Indikation / Indication: Virusinfektion / Viral infection<br/>Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/>Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/>Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>   |
| <p>13.9 Væske / liquid<br/><b>Medium til at blødgøre ørevoks/ Medium to soften earwax</b><br/>Indikation / Indication: Blødgøring og løsning af ørevoks / Softening and dissolving of earwax<br/>Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/>Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/>Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p> |
| <p>13.11 Øjendråber / eyedrops<br/><b>Tropicamid 1%</b><br/>Indikation / Indication: Øjeninflammation / Inflammation of eye<br/>Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/>Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/>Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>  |
| <p>13.12 Øredråber / Eardrops<br/><b>Ciprofloxacin / Hydrocortison 10+2 mg</b><br/>Indikation: Øregangs eksem / Ear canal eczema<br/>Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read user instruction in the inventory.<br/>Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical</p>   |
| <p>13.13 Øjensalve / eye ointment<br/><b>Chloramphenicol 1%</b><br/>Indikation: øjen infektion / Eye infection<br/>Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read user instruction in the inventory.<br/>Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/>Opbevaring / storage: Se indlægsseddel / See leaflet</p>  |
| <p>13.14 Øjendråber / Eye drops<br/><b>Diclofenac 1 mg/ml</b><br/>Indikation: Lokalbedøvelse / Local anaesthetic.<br/>Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read user instruction in the inventory.<br/>Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/>Opbevaring / storage: Ikke over 25°C / Not above 25°C</p>  |
| <p>14.1 Kapsel / capsule<br/><b>Fluconazol 150 mg</b><br/>Indikation / Indication: Skedesvamp / Vaginal fungus<br/>Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/>Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/>Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>   |
| <p>14.2 Tablet / tablet<br/><b>Methylergometrin 0,125 mg</b><br/>Indikation / Indication: Blødning efter fødsel / Bleeding after giving birth<br/>Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/>Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/>Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>  |
| <p>15.1 Tablet / Tablet<br/><b>Dextromethorphan 30 mg</b><br/>Indikation / Indication: Høste / Cough<br/>Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/>Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/>Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>   |
| <p>15.5 Næsespray / dråber / nose spray / drops<br/><b>Xylometazolin 1 mg/ml</b><br/>Indikation / Indication: Forkølelse / Common cold<br/>Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/>Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/>Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>   |

|   |
|---|
| <p>15.7 Inhalations Spray / Inhalation Spray<br/> <b>Salbutamol 0,1 mg</b><br/> Indikation / Indication: Astma / Astma<br/> Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>                   |
| <p>15.8 Inhalations spray / Inhalation spray<br/> <b>Glucocorticoid 100-200 µg</b><br/> Indikation / Indication: Astma / Astma<br/> Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>           |
| <p>16.1 Inf.væske / inf.liquid<br/> <b>Natriumklorid / sodium chloride 9 mg/ml</b><br/> Indikation / Indication: Blodtab / Loss of blood<br/> Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p> |

|  |
|--|
| <p>16.2 Inf.væske / inf.liquid<br/> <b>Glucose og natrium / glucose and sodium 25/4,5 mg/ml</b><br/> Indikation / Indication: Væsketab / Rehydration<br/> Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>  |
| <p>16.5 Inj. væske / inj.liquid<br/> <b>Natriumklorid / sodium chloride 9 mg/ml</b><br/> Indikation / Indication: Væske til gennemskylning af intravenøs kanyle, sårbehandling, øjenbehandling / Fluid for flushing intravenous needle, treatment of wound, treatment of eyes<br/> Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p> |
| <p>16.7 Væske / Liquid<br/> <b>Sterilt vand / Sterile water</b><br/> Indikation / Indication:<br/> Væske til blanding af 7.9 / Fluid to mixing 7.9<br/> Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>  |

# INDEX

|   |                     |  |                |
|---|---------------------|--|----------------|
| Abdominal infections  | 27; 28              | Blodprop i hjertet, forebyggelse efter         | 39             |
| Abstinenskrammer  | 23                  | Blodtab  | 59             |
| Acetylsalicylic acid.                                       | 37                  | Blood diluting                                 | 40             |
| Acetylsalicylsyre   | 37                  | Blood poisoning                                | 29             |
| Aciclovir   | 51; 64; 81; 91; 101 | Blood-thinning                                 | 37             |
| Acid indigestion  | 48                  | Blurred vision                                 | 51             |
| Acrivastin  | 17                  | Blødning, abort                                | 55             |
| Acrivastine   | 18                  | Blødning, fødsel                               | 55             |
| Acute diarrhoea   | 28                  | Boil in the throat                             | 27; 28         |
| Acute mental disease  | 23                  | Bone infection                                 | 27             |
| Acute mental illness  | 24                  | Bone-ache                                      | 14             |
| Acyclovir   | 51                  | Bones, infections                              | 31             |
| Adrenalin   | 17                  | Breathing difficulties                         | 11             |
| Akut diarré   | 28                  | Brud   | 23             |
| Akut sindssyge  | 23; 24              | Brugervejledning Lægemiddelstoffer             | 10             |
| Alcoholic withdrawal symptoms                               | 23                  | Burning sensation, skin                        | 43             |
| Alkoholabstinenser  | 23                  | Burns  | 15             |
| Allantoin   | 52                  | Cardiospasm                                    | 37             |
| Allergi   | 17; 18              | Ceftriaxone                                    | 29             |
| Allergic asthma   | 18; 19              | Cerumen  | 52             |
| Allergic face oedema  | 18; 19              | Chloramphenicol                                | 53             |
| Allergic reactions, swellings etc. Oral treatment preferred | 20                  | Chlorhexidin.                                  | 45             |
| Allergic shock  | 17                  | Chlorhexidine/ethanol.                         | 45             |
| Allergisk ansigtsødem                                       | 17; 18              | Cholera  | 28             |
| Allergisk astma   | 17; 18              | Cinnarizin                                     | 19             |
| Allergisk shock   | 17                  | Cinnarizine                                    | 19             |
| Allergiske reaktioner, hævelser osv. Oral behandling        | 20                  | Ciprofloxacien / Hydrocortisone                | 53; 67; 93     |
| Allergy   | 18; 19              | Ciprofloxacine                                 | 28             |
| Amoxicillin.  | 26                  | Ciprofloxacine / Hydrocortison                 | 53; 67; 82; 93 |
| Amoxicilline  | 26                  | Ciprofloxacine                                 | 28             |
| Angina pectoris   | 36; 39              | Cold   | 57             |
| Angst   | 23; 24              | Constipation                                   | 49             |
| Antacid   | 48                  | Convulsions                                    | 23             |
| Antacida  | 48                  | Convulsions , universal                        | 24             |
| Antidote, morphine  | 21                  | Convulsions, poisoning                         | 24             |
| Antihæmoride creme  | 48                  | Convulsions, Withdrawal                        | 24             |
| Anxiety   | 23; 24              | Coronary thrombosis                            | 15; 36; 37     |
| Apixaban  | 40; 101             | Coronary thrombosis, Preventiv treatment after | 39             |
| Appendicitis  | 27; 28; 29          | Cough  | 56             |
| Arthritis   | 15                  | Crab lice                                      | 42; 43         |
| asthma  | 57                  | Delusions                                      | 24             |
| Asthma  | 58                  | Dexamethason.                                  | 50             |
| asthma-like breathing                                       | 58                  | Dexamethasone.                                 | 50             |
| astma   | 57                  | Dextromethorphan.                              | 56             |
| Astma   | 39; 58              | Diarré   | 46             |
| astmalignende vejrtrækning                                  | 58                  | Diarrhoea                                      | 46; 47         |
| Atenolol  | 39                  | Diazepam                                       | 23; 24         |
| Atovaquon/Proguanil   | 34                  | Diclofenac                                     | 15; 16; 54     |
| Atovaquone/Proguanil  | 34                  | Difficulty falling asleep                      | 25             |
| Azithromycin  | 101                 | Dirty wounds, Disinfection                     | 45             |
| Back pains  | 13                  | Dislocations                                   | 23             |
| Bevidstløs med vejrtrækning                                 | 11                  | Doxycyclin.                                    | 34             |
| Bevidstløs uden vejrtrækning                                | 11                  | Doxycycline.                                   | 35             |
| Bihulebetændelse  | 26; 57              | Dysenteri                                      | 28             |
| Bleeding, after birth                                       | 56                  | Dysentery                                      | 28             |
| Bleeding, miscarriage                                       | 56                  | Ear eczema                                     | 50; 53         |
| Blindtarmsbetændelse  | 27; 28; 29          | Eksem  | 43             |
| Blodforgiftning   | 29                  | Epilepsi                                       | 23             |
| Blodfortyndende   | 40                  | Epilepsy                                       | 24             |
| Blodfortynding  | 37                  | Epinephrine                                    | 17             |
| Blodprop i hjertet  | 14; 36; 37          | Ernæringserstatning                            | 59             |

|  |            |  |        |
|--|------------|--|--------|
| Eye diseases, Allergic                                 | 50         | Hjertekrampe   | 36; 37 |
| Eye diseases, Inflammatory                             | 50         | Hostestillende   | 56     |
| Eye infection  | 53         | Hovedpine  | 13     |
| Eyes, Treatment  | 60         | Hudinfektioner   | 44     |
| Feber  | 13         | Hudkløe  | 43     |
| Febertilstande   | 46         | Hudsvamp   | 42; 55 |
| Female reproductions organs, infection                 | 28         | Hudsvie  | 43     |
| Fever  | 13         | Human tetanus immunoglobulin   | 31     |
| Feverish conditions                                    | 47         | Humant tetanus immunoglobulin  | 30     |
| Fladlus  | 42; 43     | Hydrocortison.   | 18     |
| Flucloxacillin   | 31         | Hydrocortisonsuccinate   | 19     |
| Fluconazol   | 55         | Hypoglycaemic coma   | 22     |
| Fluconazole.   | 55         | Hæmorider  | 48     |
| Flushing, intravenous needle                           | 60         | Hænder, desinficering  | 45     |
| Fnat   | 42; 43     | Høfeber  | 17     |
| Food substitute  | 60         | Ibuprofen.   | 13; 14 |
| Forbrændinger  | 14         | Indsovningsbesvær  | 25     |
| Forhøjet blodtryk                                      | 37; 38; 39 | Infection of female reproductions organs                               | 27     |
| Forkølelse   | 57         | Infections, oral cavity  | 26     |
| Forstoppelse   | 49         | Infektioner, stafylokokker   | 31     |
| Fortegnelse og kontrol dokument over lægemiddelstoffer | 62         | Inflammation i huden   | 15     |
| Fortegnelse og Kontrol dokument over medicinsk udstyr  | 70         | Inflammation of the skin   | 15     |
| Fractures  | 14; 15; 23 | Inflammation, middle ear   | 26     |
| Frontal sinusitis                                      | 57         | Inflammation, throat   | 26     |
| Fungus   | 42         | Inflammatoriske øjensygdomme   | 52     |
| Furosemid  | 37; 38     | Inflammatory eye diseases  | 52     |
| Furosemide   | 38         | Injuries   | 15     |
| Fusidin  | 44; 101    | Insect bites   | 43     |
| Galdesten  | 14         | Insektbid  | 43     |
| Gall stone   | 15         | Insomnia   | 25     |
| Gennemskylning, intravenøskanyle                       | 60         | Instrumenter, desinficering  | 45     |
| Gigt   | 15         | Instruments, Disinfection  | 45     |
| Glaucoma   | 51         | Insulin shock  | 22     |
| Glucagon   | 22         | Insulinshock   | 22     |
| Glucocorticoid til inhalation                          | 58         | Insulintilfælde  | 22     |
| Glucocorticoid group II                                | 43         | Intact skin, Disinfection  | 45     |
| Glucose and sodium chloride.                           | 60         | Intakt hud, desinficering  | 45     |
| Glucose og natriumklorid.                              | 59         | Intestinal infections  | 27; 28 |
| Glukokortikoid gruppe II                               | 43         | Inventory and Control Document of Active Pharmaceutical<br>Ingredients | 62     |
| Glyceryl trinitrate                                    | 36         | Inventory and Control Document of Medical Equipment                    | 70     |
| Glycerylnitrat   | 36         | Itching, rectum  | 48     |
| Glycocorticoid for inhalation                          | 58         | Kidney stone   | 15     |
| Gonoré   | 28         | Kloramfenikol  | 53     |
| Gonorrhoea   | 28         | Klorhexidin.   | 45     |
| Grøn stær:   | 50         | Klorhexidin/ethanol.   | 45     |
| Haemorrhoids   | 48         | Kløe, endetarmen   | 48     |
| Hallucinationer.                                       | 24         | Kløestillende  | 12     |
| Hallucinations.  | 24         | Knoglebrud   | 13     |
| Haloperidol  | 24         | Knogleinfektion  | 27; 31 |
| Haloperidole.  | 24         | Knoglesmerter  | 13     |
| Halsbetændelse   | 26         | Kolera   | 28     |
| Halsbrand  | 48         | Kramper  | 23     |
| Halsbyld   | 27; 28     | Kramper, forgiftninger   | 23     |
| Hands, Disinfection                                    | 45         | Kramper, universelle   | 23     |
| Hay fever  | 18         | Kvalme   | 49     |
| Headache   | 13         | Kvalme og opkastninger   | 24     |
| Heart pain   | 36; 37; 39 | Kvæstelser   | 14     |
| Heartburn  | 48         | Kæbehulebetændelse   | 57     |
| Helvedesild  | 51         | Lavt blodsukker  | 22     |
| Herpes   | 51         | Ledskred   | 23     |
| High blood pressure                                    | 38; 39     |  |        |



|   |            |  |        |
|---|------------|--|--------|
| Ledsmerter  | 13         | Nausea                                   | 49     |
| Lice  | 42; 43     | Nausea and vomiting                      | 24     |
| Lidocain  | 11; 12     | Neglesvamp                               | 55     |
| Lidocaine   | 12         | Nyrebækkenbetændelse                     | 28; 29 |
| List when handing over expired medication to a pharmacy | 100        | Nyresten                                 | 14     |
| Liste ved aflevering af udløbet medicin til apotek      | 100        | Nældefeber                               | 17     |
| Local anaesthetics                                      | 12         | Omeprazol                                | 47     |
| Lokalbedøvelse  | 11; 12     | Ondansetron                              | 49; 92 |
| Loperamid   | 46         | Open fractures                           | 29     |
| Loperamide.   | 46         | Opkastninge                              | 49     |
| Loss of blood   | 59         | Opkastninger                             | 46     |
| Loss of fluid   | 47         | Otitis media                             | 57     |
| Loss of liquid  | 59         | Oxygen                                   | 11     |
| Loss of liquids   | 60         | Pain                                     | 15     |
| Low blood sugar   | 22         | Pain during defecation                   | 48     |
| Lung edema  | 38         | Pain in joints                           | 14     |
| Lungebetændelse   | 26; 29     | Pains, eye                               | 51     |
| Lungebetændelse, giftige kemiske stoffer                | 26         | Pandehulebetændelse                      | 57     |
| Lungepest   | 28         | Paracetamol                              | 13     |
| Lus   | 42; 43     | Paracetamol.                             | 13     |
| Major wounds  | 15; 29     | Period pain                              | 14     |
| Malaria, forebyggelse                                   | 34         | Permethrin.                              | 42; 43 |
| Malaria, prevention                                     | 34; 35     | Phenoxymethylpencillin                   | 26     |
| Malarone®   | 34         | Phenoxymethylpenicillin                  | 26     |
| Mani, vildskab  | 24         | Pilocarpin                               | 50     |
| Mania, wildness   | 24         | Pilocarpine                              | 51     |
| Mavesår   | 47         | Pivmecillinam                            | 101    |
| Maxillary sinusitis                                     | 57         | Pneumonia                                | 26; 29 |
| Medical oxygen  | 11         | Pneumonia, poisonous chemical substances | 26     |
| Medicinsk ilt.  | 11         | Pneumonic plague                         | 28     |
| Medtaget almen tilstand                                 | 11         | Prednisolon                              | 20     |
| Mellemørebetændelse                                     | 26         | Prenisolon                               | 20     |
| Meningitis  | 29         | Psoriasis                                | 43     |
| Menstruationssmerter                                    | 13         | Psykisk uro                              | 24     |
| Mental restlessness                                     | 24         | Pyelitis                                 | 28     |
| Methylergometrin.                                       | 55         | Rainbow vision                           | 51     |
| Methylergometrine.                                      | 56         | Regnbuesyn                               | 50     |
| Metronidazol.   | 27; 28     | Relieves itching                         | 12     |
| Metronidazole   | 27         | restlessness                             | 23     |
| Miconazol   | 42         | Rygsmertter                              | 13     |
| Miconazole  | 42         | Salbutamol                               | 57     |
| Moderate pain:  | 14         | Salbutamol.                              | 57     |
| Moderate smerter:                                       | 13         | Salttab                                  | 46     |
| Modgift, morfin   | 21         | Scabies                                  | 42; 43 |
| Morfin  | 14         | Seasickness                              | 19     |
| Morphin $\Delta$  | 16         | Sepsis                                   | 29     |
| Morphine  | 15         | Severe bronchitis                        | 28     |
| Morphine $\Delta$                                       | 16         | Severe injuries                          | 11     |
| Motoric restlessness,                                   | 24         | Severe pain                              | 15; 16 |
| Motorisk uro  | 24         | Shingles                                 | 51     |
| Mouth rinse   | 45         | Shock, forebyggelse                      | 59     |
| Movicol®  | 49; 82; 92 | Shock, prevention                        | 59     |
| Mundhuleinfektioner                                     | 26         | Sinusitis                                | 26; 57 |
| Mundskylning  | 45         | Skin fungus                              | 42; 55 |
| Muscle pain   | 14         | Skininfections                           | 44     |
| Muskelsmerter   | 13         | Smerter                                  | 15     |
| Nail fungus   | 55         | Smerter i hjertet                        | 36; 37 |
| Naloxon   | 21         | Smerter, afføring                        | 48     |
| Naloxone  | 21         | Smerter, øje                             | 50     |
| Natriumklorid   | 60         | Sodium chloride                          | 59; 60 |
| Natriumklorid.  | 59         | Solskoldning                             | 43     |

|                               |        |  |        |
|-------------------------------|--------|--|--------|
| Staphylococci                 | 31     | Underlivsinfektioner                               | 27     |
| Sterile water                 | 61     | Urene sår, desinficering                           | 45     |
| Sterilt vand                  | 61     | Urethritis   | 28     |
| Stivkrampemodgift             | 30     | Urinrørsbetændelse                                 | 28     |
| Stivkrampévaccine             | 30     | urotilstande                                       | 23     |
| Stomach ulcer                 | 47     | Urticaria  | 18     |
| Stopper blødninger            | 41     | User instruction Active Pharmaceutical Ingredients | 10     |
| Stops Bleedings               | 41     | Vaginal fungus                                     | 55     |
| stops breathing               | 21     | Vand i lungerne                                    | 37; 38 |
| Store sårskader               | 14; 29 | Vand til opløsning af 7.9 Ceftriaxon pulver        | 61     |
| Stærke smerter:               | 14; 16 | Vejrtrækningsbesvær                                | 11     |
| Større kvæstelser             | 11     | Vomiting   | 47; 49 |
| Sunburns                      | 43     | Vrangforestillinger                                | 24     |
| Sure opstød                   | 48     | Væsketab   | 46; 59 |
| Suture of wounds              | 12     | Water for dissolution of 7.9 Ceftriaxon powder     | 61     |
| Svage smerter                 | 13     | Weak general condition                             | 11     |
| Svamp                         | 42     | Weak pains:  | 13     |
| Svamp i skeden                | 55     | Wounds, Treatment                                  | 60     |
| Svær bronkitis                | 28     | Xylometazolin.                                     | 57     |
| Syning af sår                 | 11     | Xylometazoline.                                    | 57     |
| Søsyge                        | 19     | Zolpidem   | 25     |
| Søvnløshed                    | 25     | <b>Ændringer/ Changes</b>                          | 102    |
| Sårbehandling.                | 60     | Øjenbehandling                                     | 60     |
| Tandbyld                      | 27; 28 | Øjenbetændelse                                     | 53     |
| Tarminfektioner               | 27     | Øjensygdom, Allergiske                             | 50     |
| Tetanus antidote              | 31     | Øjensygdom, Inflammatoriske                        | 50     |
| Tetanus holdig vaccine        | 30     | Øregangs eksem                                     | 53     |
| Tetanus vaccine               | 30     | Øregangseksem                                      | 50     |
| tetanustoxid                  | 30     | Ørevoks.   | 52     |
| Tooth abscess                 | 27; 28 | Åbne knoglebrud                                    | 29     |
| Tranexamacid                  | 41     |  |        |
| Tranexamsyre                  | 41     |  |        |
| Tropicamid                    | 52     |  |        |
| Tågesyn                       | 50     |  |        |
| Udsættende vejrtrækning       | 21     |  |        |
| Unconscious with breathing    | 11     |  |        |
| Unconscious without breathing | 11     |  |        |

**Rekvisition lægemiddelstoffer og medicinsk  
udstyr**

**Requisition Active Pharmaceutical Ingredient  
and Medical Equipment**

| Grp. No. | ATC-code | Lægemiddelstof/<br>Active Pharmaceutical Ingredient | Adm. Form/<br>Form      | Mængde /<br>Amount |
|----------|----------|---|-------------------------|--------------------|
| 1.1      | V03AN01  | Medicinsk ilt                                       | Gas                     |                    |
| 1.1      | V03AN01  | Oxygen, Medical                                     | Gas                     |                    |
| 1.3      | V03AN01  | Medicinsk ilt passende til A.1                      | Gas                     |                    |
| 1.3      | V03AN01  | Oxygen, Medical suiteable to A.1                    | Gas                     |                    |
| 2.1      | N01BB02  | Lidocain  | Inj. Væske              |                    |
| 2.1      | N01BB02  | Lidocaine   | Inj. Liquid             |                    |
| 2.2      | D04AB01  | Lidocain  | Gel                     |                    |
| 2.2      | D04AB01  | Lidocaine   | Gel                     |                    |
| 3.1      | N02BE01  | Paracetamol   | Tablet                  |                    |
| 3.1      | N02BE01  | Paracetamol   | Tablets                 |                    |
| 3.2      | M01AE01  | Ibuprofen   | Tablet                  |                    |
| 3.2      | M01AE01  | Ibuprofen   | Tablets                 |                    |
| 3.4      | N02AA01  | Morfin $\Delta$                                     | Inj. Væske              |                    |
| 3.4      | N02AA01  | Morphine $\Delta$                                   | Inj. Liquid             |                    |
| 3.7      | M02AA15  | Diclofenac  | Gel                     |                    |
| 3.7      | M02AA15  | Diclofenac  | Gel                     |                    |
| 3.8      | M01AB05  | Diclofenac  | Supp.                   |                    |
| 3.8      | M01AB05  | Diclofenac  | Supp                    |                    |
| 3.9      | N02AA01  | Morfin $\Delta$                                     | Tablet                  |                    |
| 3.9      | N02AA01  | Morphine $\Delta$                                   | Tablets                 |                    |
| 4.1      | C01CA24  | Adrenalin   | inj. Væske              |                    |
| 4.1      | C01CA24  | Epinephrine   | inj. Liquid             |                    |
| 4.2      | R06AX18  | Acrivastin  | Kapsel                  |                    |
| 4.2      | R06AX18  | Acrivastine   | Capsula                 |                    |
| 4.3      | H02AB09  | Hydrocortison                                       | inj. Tørstof+<br>Væske  |                    |
| 4.3      | H02AB09  | Hydrocortisonsuccinate                              | inj. Subst +<br>solvens |                    |
| 4.5      | N07CA02  | Cinnarizin $\Delta$                                 | Tablet                  |                    |
| 4.5      | N07CA02  | Cinnarizine $\Delta$                                | Tablets                 |                    |
| 4.6      | H02AB06  | Prednisolon   | Tablet                  |                    |
| 4.6      | H02AB06  | Prednisolon   | Tablets                 |                    |
| 5.1      | V03AB15  | Naloxon   | Inj. Væske              |                    |
| 5.1      | V03AB15  | Naloxon   | Inj. Liquid             |                    |
| 5.2      | H04AA01  | Glucagon "K"  | inj. Tørstof+<br>Væske  |                    |
| 5.2      | H04AA01  | Glucagon "R"  | inj. Subst +<br>solvens |                    |
| 6.2      | N05BA01  | Diazepam $\Delta$                                   | Tablet                  |                    |
| 6.2      | N05BA01  | Diazepam $\Delta$                                   | Tablets                 |                    |
| 6.3      | N05BA01  | Diazepam $\Delta$                                   | Klysma                  |                    |
| 6.3      | N05BA01  | Diazepam $\Delta$                                   | Enema                   |                    |
| 6.4      | N05AD01  | Haloperidol $\Delta$                                | Inj. Væske              |                    |
| 6.4      | N05AD01  | Haloperidol $\Delta$                                | Inj. Liquid             |                    |
| 6.5      | N05CF02  | Zolpidem $\Delta$                                   | Tablet                  |                    |
| 6.5      | N05CF02  | Zolpidem $\Delta$                                   | Tablets                 |                    |

| Grp. No. | ATC-code | Lægemiddelstof/<br>Active Pharmaceutical Ingredient | Adm. Form/<br>Form | Mængde /<br>Amount |
|----------|----------|---|--------------------|--------------------|
| 7.1      | J01CE02  | Phenoxymethylpenicillin                             | Tablet             |                    |
| 7.1      | J01CE02  | Phenoxymethylpenicillin                             | Tablets            |                    |
| 7.2(π)   | J01CA04  | Amoxicillin   | Tablet             |                    |
| 7.2(π)   | J01CA04  | Amoxicillin   | Tablets            |                    |
| 7.6      | P01AB01  | Metronidazol  | Tablet             |                    |
| 7.6      | P01AB01  | Metronidazol  | Tablets            |                    |
| 7.7      | P01AB01  | Metronidazol  | Supp.              |                    |
| 7.7      | P01AB01  | Metronidazol  | Supp.              |                    |
| 7.8      | J01MA02  | Ciprofloxacin                                       | Tablet             |                    |
| 7.8      | J01MA02  | Ciprofloxacin                                       | Tablets            |                    |
| 7.9      | J01DD04  | Ceftriaxon  | inj. Tørstof       |                    |
| 7.9      | J01DD04  | Ceftriaxon  | inj. Subst         |                    |
| 7.10     | -        | Tetanus holdig vaccine "K"                          | Inj. Væske         |                    |
| 7.10     | -        | Vaccine containing Tetanus "R"                      | Inj. Liquid        |                    |
| 7.11     | J06BB02  | Tetanus immunglobulin "K"                           | Inj. Væske         |                    |
| 7.11     | J06BB02  | Tetanus immunglobulin "R"                           | Inj. Liquid        |                    |
| 7.12     | J01CF05  | Flucloxacillin                                      | Tablet             |                    |
| 7.12     | J01CF05  | Flucloxacillin                                      | Tablets            |                    |
| 7.15     | J01FA10  | Azithromycin  | Tablet             |                    |
| 7.15     | J01FA10  | Azithromycin  | Tablets            |                    |
| 7.16     | J01CA08  | Pivmecillinam                                       | Tablet             |                    |
| 7.16     | J01CA08  | Pivmecillinam                                       | Tablets            |                    |
| 7.17     | J05AB01  | Aciclovir   | Tablet             |                    |
| 7.17     | J05AB01  | Aciclovir   | Tablets            |                    |
| 8.1      | P01BB51  | Atovaquon/Proguanil                                 | Tablet             |                    |
| 8.1      | P01BB51  | Atovaquon/Proguanil                                 | Tablets            |                    |
| 8.2      | J01AA02  | Doxycycline   | Tablet             |                    |
| 8.2      | J01AA02  | Doxycycline   | Tablets            |                    |
| 8.4      | P01BF01  | Artemether and lumefantrine                         | Tablet             |                    |
| 8.4      | P01BF01  | Artemether and lumefantrine                         | Tablets            |                    |
| 9.1      | C01DA02  | Glyceryl nitrat                                     | Mund pray          |                    |
| 9.1      | C01DA02  | Glyceryl trinitrate                                 | Oral spray         |                    |
| 9.3      | B01AC06  | Acetylsalisylsyre                                   | Tablet             |                    |
| 9.3      | B01AC06  | Acetylsalicylic Acid                                | Tablets            |                    |
| 9.4      | C03CA01  | Furosemid   | Tablet             |                    |
| 9.4      | C03CA01  | Furosemide  | Tablets            |                    |
| 9.5      | C03CA01  | Furosemid   | Inj. væske         |                    |
| 9.5      | C03CA01  | Furosemide  | Inj. Liquid        |                    |
| 9.6      | C07AB03  | Atenolol  | Tablet             |                    |
| 9.6      | C07AB03  | Atenolol  | Tablets            |                    |
| 9.8      | B01AF02  | Apixaban  | Tablet             |                    |
| 9.8      | B01AF02  | Apixaban  | Tablets            |                    |
| 9.9      | B02AA02  | Tranexamsyre  | Inj. væske         |                    |
| 9.9      | B02AA02  | Tranexamsyre  | Inj. liquid        |                    |

| Grp. No. | ATC-code | Lægemiddelstof/<br>Active Pharmaceutical Ingredient                      | Adm. Form/<br>Form          | Mængde /<br>Amount |
|----------|----------|--|-----------------------------|--------------------|
| 10.2     | D01AC02  | Miconazol  | Creme                       |                    |
| 10.2     | D01AC02  | Miconazol  | Lotion / Cream              |                    |
| 10.5     | P03AC04  | Permethrin   | Creme                       |                    |
| 10.5     | P03AC04  | Permethrin   | Lotion / Cream              |                    |
| 10.6     | P03AC04  | Permethrin   | Shampoo                     |                    |
| 10.6     | P03AC04  | Permethrin   | Shampoo                     |                    |
| 10.7     | D07AB02  | Glukocorticoid group II  | Creme                       |                    |
| 10.7     | D07AB02  | Glukocorticoid group II  | Lotion / Cream              |                    |
| 10.8     | D06AX01  | Fusidin  | Cream / Salve               |                    |
| 10.8     | D06AX01  | Fusidine   | Cream / Lotion              |                    |
| 11.1     | -        | Klorhexidin/ethanol  | Væske                       |                    |
| 11.1     | -        | Chlorhexidine/ethanol  | Liquid                      |                    |
| 11.2     | -        | Klorhexidin  | Væske                       |                    |
| 11.2     | -        | Chlorhexidine  | Liquid                      |                    |
| 12.6     | A07DA03  | Loperamid  | Tablet                      |                    |
| 12.6     | A07DA03  | Loperamide   | Tablets                     |                    |
| 12.7     | -        | Glucose/potassium/magnesium/sodium                                       | Powder                      |                    |
| 12.7     | -        | Glucose/potassium/magnesium/sodium                                       | Powder                      |                    |
| 12.8     | A02BC01  | Omeprazol  | Tablet / Kapsel             |                    |
| 12.8     | A02BC01  | Omeprazole   | Tablets / Capsula           |                    |
| 12.9     | A02A     | Antacida   | Tablet eller oral opløsning |                    |
| 12.9     | A02A     | Antacid  | Tablets or oral solution    |                    |
| 12.10    | C05A     | Hæmoride creme( skal indeholde glukokortikoid and smertestillende)       | Creme/Salve                 |                    |
| 12.10    | C05A     | <i>Anti haemorrhoid agent (Must contain glucocorticoid and analgesi)</i> | Lotion/ointment             |                    |
| 12.13    | A04AA01  | Ondansetron  | Tablet                      |                    |
| 12.13    | A04AA01  | Ondansetron  | Tablets                     |                    |
| 12.14    | A06AD65  | Movicol®   | Pulver                      |                    |
| 12.14    | A06AD65  | Movicol®   | Powder                      |                    |

| Grp. No. | ATC-code | Lægemiddelstof/<br>Active Pharmaceutical Ingredient | Adm. Form/<br>Form | Mængde /<br>Amount |
|----------|----------|---|--------------------|--------------------|
| 13.3     | S01BA01  | Dexamethason  | Dråber             |                    |
| 13.3     | S01BA01  | Dexamethasone                                       | Drops              |                    |
| 13.4     | S01EB51  | Pilocarpin  | Dråber             |                    |
| 13.4     | S01EB51  | Pilocarpine   | Drops              |                    |
| 13.6     | S01AD03  | Aciclovir   | Salve              |                    |
| 13.6     | S01AD03  | Aciclovir   | Oinment            |                    |
| 13.9     | -        | Medium til at blødgøre ørevoks,<br>inkl. øresprøjte | -                  |                    |
| 13.9     | -        | Medium to soften earwax,<br>incl. earsyringe        | -                  |                    |
| 13.11    | S01FA06  | Tropicamid  | Dråber             |                    |
| 13.11    | S01FA06  | Tropicamide   | Drops              |                    |
| 13.12    | S02CA03  | Ciprofloxacin / Hydrocortison                       | Øredråber          |                    |
| 13.12    | S02CA03  | Ciprofloxacin / Hydrocortisone                      | Eardrops           |                    |
| 13.13    | S01AA01  | Kloramfenikol                                       | øjensalve          |                    |
| 13.13    | S01AA01  | Chloramphenicol                                     | eye ointment       |                    |
| 13.14    | S01BC03  | Diclofenac  | Øjendråber         |                    |
| 13.14    | S01BC03  | Diclofenac  | Eye drops          |                    |
| 14..1    | J02AC01  | Fluconazol  | Kapsel             |                    |
| 14.1     | J02AC01  | Fluconazole   | Capsula            |                    |
| 14.2     | G02AB01  | Methylergometrin                                    | Tablet             |                    |
| 14.2     | G02AB01  | Methylergometrine                                   | Tablets            |                    |
| 15.1     | R05DA09  | Dextromethorphan                                    | Tablet             |                    |
| 15.1     | R05DA09  | Dextromethorphan                                    | Tablets            |                    |
| 15.5     | R01AA07  | Xylometazolin                                       | Dråber / spray     |                    |
| 15.5     | R01AA07  | Xylometazoline                                      | Drops / spray      |                    |
| 15.7     | R03AC03  | Salbutamol  | Spray              |                    |
| 15.7     | R03AC03  | Salbutamol  | Spray              |                    |
| 15.8     | R03BA01  | Glucocorticoid (inhalation)                         | Spray              |                    |
| 15.8     | R03BA01  | Glucocorticoid (inhalation)                         | Spray              |                    |
| 16.1     | B05BB01  | Natriumklorid                                       | Inf. Væske         |                    |
| 16.1     | B05BB01  | Sodium chloride                                     | Inf. Liquid        |                    |
| 16.2     | B05BB02  | Glucose + Natriumklorid                             | Inf. Væske         |                    |
| 16.2     | B05BB02  | Glucose + sodiumchlorid                             | Inf. Liquid        |                    |
| 16.5     | V07AB    | Natriumklorid (20 ml)                               | Væske              |                    |
| 16.5     | V07AB    | Sodium chloride (20 ml)                             | Liquid             |                    |
| 16.7     | V07AB    | Sterilt vand til blanding af 7.9                    | Væske              |                    |
| 16.7     | V07AB    | Sterile water to mix 7.9                            | Kiquid             |                    |

| Grp. No | Medicinsk udstyr / Medical equipment  | Mængde/ Quantity |
|---------|---|------------------|
| A.1     | Mobilt genoplivningsudstyr, klargjort   |                  |
| A.1     | Mobile resuscitation equipment, ready for use   |                  |
| A.5     | Tungeholdere, størrelse 3   |                  |
| A.5     | Guidel airway, size 3   |                  |
| A.8     | Kraftig klædesaks   |                  |
| A.8     | Strong scissors for clothes   |                  |
| A.9     | Sugekatetre, lige, CH 12  |                  |
| A.9     | Suction catheters, straight, CH 12  |                  |
| A.10    | Tæppe til behandling af hypotermi   |                  |
| A.10    | Blanket for treatment of hypothermia  |                  |
| A.11    | Almindelige tæpper  |                  |
| A.11    | Ordinary blankets   |                  |
| A.12    | Saturationsmåler (fingermodel)  |                  |
| A.12    | Puls oximeter (finger)  |                  |
| A.13    | Hudson maske med reservoirpose med ca. 1,8 m slange                                     |                  |
| A.13    | Hudson mask with reservoir bag with approx. 1.8 m tube                                  |                  |
| A.18    | Hjertestarter (AED)   |                  |
| A.18    | Automatic extern difibrillator (AED)  |                  |
| A.19    | Illbrille   |                  |
| A.19    | Nasal Cannula   |                  |
| B.1     | Sterile gazeekompresser, ca.5 x 5 cm, ca.8 lag  |                  |
| B.1     | Sterile gauze compress, approx.5 x 5 cm, approx. 8 layers                               |                  |
| B.2     | Sterile gazeekompresser, ca. 10 x 10 cm, ca. 8 lag                                      |                  |
| B.2     | Sterile gauze compress, approx.10 x 10 cm, approx. 8 layers                             |                  |
| B.3     | Steril absorberende ikke-klæbende forbinding, ca. 20 x 30 cm                            |                  |
| B.3     | Sterile absorbent non-adhesive surgical dressing bandage, approx. 20 x 30 cm            |                  |
| B.4     | Sterile kompresforbindinger, ca. 8 cm   |                  |
| B.4     | Sterile compress bandages, approx. 8 cm   |                  |
| B.5     | Imprægnerede net, ca. 10 x 10 cm, "Jelonet"   |                  |
| B.5     | Impregnated nets, approx. 10 x 10 cm, "Jelonet"   |                  |
| B.6     | Sterile absorberende forbindinger, ikke klæbende, ca. 10 x 10 cm                        |                  |
| B.6     | Sterile absorbent bandages, non-adhesive surgical dressing bandages, approx. 10 x 10 cm |                  |
| B.7     | Gazeviskers, usterile   |                  |
| B.7     | Gauze swaps, non-sterile  |                  |
| B.8     | Tube gaze til fingerforbindinger  |                  |
| B.8     | Tube shaped gauze for finger bandaging  |                  |
| B.9     | Elastisk gazebind, ca. 4 cm x 4m  |                  |
| B.9     | Elastic gauze bandage, approx. 4 cm x 4m  |                  |
| B.10    | Hæfteplaster med sårpude, forskellige størrelser, lommepakning                          |                  |
| B.10    | Adhesive tape with compress, various sizes, pocket pack                                 |                  |
| B.11    | Hæfteplaster med sårpude, ca. 6 cm x 1m   |                  |
| B.11    | Adhesive tape with compress, approx. 6 cm x 1m  |                  |
| B.12    | Fikseringsplaster Fixomull, ca. 10 cm x 10 m  |                  |
| B.12    | Adhesive tape Fixomull, approx. 10 cm x 10 m  |                  |
| B.13    | Fikseringsplaster, "Englehud", ca. 2 cm   |                  |
| B.13    | Adhesive tape, "peau d'ange", approx. 2 cm  |                  |
| B.18    | Årepresse til massiv blødning   |                  |
| B.18    | Tourniquet for massive bleeding   |                  |



| Grp. No | Medicinsk udstyr / Medical equipment                                   | Mængde/ Quantity |
|---------|--|------------------|
| C.1     | Engangshandsker af latex, usterile, X-large                            |                  |
| C.1     | Disposable gloves, latex, non-sterile, X-large                         |                  |
| C.2     | Engangshandsker af latex, usterile, large                              |                  |
| C.2     | Disposable gloves, latex, non-sterile, large                           |                  |
| C.5     | Vaskesvampe, éngangs   |                  |
| C.5     | Bath sponge, disposable  |                  |
| C.6     | Beskyttelsesbriller  |                  |
| C.6     | Protective goggles   |                  |
| C.7     | Steril afdækning, ca. 50 x 50 cm                                       |                  |
| C.7     | Sterile drape, approx. 50 x 50 cm                                      |                  |
| C.8     | Flydende medicinsk sæbe pH 4,5   |                  |
| C.8     | Liquid medical soap pH 4,5   |                  |
| C.9     | Mundbind 3 lags, bredde 18 cm  |                  |
| C.9     | Mask, 3 layer, width 18 cm   |                  |
| C.10    | Ligpose voksen   |                  |
| C.10    | Body bag adult   |                  |
| C.11    | Engangshandsker af latex, usterile, medium                             |                  |
| C.11    | Disposable gloves, latex, non-sterile, medium                          |                  |
| C.12    | Engangshandsker af latex, usterile, small                              |                  |
| C.12    | Disposable gloves, latex, non-sterile, medium                          |                  |
| C.13    | Engangsforklæde  |                  |
| C.13    | Disposable apron   |                  |
| C.14    | Lagen, sterilt   |                  |
| C.14    | Bed sheet, sterile   |                  |
| C.15    | Absorberende underlag, ca.6 lag, 60x40 cm, usteril, engangs            |                  |
| C.15    | Absorbent underlay, approx.6 layers, 60x40 cm, non-sterile, disposable |                  |
| C.16    | Opkastpose   |                  |
| C.16    | Vomit bag  |                  |
| D.1     | Suturtape, "Steri-Strip™"  |                  |
| D.1     | Suturetape, "Steri-Strip™"   |                  |
| D.2     | Klæbesutur, Dermabond  |                  |
| D.2     | Adhesive suture, Dermabond   |                  |
| D.4     | Ikke-absorberbar sutur, 3.0; 45 cm. FS eller DS 25                     |                  |
| D.4     | Non-absorbable suture, 3.0; 45 cm. FS or DS 25                         |                  |
| D.5     | Rustfri stålæske med låg, ca. 18 x 9 x 3 cm                            |                  |
| D.5     | Instrument box, stainless steel with lid, approx. 18 x 9 x 3 cm        |                  |
| D.6     | Engangsskalpel, steril, nr. 23   |                  |
| D.6     | Disposable scalpel, sterile, no. 23                                    |                  |
| D.7     | Kirurgisk saks med lige spids  |                  |
| D.7     | Surgical scissors w/straight points                                    |                  |
| D.8     | Kirurgisk saks med krum spids  |                  |
| D.8     | Surgical scissors w/curved points                                      |                  |
| D.9     | Kirurgisk pincet, ca. 14 - 16 cm                                       |                  |
| D.9     | Surgical forceps (tweezers), approx. 14 -16 cm                         |                  |
| D.10    | Anatomisk pincet   |                  |
| D.10    | Anatomical forceps (tweezers)  |                  |
| D.11    | Splintpincet   |                  |
| D.11    | Forceps, splinter (tweezers)   |                  |

| Grp. No | Medicinsk udstyr / Medical equipment                                | Mængde/ Quantity |
|---------|---|------------------|
| D.12    | Pean, krum  |                  |
| D.12    | Pean, curved  |                  |
| D.13    | Nåleholder  |                  |
| D.13    | Suture - holder   |                  |
| D.14    | Barbermaskine (skraber), engangs                                    |                  |
| D.14    | Safety razor, disposable single use                                 |                  |
| D.15    | Absorberbar hæmostatisk gelatinesvamp, ca. 1x1x1 cm                 |                  |
| D.15    | Haemostatic absorbable gelatine sponge, approx. 1x1x1 cm            |                  |
| D.17    | ikke-absorberbar sutur, 5.0; 45 cm. FS eller DS25                   |                  |
| D.17    | Non-absorbable suture, 5.0; 45 cm. FS eller DS25                    |                  |
| E.1     | Kanylebøtte   |                  |
| E.1     | Box for contaminated needles  |                  |
| E.2     | Afsprøjtningssvaps m. isopropylalkohol 70 %                         |                  |
| E.2     | Alcohol swabs, isopropyl alcohol 70 %                               |                  |
| E.3     | Staserem  |                  |
| E.3     | Tourniquet for iv   |                  |
| E.4     | Intravenøs kanyle, 1,1 x 32, 20 g                                   |                  |
| E.4     | Intravenous needle, 1.1 x 32, 20 g                                  |                  |
| E.5     | Fikseringsplaster til intravenøs kanyle                             |                  |
| E.5     | Fixing plaster for intravenous needle                               |                  |
| E.6     | Kanyle, steril til engangsbrug, 0,6 x 30 (~ 23G x 1 1/4)            |                  |
| E.6     | Needle, sterile, disposable single use, 0.6 x 30 (~ 23G x 1 1/4)    |                  |
| E.7     | Sprøjter, steril til engangsbrug, Luer, 2 ml                        |                  |
| E.7     | Syringes, sterile, single use, Luer, 2 ml                           |                  |
| E.8     | Sprøjter, steril til engangsbrug, Luer, 5 ml                        |                  |
| E.8     | Syringes, sterile, single use, Luer, 5 ml                           |                  |
| E.9     | Sprøjter, steril til engangsbrug, Luer, 10 ml                       |                  |
| E.9     | Syringes, sterile, single use, Luer, 10 ml                          |                  |
| E.10    | Infusionssæt med gevindtilslutning til E.4, sterile til engangsbrug |                  |
| E.10    | Infusion set with threaded connection for E.4, sterile, single use  |                  |
| F.1     | Blodtryksmåler  |                  |
| F.1     | Instrument for measuring blood pressure                             |                  |
| F.2     | Stetoskop   |                  |
| F.2     | Stethoscope   |                  |
| F.3     | Digitalt lægetermometer   |                  |
| F.3     | Digital clinical thermometer  |                  |
| F.4     | Pencillygte m. batterier  |                  |
| F.4     | Pencil lamp w/batteries   |                  |
| F.5     | Tungespatel, usteril, engangs                                       |                  |
| F.5     | Tongue depressor, non-sterile, single use disposable                |                  |
| F.7     | Hypotermi termometer  |                  |
| F.7     | Hypothermia thermometer   |                  |

| Grp. No | Medicinsk udstyr / Medical equipment  | Mængde/ Quantity |
|---------|---|------------------|
| G.1     | "Multistix®" 5, urintest for blod/glukose/protein/nitrit/leukocytter                |                  |
| G.1     | "Multistix®" 5, Urinetest for blood/glucose/protein/nitrite/leukocytes              |                  |
| G.2     | Graviditetstest   |                  |
| G.2     | Pregnancy test kit  |                  |
| G.5     | Malariatest, minimum for Plasmodium Falciparum, inkl. reagens og brugervejledning.  |                  |
| G.5     | Malaria test, minimum for Plasmodium Falciparum, incl. reagens and userinstruction. |                  |
| G.6     | Lancetter (fingerprikker)   |                  |
| G.6     | Lancets (finger pricker)  |                  |
| G.8     | Hurtig test C-reaktiv protein (CRP)   |                  |
| G.8     | Rapid test for C- reaktive proteine (CRP)   |                  |
| H.1     | Pencillygte med UV lys, inkl. batterier   |                  |
| H.1     | Lamp with UV light w/batteries  |                  |
| H.2     | Fluoretsstrips til farvning af øjet   |                  |
| H.2     | Fluorescent colour for the eye  |                  |
| H.3     | Vatpinde, sterile   |                  |
| H.3     | Cotton sticks, sterile  |                  |
| H.4     | Horners hulmejsel   |                  |
| H.4     | Horners spud  |                  |
| H.5     | Øjenklap  |                  |
| H.5     | Eye patch   |                  |
| H.6     | Øjenskylllevæske, Natriumchlorid 0,9%, 250 ml                                       |                  |
| H.6     | Eye wash, Sodium chlorid 0.9%, 250 ml   |                  |
| I.1     | Engangskatetre m. krum spids, CH 14, til mænd                                       |                  |
| I.1     | Catheters for single use w/ curved tip, CH 14 for men                               |                  |
| I.2     | Urinkelbe, plastic  |                  |
| I.2     | Bed bottle, plastic   |                  |
| I.3     | Engangskatetre CH 14 til kvinder  |                  |
| I.3     | Catheters for single use, CH 14 for women   |                  |

| Grp. No | Medicinsk udstyr / Medical equipment                             | Mængde/ Quantity |
|---------|--|------------------|
| J.1     | "ColdHot™" kulde/varme omslag, ca.11 x 27 cm                     |                  |
| J.1     | "ColdHot™" pack approx. 11 x 27 cm                               |                  |
| J.2     | Elastikbind, ca. 10 cm x 5m                                      |                  |
| J.2     | Elastic bandage, approx. 10 cm x 5m                              |                  |
| J.3     | Elastikbind, ca. 6 cm x 5m                                       |                  |
| J.3     | Elastic bandage, approx. 6 cm x 5m                               |                  |
| J.4     | Trekantet tørklæde (Mitella)                                     |                  |
| J.4     | Triangular scarf (Mitella)                                       |                  |
| J.5     | Sikkerhedsnåle   |                  |
| J.5     | Safety pins  |                  |
| J.6     | Fingerskinne til immobilisering af ét led                        |                  |
| J.6     | Finger splint for immobilisation of one joint                    |                  |
| J.7     | Fingerskinne til immobilisering af to led                        |                  |
| J.7     | Finger splint for immobilisation of two joints                   |                  |
| J.8     | Polsterbind, ca. 10 cm x 2,7 m                                   |                  |
| J.8     | Padded bandages, approx. 10 cm x 2.7 m                           |                  |
| J.9     | Gipsbind, ca. 12 cm x 2m   |                  |
| J.9     | Plaster of paris bandage, approx. 12 cm x 2m                     |                  |
| J.10    | Fikseringsplaster, Tensoplast, ca. 2 cm x 2m                     |                  |
| J.10    | Adhesive tape, Tensoplast, approx. 2 cm x 2m                     |                  |
| K.1     | Båre, egnet til K.5  |                  |
| K.1     | Stretcher, suitable for K.5                                      |                  |
| K.2     | Oppustelig frakturskinne, senior, hel arm                        |                  |
| K.2     | Inflatable fracture splint, senior, full arm                     |                  |
| K.3     | Oppustelig frakturskinne, senior, hel ben                        |                  |
| K.3     | Inflatable fracture splint, senior, full leg                     |                  |
| K.4     | Stiv halskrave, indstillelig til forskellige positioner          |                  |
| K.4     | Stiff neck collar, adjustable                                    |                  |
| K.5     | Langt rygbræt, inkl. seler                                       |                  |
| K.5     | Spineboard, incl straps  |                  |
| L.1     | "Coltosol®", færdigblandet tandcement i tuber à 8 g              |                  |
| L.1     | "Coltosol®", dental filling material ready for use, tubes of 8 g |                  |
| L.2     | Skyllekanyle   |                  |
| L.2     | Dental rinse needle  |                  |
| L.3     | Specialinstrument til tandcement                                 |                  |
| L.3     | Special instrument for dental filling material                   |                  |
| L.4     | Mundspejl  |                  |
| L.4     | Mouth mirror   |                  |
| L.5     | Ekskavator   |                  |
| L.5     | Excavator  |                  |
| L.6     | Fyldningsfjerner   |                  |
| L.6     | Filling remover  |                  |
| L.7     | Rustfri stålæske med låg til tandudlægeudstyr                    |                  |
| L.7     | Instrument box, stainless steel with lid for dental equipment    |                  |

| Grp. No | Medicinsk udstyr / Medical equipment   | Mængde/ Quantity |
|---------|--|------------------|
| M.1     | Medicinmålebægre, ca. 25 ml, éngangs   |                  |
| M.1     | Graduated measuring cup, approx. 25 ml, disposable   |                  |
| M.2     | Varmedunk  |                  |
| M.2     | Hot-water bottle   |                  |
| M.3     | Bækken   |                  |
| M.3     | Bedpan   |                  |
| N.1     | Insektbekæmpelsesmiddel - pulver form  |                  |
| N.1     | Insecticide, not specified - powder form   |                  |
| N.2     | Kloreringsmiddel til drikkevand, 100 g   |                  |
| N.2     | Chlorinating agent for drinking water, 100 g   |                  |
| N.3     | Insektbekæmpelsesmiddel- væskeform   |                  |
| N.3     | Insecticide - liquid form  |                  |
| O.2     | Lægebog for Søfarende, udgivet af Seahealth (se note)  |                  |
| O.2     | Medical guide for Seafarers issued by Seahealth (see note)   |                  |
| O.3     | Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning kat. A<br>(Download, <a href="http://www.soefartsstyrelsen">www.soefartsstyrelsen</a> ) |                  |
| O.3     | Inventory, Control Document and User Instruction Cat. A<br>(Download, <a href="http://www.dma.dk">www.dma.dk</a> )                       |                  |
| O.5     | Radio Medical Optegnelser  |                  |
| O.5     | Radio Medical Records  |                  |

O.2 Skal også forefindes på engelsk, såfremt der om bord er påmønstret ikke dansktalende besætningsmedlemmer.  
O.2 Must also be available in English, if crewmembers who don't speak Danish have signed on.  
O.3 skal være tilgængelig i digital eller printet udgave. [www.soefartsstyrelsen.dk](http://www.soefartsstyrelsen.dk)  
O.3 must be available in digital or printed version. [www.dma.dk](http://www.dma.dk)

**Liste ved aflevering af udløbet medicin til apotek  
List when handing over expired medication to a pharmacy**

| Lægemiddelstof/<br>Active Pharmaceutical<br>Ingredient | Adm. Form/<br>Form  | Mængde /<br>Amount |
|--|---|--------------------|
| Morfin $\Delta$  | Inj. Væske  |                    |
| Morphine $\Delta$                                      | Inj. Liquid   |                    |
| Morfin $\Delta$  | Tablet  |                    |
| Morphine $\Delta$                                      | Tablets   |                    |
| Cinnarizin $\Delta$                                    | Tablet  |                    |
| Cinnarizine $\Delta$                                   | Tablets   |                    |
| Diazepam $\Delta$                                      | Tablet  |                    |
| Diazepam $\Delta$                                      | Tablets   |                    |
| Diazepam $\Delta$                                      | Klysma  |                    |
| Diazepam $\Delta$                                      | Enema   |                    |
| Haloperidol $\Delta$                                   | Inj. Væske  |                    |
| Haloperidole $\Delta$                                  | Inj. Liquid   |                    |
| Zolpidem $\Delta$                                      | Tablet  |                    |
| Zolpidem $\Delta$                                      | Tablets   |                    |
|  |   |                    |
|  |   |                    |
|  |   |                    |
|  |   |                    |
|  |   |                    |
|  |   |                    |
|  |   |                    |
|  |   |                    |
|  |   |                    |
|  |   |                    |
|  |   |                    |
|  |   |                    |
|  |   |                    |
|  |   |                    |
|  |   |                    |
|  |   |                    |
| Skib - kontrol nr.<br>Ship - control no.               | Skibsførerens Navn og Underskrift<br>Masters Name and signature |                    |
|  |   |                    |
| Dato / Date  | Apotek / Pharmacy, eller/or Agent                               |                    |
|  |   |                    |
| Navn / Name  | Underskrift / Signature   |                    |
|  |   |                    |
| Stempel /stamp   |   |                    |

# Ændringer / Changes

July-2024

- 10.4 Sølvsulfadiazim er nu fjernet fra listen af medicin.
- 13.2 udgået af markedet
- 13.14 Diclofenac erstatter 13.2
- 13.8 Fusidin øjensalve er nu fjernet fra medicinliste.
- 13.13 Kloramphenicol Opbevaring ændret til:: Se indlægsseddel

- 10.4 Sølvsulfadiazim is now removed from the list of medicine.
- 13.2 Withdrawn from market.
- 13.14 Diclofenac replaces 13.2
- 13.8 Fusidin eye ointment is now removed from list of medicine.
- 13.13 Chloramphenicol Storage changed to: See leaflet

July-2024

## Medicin som er fjernet / Medicine removed

- 3.5 Tbl. Tramadol 50 mg
- 7.4 Tbl. Erythromycin 500 mg
- 7.13 Tbl. Sulfamethoxazol+trimitroprim
- 8.3 Tbl. Quinin100 mg
- 10.4 Cream Sølvsulfadiazin
- 12.5 Mixtur Laktulose 667 mg/ml
- 12.12 Tbl. Domprenidon10 mg
- 13.8 Dråber/gel Fusidin
- 15.2 Turbohaler Terbutalin
- 15.4 Turbohaler Budesonide
- 15.6 Inj. Salbutamol
- 16.6 Gelatine, Natriumchlorid

## Medicin som er tilføjet / Medicine added

- 3.9 Tbl. Morfin 10 mg
- 4.6 Tbl. Prednisolon 25 mg
- 7.2 Tbl. Amoxicillin 500 mg
- 7.15 Tbl. Azithromycin 500mg
- 7.16 Tbl. Pivmecillinam 400 mg.
- 7.17 Tbl. Aciclovir 400 mg
- 8.4 Tbl. Artemether and lumefantrine
- 9.8 Tbl. Apixaban 5 mg
- 9.9 Inj. Tranexamsyre 100 mg/ml
- 10.8 Salve / ointment Fusidin 2%
- 12.13 Tbl Ondansetron 4 mg
- 12.14 Pulver / powder Movicol®
- 13.13 Øjensalve/ointment Chloramphenicol
- 15.7 Inhalation spray Sabumetol
- 15.8 Inhalation spray glycocortocoid
- 16.7 Steril vand / Sterile water

## Medicinsk udstyr som er fjernet / Medical equipment that is removed

- E.4 Optiva\*2 Intravenøs kanyle, 1,1 x 32, 20 g / Optiva\*2 intravenous cannula, 1.1 x 32, 20 g
- E.5 Vecafix® Fikseringsplaster til intravenøs kanyle / Vecafix® Fixing plaster for intravenous cannula

## Medicinsk udstyr som er tilføjet / Medical equipment that is added

- A.18 Hjertestarter (AED) 7/ Automatic extern defibrillator (AED)
- A.19 Iltbrille / Nasal Cannula
- C.15 Absorberende underlag ca. 6 lag 60x40 cm, steril, engangs / Absorbent underlay, approx.6 layers, 60x40 cm, non-sterile, disposable
- C.16 Opkastpose / Vomitbag
- D. 17 Ikke-absorberbar sutur, 5.0; 45 cm. FS eller DS25 / Non-absorbable suture, 5.0; 45 cm. FS eller DS25

|   |
|---|
| E.4 Intravenøs kanyle, 1,1 x 32, 20 g<br>(produkt navn fjernes) / i<br>intravenous cannula, 1.1 x 32, 20 g<br>(production name removed)   |
| E.5 Fikseringsplaster til intravenøs kanyle<br>(produkt navn fjernes) /<br>Fixing plaster for intravenous cannula<br>(product name removed)                                     |
| G.8 Hurtig test C-reaktiv protein (CRP) /<br>Rapid test for C- reaktive proteiner (CRP)   |
| I.1 Engangskatetre m. krum spids, CH 14,<br>til mænd ( antal øges til 10 stk.) /<br>Catheters for single use w/ curved tip, CH 14 for men ( the<br>amount increases to 10 pcs.) |

#### December 2023/ January 2024

4.1 Adrenalin opbevaring ændret - Læs indlægssedlen for opbevaring

Tilføjet liste aflevering af udløbet medicin på apotek

Covid-19 medicin og medicinskudstyre er fjernet

Covid-19 medicine and medical equipment is removed

4.1 Epinephrine storage changed - read packet insert for storage

Added list of delivery of expired medicine at the pharmacy

#### July 2022

E.4 og E.5 Engelsk tekst rettet fra "needle" til cannula.

Generelle rettelser af stavfejl og layout

E.4 og E.5 Text corrected from "needle" to cannula.

General spelling corrections and layout

#### April 2022

B.14 rettet til B.18 Årepresser massiv blødninger

Generelle rettelser af stavfejl og layout.

B.14 corrected to B.18 Tourniquet for massive bleeding

E.3 corrected to Tourniquet for i.v.

General spelling corrections and layout.

#### November 2021

Version nummer rettet

C.14 sterilt lagen

Version number corrected

C.14 Bed sheet, sterile

#### October 2021

Tilføjet Identifikation af skib (Side 1)

Tilføjet 13.12 Ciprofloxacin / Hydrocortison- øredråber

16.3 Hydroxyethylstivelse udgår

Tilføjet 16.6 Gelatine, Natrium chlorid erstatter 16.3



Tilføjet B.14 Åreprese til pulsåreblødning  
Tilføjet C.13 Engangsforklæde  
Tilføjet F.7 Hypotermi termometer  
Tilføjet I.3 Engangskatetre CH 14 til kvinder  
Ændret N.1 Insektbekæmpelsesmiddel, ikke specificeret- **pulver form**  
Tilføjet N.3 Insektbekæmpelsesmiddel, ikke specificeret- **væskeform**

Added Identification of ship (page 1)  
Added 13.12 Ciprofloxacin / Hydrocortisone - eardrops  
16.3 Hydroxyethyl amide is discontinued product  
Added 16.6 Gelatine sodium Chloride replace 16.3  
Added B.14 Tourniquet to arterial bleeding  
Added C.13 Disposable apron  
Added F.7 Hypothermia thermometer  
Added I.3 Catheters for single use, CH 14 for women  
Changed N.1 Insecticide, not specified - **powder form**  
Added N.3 Insecticide, not specified - **liquid form**

#### July 2021

6.3 Diazepam klyksma styrke rettet tilbage til 4mg/ml - beklager ulejligheden  
7.10 Vaccine Tetanus- label tilrettet  
COVID-19 tillæg - overskrifter rettet. Tilføjet at hurtigtest skal være CE mærket.

6.3 Diazepam enema strength corrected back to 4mg/ml - Sorry for the inconvenience  
7.10 Vaccine Tetanus - label corrected  
COVID-19 add on - the headlines corrected. Added that the quick test have to be CE marked.

#### February 2021

Tilføjet 8.4 Artemether og lumefantrine i "add medicine covid- 19".  
Til behandling af Malaria.

Add. 8.4 Artemether and lumefantrine in "add medicine covid-19".  
For treatment of Malaria.

#### January 2021

Tilføjet side med ekstramedicin og medicinsk udstyr i forbindelse med Covid-19.  
side 97->

Det er frivilligt om skibet vil medbringe medicinen og udstyr eller dele deraf.

Added page with additional medicine and medical equipment in connection with Covid-19. Page 97->  
It is optional if the ship will bring the medicine and equipment or part of it

8.2 Doxycyclin styrke ændret til 100 mg  
8.2 Doxycyclin strength changed to 100 mg

#### October 2020

6.3 Klyksma Diazepam styrke ændret til 5 mg/ml  
6.3 Enema Diazepam strength changed to 5 mg/ml  
7.10 Tetanus holdig vaccine - styrke fjernet, da det kommer an på hvad der udleveres - følg råd fra Radio Medical  
7.10 Tetanus-containing vaccine - strength removed as it depends on what is delivered - follow advice from Radio Medical.  
Rettet i 8.1 Brugervejledning for behandlingen af Malaria  
Corrected 8.1 User instruction for treatment of Malaria

#### Marts 2020

Alle ændringer fremgår nu af sidste side i dokumentet.

All changes are now on last page in the document.

7.1 Tablet Phenoxyethylpencillin ændret til 660 - 800 mg.

7.1 tablet Phenoxyethylpencillin changed to 660 - 800 mg.

15.3 Inj. Terbutalin 0,5 mg/ml er erstatet med 15.6 Inj. Salbutamol 0,5 mg/ml

1.3 Inj. Terbutalin 0,5 mg/ml is changed to 15.6 Inj. Salbutamol 0,5 mg/ml

D.4 Sutur fjernet firma navn.

D.4 Sutur removed company name

#### August 2017

3.6 ændret til: 3.8 Diclofenac suppositorier 50 mg 50 stk.

3.6 changed to: 3.8 Diclofenac suppositorie 50 mg 50 pcs.

7.10 ændret til tetanustoksid holdig vaccine 1. stk.

7.10 Change to: Vaccine containing Tetanustoxid 1 pc.

8.1 (Behandling) Brugervejledning rettet

8.1 (Treatment) User instruction corrected.

O.2 Tilføjet nye lægebog for søfarende fra Seahealth

O.2 Add. the new Medical guide for seafarers from Seahealth